

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسَوَّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

### إنتيفيو تحت الجلد

### محلول للحقن تحت الجلد في قلم للحقن جاهز للاستعمال (Pre-filled pen)

#### المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قلم حقن جاهز للاستعمال على 108 ملغ فيدوليزوماب (vedolizumab 108 mg) في 0.68 ملل محلول. مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. هذا الدواء وصف لك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

#### 1. لم أعد هذا الدواء؟

يُستعمل إنتيفيو تحت الجلد لعلاج البالغين، لعلامات وأعراض:

- التهاب القولون التقرحي النشط بدرجة نشاط معتدلة حتى حادة.
- داء كرون النشط بدرجة نشاط معتدلة حتى حادة.

#### التهاب القولون التقرحي

إنتيفيو تحت الجلد معدّ لعلاج المتعالجين البالغين الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي النشط بدرجة نشاط معتدلة حتى حادة الذين ظهر لديهم رد فعل غير كافٍ، توقفوا عن الاستجابة أو ظهر لديهم عدم قدرة تحمّل للعلاج المتبع أو للمناهض لـ tumor necrosis factor-alpha (TNFα).

#### داء كرون

إنتيفيو تحت الجلد معدّ لعلاج المتعالجين البالغين الذين يعانون من مرض كرون نشط بدرجة نشاط معتدلة حتى حادة الذين ظهر لديهم رد فعل غير كافٍ، توقفوا عن الاستجابة أو ظهر لديهم عدم قدرة تحمّل للعلاج المتبع أو للمناهض لـ tumor necrosis factor-alpha (TNFα).

المجموعة العلاجية: مثبطات مناعة انتقائية (مضادات وحيدة النسيلة - MAb - monoclonal antibodies).

يحتوي إنتيفيو على المادة الفعالة فيدوليزوماب (vedolizumab). ينتمي فيدوليزوماب لمجموعة من أدوية بيولوجية تدعى مضادات وحيدة النسيلة (MAbs). يعمل إنتيفيو من خلال إحصار بروتين موجود على سطح خلايا الدم البيضاء، الذي يؤدي إلى التهاب في حالات التهاب القولون التقرحي وداء كرون. هذه الفعالية تقلص من شدة الالتهاب.

#### 2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أليرجي) لفيدوليزوماب أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (كما هو مفصّل في البند 6).
- كنت تعاني من عدوى نشطة حادة، مثلاً: السل، تسمم الدم، التهاب في الجهاز الهضمي (gastroenteritis) الذي ينعكس من خلال حالات إسهال وتقيؤات حادة، عدوى في الجهاز العصبي، الفيروس المضخم للخلايا (CMV)، عدوى جرثومة الليستيريا، وحالات عدوى مثل اعتلال بياض الدماغ متعدد البؤر المتفرّقي (PML).

#### تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

قبل العلاج بإنتيفيو تحدث مع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

عندما تحصل على هذا الدواء للمرة الأولى، خلال العلاج وبين تناول جرعات الدواء أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة فوراً في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من تشوش الرؤية، فقدان الرؤية أو رؤية مزدوجة، صعوبات في الكلام، ضعف في الذراع أو الساق، تغيير في طريقة المشي أو مشاكل في التوازن، تنميل متواصل، انخفاض في الإحساس أو فقدان الإحساس، فقدان الذاكرة أو ارتباك. قد تكون كل هذه العلامات أعراضاً لحالة دماغية خطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة، المعروفة باسم اعتلال بيبضاء الدماغ متعدد البؤر المترقي (PML).
- إذا كانت لديك عدوى أو إذا كنت تعتقد أن لديك عدوى. العلامات على ذلك تشمل: حالات قشعريرة، رجفان، سعال متواصل أو حمى مرتفعة. قد تتحول حالات عدوى معينة إلى حالات خطيرة، وقد تشكل حتى خطراً على حياتك في حال عدم معالجتها.
- إذا كنت تشعر بعلامات رد فعل تحسسي، مثل صفير، صعوبات في التنفس، شرى، حكة، تورم أو دوخة. للحصول على معلومات مفصلة أكثر، انظر ردود الفعل التحسسية في البند 4.
- إذا كنت على وشك تلقي لقاح أيا كان أو إذا تلقيت لقاحاً مؤخراً. قد يؤثر إنتيفيو في طريقة رد فعلك تجاه اللقاح.
- إذا كنت مصاباً بالسرطان، أخبر طبيبك. يجب على الطبيب أن يقرر فيما إذا ما زلت قادراً على تلقي إنتيفيو.
- إذا لم تشعر بتحسن، لأن بعض مرضى كرون النشط جداً قد يمضي حتى 14 أسبوعاً حتى يشعرون بتأثير فيدوليزوماب.

### الأطفال والمراهقون

لا يوصى باستعمال إنتيفيو لأطفال أو للمراهقين (أقل من 18 عاماً) بسبب نقص المعلومات حول استعمال هذا الدواء لدى الفئة العمرية 0-17.

### ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

- يُمنع إعطاء إنتيفيو سويًا مع أدوية بيولوجية أخرى التي تحبط جهاز مناعتك، لأن تأثيرها ليس معروفًا.

أخبر طبيبك إذا تناولت في الماضي:

- ناتاليزوماب (دواء للتصلب المتعدد) أو
  - ريتوكسيماب (دواء لأنواع مختلفة من السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي)
- سيقرر طبيبك فيما إذا كان يمكن إعطاؤك إنتيفيو.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، تعتقد أنكِ حامل، أو تخططين لتحملي، عليكِ استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

### الحمل

إن تأثيرات إنتيفيو على النساء الحوامل ليست معروفة. لهذا، لا يوصى باستعمال هذا الدواء أثناء الحمل. عليكِ أنتِ وطبيبك أن تقررا فيما إذا كانت الفائدة التي تجنيها أكبر بشكل مؤكد من الخطر المحتمل الذي يلحق بكِ وبجنينك.

إذا كنتِ في سن الخصوبة، يوصى بأن تتجنبي الحمل أثناء استعمال إنتيفيو. يجب عليكِ استعمال وسيلة منع حمل ملائمة أثناء العلاج، والاستمرار في استعماله طوال 4.5 أشهر على الأقل، بعد العلاج الأخير.

### الإرضاع

أخبري طبيبك فيما إذا كنتِ مرضعة أو تخططين للإرضاع. ينتقل إنتيفيو عبر حليب الأم. ليست هناك معلومات كافية حول التأثير المحتمل على طفلكِ وعلى إنتاج الحليب. يجب اتخاذ قرار فيما إذا كان يجب التوقف عن الإرضاع أو إيقاف العلاج بإنتيفيو، مع الأخذ بعين الاعتبار فائدة الإرضاع لطفلكِ، ونجاعة العلاج لكِ.

## الخصوبة

لا تتوفر معلومات حول تأثير إنتيفيو على خصوبة الإنسان.

### **السياقة واستعمال الماكينات**

هناك تأثير قليل لهذا الدواء على قدرتك على السياقة أو استعمال الأدوات أو الماكينات. شعر عدد قليل من المعالجين بدوخة بعد أن تلقوا إنتيفيو. إذا شعرت بدوخة، فلا تقد سيارة ولا تستعمل أدوات أو ماكينات.

### **معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء**

يحتوي إنتيفيو تحت الجلد على صوديوم.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في كل جرعة، أي يُعتبر "خاليًا من الصوديوم".

### **3. كيف تستعمل الدواء؟**

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

ستحصل أنت أو الشخص الذي سيقدم لك العلاج على إرشاد حول كيفية حقن إنتيفيو تحت الجلد (حقن تحت الجلد).

### **ما هي الكمية التي ستحصل عليها من إنتيفيو؟**

#### **الجرعة والوتيرة**

الجرعة وطريقة العلاج يُحددهما الطبيب فقط. يكون العلاج بإنتيفيو تحت الجلد شبيهًا عندما يُعطى لعلاج التهاب القولون النقرحي وداء كرون. الجرعة الموصى بها عادة هي 108 ملغ من إنتيفيو، التي تُعطى بحقنة تحت الجلد، مرة كل أسبوعين.

- في بداية العلاج، سوف يعطيك الطبيب جرعات بدئية من إنتيفيو عبر النقطير إلى وريد في ذراعك (تسريب وريدي) لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
- بعد إعطاء تسريبين وريدين على الأقل، يمكنك البدء بتلقي إنتيفيو عبر حقنة تحت الجلد. تُعطى الحقنة تحت الجلد الأولى في الموعد الذي حُدد لإعطاء التسريب الوريدي القادم وبعد ذلك كل أسبوعين.

### **يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

### **حقن إنتيفيو**

بإمكانك تنفيذ الحقن تحت الجلد بنفسك أو يمكن أن يحقنها لك مقدّم العلاج الخاص بك، بعد تلقي إرشاد حول كيفية القيام بالحقن. تظهر تعليمات الاستعمال في نهاية هذه النشرة.

### **إذا نسيت أو تخطيت جرعة دواء**

إذا نسيت أو تخطيت جرعة دواء، احقن الجرعة التالية في أسرع وقت ممكن، وبعد ذلك كل أسبوعين.

### **إذا توقفت عن استعمال إنتيفيو**

لا تتوقف عن استعمال إنتيفيو دون استشارة طبيبك أولاً.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

#### 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال إنتيفيو أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

#### أعراض جانبية خطيرة

أخبر الطبيب حالاً إذا لاحظت أحد الأعراض التالية:

- ردود فعل تحسسية (قد تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100) – قد تشمل العلامات على: صفير أو صعوبات في التنفس، شرى، حكة في الجلد، انتفاخ، غثيان، احمرار الجلد.
- حالات عدوى (قد تظهر لدى حتى مستعمل من بين 10) – قد تشمل العلامات على: حالات قشعريرة أو رجفان، حمى أو طفح.

#### أعراض جانبية أخرى

إذا لاحظت أحد الأعراض التالية، أخبر الطبيب في أسرع وقت ممكن:

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10):  
زكام، ألم في المفاصل، صداع.

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى مستعمل واحد من بين 10):

حمى، عدوى رئوية، التهاب القصبات، تعب، غثيان، سعال، إنفلونزا، ألم في الظهر، آلام في الحنجرة والأذنين، التهاب في الحنجرة، التهاب في الجيوب الأنفية (نتيجة عدوى أو لسبب آخر)، اضطرابات في الإحساس، حكة، طفح واحمرار، ألم في الأطراف، تشنجات في العضلات، ضعف العضلات، عدوى في المسالك التنفسية العلوية، التهاب في جهاز الهضم - المعدة والأمعاء (فيروسى أو آخر)، عدوى في المستقيم، جرح في المستقيم، شق في الشرج، براز صلب، إمساك، انتفاخ بطني، غازات، ضغط دم مرتفع، لسعات أو وخزات، حرقة، بواسير، احتقان في الأنف، إكزيما، تعرّق ليلي، حب الشباب (جروح صغيرة)، ردود فعل في منطقة الحقن (تشتمل على ألم، انتفاخ، احمرار أو حكة).

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى مستعمل واحد من بين 100):

احمرار أو حساسية في بصيلات الشعر، عدوى فطرية في الحنجرة والفم، عدوى في المهبل (فطرية أو أخرى)، هربس نطاقي (herpes zoster)، عدوى في المسالك التنفسية، حالات قشعريرة، إحساس بالبرد.

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تظهر لدى مستعمل واحد من بين 10,000):

التهاب رئوي، تشوش الرؤية (فقدان حدة البصر)، رد فعل أرجي حاد ومفاجئ الذي قد يؤدي إلى صعوبات في التنفس، انتفاخ، وتيرة نظم قلب سريعة، تعرّق، انخفاض ضغط الدم، دوخة، فقدان الوعي وانهيار (رد فعل تأقي وصدمة تأقية).

أعراض جانبية نسبة شيوعها غير معروفة (لا يمكن تقدير تواترها من المعلومات المتوفرة):

مرض رئوي الذي يسبب ضيق تنفس (interstitial lung disease).

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### التبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيف يُخزّن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

### شروط التخزين

- يجب الاحتفاظ به في الثلاجة (2°C-8°C). يجب تخزين قلم الحقن الجاهز للاستعمال في العبوة الأصلية للحماية من الضوء. إذا دعت الحاجة، يمكن إبقاء قلم الحقن الجاهز للاستعمال خارج الثلاجة في العبوة الأصلية بدرجة حرارة الغرفة (حتى 25°C) حتى 7 أيام. يُمنع استعمال قلم الحقن الجاهز للاستعمال إذا بقي خارج الثلاجة لمدة تزيد عن 7 أيام.
- يُمنع التجميد. يمنع التعريض للشمس المباشرة.
- إنتيقيو معدّ للاستعمال لمرة واحدة.
- يُمنع استعمال هذا الدواء إذا لاحظت وجود أية جزيئات في السائل أو إذا طرأ تغيير على لونه (يجب أن يكون المحلول عديم اللون حتى لون أصفر) قبل إعطاء الدواء.
- يُمنع إلقاء الدواء في مياه الصرف الصحي أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها بعد. إن ذلك يساعد في الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

L-arginine hydrochloride, sodium citrate dihydrate, L-histidine, L-histidine monohydrochloride, polysorbate 80, citric acid monohydrate and water for injection.

### كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

إنتيقيو هو محلول للحقن عديم اللون حتى لون أصفر داخل قلم للحقن جاهز للاستعمال من زجاج المزوّد بألية أمان التي تقفل الإبرة عند إزالة القلم من موقع الحقن. المستحضر متوفر كعبوة التي تحتوي على 1، 2 أو 6 أقلام حقن جاهزة للاستعمال. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: تاكيدا إسرائيل م.ض.، شارع إفعال 25، ص.ب. 4140، بيتاح تيكفا 4951125، إسرائيل.

### اسم المنتج وعنوانه:

Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Denmark.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 170-22-36542-00



لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

تمت المصادقة على هذه النشرة في شباط 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

تعليمات استعمال إنتيفيو تحت الجلد  
محلول للحقن تحت الجلد في قلم للحقن جاهز للاستعمال (Pre-filled pen)

اقرأ التعليمات التالية واتبعها قبل أن تحقن الدواء. على الطبيب، الممرضة أو الصيدلي أن يرشدوك حول كيفية استعمال إنتيفيو قلم حقن جاهز للاستعمال قبل أن تستعمله للمرة الأولى.

يحتوي إنتيفيو قلم حقن جاهز للاستعمال على جرعة واحدة



1) ضع الأغراض التي تحتاج إليها للحقن على مسطح نظيف ومستوٍ

- أخرج عبوة واحدة من قلم الحقن الجاهز للاستعمال من الثلاجة.
- يُمنع استعمال قلم الحقن الجاهز للاستعمال إذا كانت إحدى وسائل إغلاق العبوة متضررة أو ناقصة.
- افحص تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) الظاهر على العبوة. يُمنع استعمال المستحضر إذا انتهى تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر على العبوة.

انتظر 30 دقيقة



- انتظر 30 دقيقة حتى يصبح قلم الحقن الجاهز للاستعمال بدرجة حرارة الغرفة.


- يُمنع تدفئة قلم الحقن الجاهز للاستعمال بأية طريقة كانت.
- يُمنع تعريضه لضوء الشمس المباشر.
- يُمنع إخراج قلم الحقن الجاهز للاستعمال من اللوحة (البليستر) الخاصة به حتى تكون جاهزًا للحقن.

- سوف تحتاج أيضا إلى الأغراض التالية:

- ضمادة كحول
- قطعة قطن أو شاش
- وعاء للتخلص من الأغراض الحادة





## 2) افتح وافحص قلم الحقن الجاهز للاستعمال




- اغسل يديك.
- انزع نحو الخلف الورقة التي تغطي اللوحة (بليستر) وأخرج قلم الحقن الجاهز للاستعمال.
- افحص بواسطة النظر، قلم الحقن الجاهز للاستعمال للتأكد من أنه ليس متضررًا.
  - يُمنع استعمال قلم الحقن الجاهز للاستعمال إذا كان أحد أجزائه متضررًا.
- افحص تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر على قلم الحقن الجاهز للاستعمال.
  - يُمنع استعمال قلم الحقن الجاهز للاستعمال بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الظاهر عليه.
- افحص بواسطة النظر محلول الدواء. يجب أن يكون المحلول عديم اللون حتى لون أصفر.
  - لا تستعمل قلم الحقن الجاهز للاستعمال إذا كان محلول الدواء عكرا أو كان يتضمن جزيئات عائمة في داخله.
- يُحتمل أن تشاهد فقاعات هواء في قلم الحقن الجاهز للاستعمال. هذه الحالة سليمة.
  - يُمنع الخض.

## 3) حضّر موقع الحقن




- اختر موقع الحقن على جلدك المكشوف من بين أحد الأماكن التالية:
  - الجزء الأمامي من الفخذين، أو
  - منطقة البطن، فيما عدا منطقة حتى 5 سم حول السرة، أو
  - الجزء الخلفي من الذراع العلوية (فقط إذا كان مقَدّم العلاج هو الذي يحقن الدواء لك).
- في كل عملية حقن، استعمل موقع حقن جديد أو منطقة أخرى في ذات موقع الحقن.
  - لا تحقن الدواء داخل شامات، ندبات، كدمات، أو مناطق ذات جلد حساس، صلب، أحمر أو متضرر.
- جفف الموقع المختار بضمادة كحول. دع جلدك يجف.
  - يُمنع ملامسة هذه المنطقة ثانية قبل الحقن.
- انزع السدادة البنفسجية عبر سحبها وتخلص منها.
  - يُمنع أن تضع أو تضغط بالإبهام، بالأصابع أو بكف اليد على واقي الإبرة الأصفر.
  - يُمنع إعادة السدادة إلى قلم الحقن الجاهز للاستعمال.
  - يُمنع استعمال قلم الحقن الجاهز للاستعمال إذا سقط.


#### 4) احقن الدواء



واصل الضغط  
(عُد حتى 10)



تأكد



■ أمسك قلم الحقن الجاهز للاستعمال بحيث تستطيع رؤية نافذة العرض.

■ ضع قلم الحقن الجاهز للاستعمال بزاوية 90 درجة من موقع الحقن.

● تأكد من أن الطرف الأصفر متجه نحو موقع الحقن.

● لا تضغط نحو الأسفل قبل أن تكون جاهزاً للحقن.

■ اضغط نحو الأسفل على قلم الحقن الجاهز للاستعمال حتى النهاية، إلى أبعد مسافة يمكن أن يصل إليها، لبدء الحقن.

■ واصل الضغط وعد حتى 10 بينما تضغط نحو الأسفل وتمارس ضغطاً ثابتاً. تتيح هذه الخطوة حقن كل الدواء.

● يُحتمل أن تسمع نقرتين، نقرة في البداية وأخرى قبيل انتهاء الحقن.

■ تأكد من أن نافذة العرض مغطاة باللون البنفسجي قبل أن تتوقف عن الضغط.

● سوف تشاهد كمية صغيرة من اللون الرمادي في النافذة. هذه الحالة سليمة.


■ ارفع قلم الحقن الجاهز للاستعمال عن موقع الحقن.

● سوف يسقط واقي الإبرة الأصفر نحو الأسفل ويُقل فوق الإبرة.

● إذا لم تصبح نافذة العرض ملئية بالكامل، اتصل بالطبيب، الممرضة أو الصيدلي. ربما لم تحصل على جرعة الدواء بالكامل.

■ يُحتمل أن تشاهد كمية ضئيلة من الدم في موقع الحقن. في مثل هذه الحال، اضغط على جلدك مستخدماً قطعة قطن أو شاش.

#### 5) تخلص من المواد المستعملة



■ بعد الاستعمال فوراً، ضع قلم الحقن الجاهز للاستعمال في حاوية مقاومة للثقب، مثل حاوية معدة للأغراض الحادة.

● تخلص من حاوية الأغراض الحادة وفق الأنظمة المحلية.

■ يمكن التخلص من سائر المواد في سلة النفايات المنزلية.