

نشرة للمستهلك بموجب وصفة الطبيب الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

تراماداكس قطرات

100 ملغ/مل

يحتوي كل 1 مل (40 قطرة) على: ترامادول هيدروكلوريد (Tramadol hydrochloride) 100 ملغ – مواد غير فعالة ومسترجعات في الدواء – انظر للبلد 6 “معلومات إضافية” للبلد 2 “معلومات هامة عن جزء أفرا النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية يُوجه الي الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لك، لا تعطل الآخرين. لأنه قد يسبب الضرر ليس حتى لو بد أنك من حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. الدواء ليس معًا للأطفال ما دون 14 عامًا.

قد تؤدي الأدوية من فئة الأفيونيات إلى الإدمان، وخصوصاً عند الاستعمال المتواصل، وهي ذات إمكانية لإساءة الاستعمال والجرعة المفرطة قد يتسبب في الفشل لجرعة مفرطة بتتسبب بطيء وحتى التسبب بالموت. تتناول ذلك تعرف اسم الدواء، الجرعة التي تتناولها، وتيرة التناول، فترة العلاج، الأعراض الجانبية والاختلاجات، واحتمالات الخطأ المحتملة.

يمكن إيجاد معلومات أخرى حول اختبار التعلق والإدمان في الرابط:

www.health.gov.au/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_ar.pdf

إن تناول هذا الدواء مع أدوية من عائلة البنزوديازيبينات، الأدوية الأخرى التي تخمطها الجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المهدئات) أو كحول من الممكن أن يؤدي إلى الشعور بضعف، صعوبات تنفس (تثبيط تنفسي)، غيبوبة وموت.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

تراماداكس قطرات مخصص لعلاج الألم المتوسط حتى الخفيف.

الفصلية العلاجية: أفيونيات.

ترامادول هيدروكلوريد، أو لأي واحد من مركبات الإضافة التي يتم تصنيعها للأفيونيات) هو يعمل على الجهاز العصبي المركزي. يمكن الألم عن طريق تأثيره على خليا العصب في الحبل الشوكي وفي الدماغ.

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء:
إذا كنت حساساً (رئجياً) للمادة الفعالة (ترامادول هيدروكلوريد)؛
و لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبلد 6).

إذا كنت بحالة تسبب حدًا من الكحول أقراص مؤنمة.
استكثت الأروا أو أدوية نفسية أخرى (تؤدي توتّر على المزاج والأحاسيس).

- إذا كنت تتناول مثبّطات أو كسيدياز أحادي الأمين (MAO) (أدوية معينة لعلاج الاكتئاب) أو إذا تناولتها خلال 14 يوم قبل تناول تراماداكس قطرات (انظر للبلد تفاعلات بين الأدوية)؛
- إذا كنت مريضاً بالصرع أو لا يمكن السيطرة على النوبت كما يجب عند العلاج الدوائي لتثاقف.
- كبديل للظلم عن المخدرات.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

قبل تناول تراماداكس قطرات، أخبر الطبيب إذا:

كنت تتعدّد كالتالي أو إذا تعاني في الماضي من تعلق بمسكّنات الأخرى (أفيونيات) كحكّول، أدوية بوصفة طبيب أو غيره.

أو دواء ليس فوئيوتياً.
عليك في الماضي من أعراض اضطراب مثل: عدم هدوء قلق، ارتجاف أو تعرق عندما توقفت عن استهلاك الكحول أو المخدرات.

كنت تشعر بضعف بضرورة تناول المزيد من تراماداكس قطرات للحصول على نفس مستوى تسكين الألم. قد يدل هذا على بدء تحمل ثابرات الدواء والبدء بالإدمان عليه. توجه الي الطبيب لمناقشة علاجك وربما يغيرك لك الجرعة أو يبدّل العلاج بمسكّن الأخرى.
كنت تعاني من اضطراب في مستوى الوعي (إذا كنت تشعر أنك على وشك الإغماء)
كنت في حدّة صعبة (من الممكن أن يكون العرق البارد انشازاً وثقلت).

كنت تعاني من ضغط متزايد على الدماغ (من الممكن أن يحدث بعد إصابة في الرأس أو مرض دماعي).

كنت تعاني من صعوبات في التنفس.

كنت تعاني من الصرع أو ميل للاختلاجات.
لأن الإختطار (احتمال الخطر) للاختلاجات من الممكن أن يزيد.
تتناول فترة العلاج، الأعراض الجانبية والاختلاجات، واحتمالات الخطأ المحتملة.

يمكن إيجاد معلومات أخرى حول اختبار التعلق والإدمان في الرابط:

كنت تعاني من مرض كبد أو كلّي.

مشاكل تنفس المرتبطة بالنوم

يجتري تراماداكس قطرات على المادة الفعالة التي تنتسي نفسلية الأديوية التي تسبب أفيونيات. قد تؤدي الأفيونيات إلى مشاكل تنفس الترسية الحادة بالنوم.
قد يتسبب نقص التنفس أثناء النوم.
قد يتسبب نقص التنفس (سحبني/انقطاع النفس أثناء النوم)، (apnea)، نقص تنفس كالجسم الدم المرتبط بالنوم (متسوى أو كسجين منخفض في الدم).

لأن الإختطار لمعالجة توقفت التنفس أثناء النوم متعلق بقدر الأفيون. قد يداخل طبيبك بين الاعتراف بتقليل الجرعة الكليّة للأفيون التي تتناولها إذا كنت تعائش، توقّف في التنفس أثناء النوم.

من الممكن أن يؤدي الإدمان لأعراض فطام عند التوقف عن تناول هذا الدواء. أعراض الفطام يمكن أن تشمل عدم الإرتياح، صعوبات نوم، عصبية، عدم الهدوء، قلق، إرباك، نوبات القلب، ارتفاع ضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، أسهال، فقدان الشهية، ارتجاف أو تعرق، سيئفكش طبيبك معك كيف سيتم تقليل الجرعة بالتدريج قبل إيقاف تناول الدواء. من المهم أن لا توقّف أخذ الدواء بشكل مفاجئ. إن ذلك من الممكن أن يزيد من الإختطار لمعالجة أعراض الفطام.

يجب أن تُستعمل الأفيونيات فقط من قبل الأشخاص الذين وصفها لهم الطبيب. لا يجوز إعطاء الدواء لأي شخص آخر. إن تناول جرعة عالية أو بوتيرة عالية أكثر من الأفيونيات يمكن أن يزيد الإختطار للإدمان. استعمال مفرط واستعمال غير صحيح من الممكن أن يؤدي لجرعة مفرطة أو الموت.

يمر ترامادول بمعالجة في الكبد بواسطة أنزيم. لدى جزء من الأشخاص يوجد نوع معين من الإنزيم وهذا من الممكن أن يؤثر عليهم بطرق مختلفة. لدى أشخاص معينين، التاثير على الإنزيم لا يكون متسوّباً بشكل كافئ، بينما من الممكن أن يتاثير أشخاص آخرون من أعراض جانبية وخيمة، ويحتمل على ذلك الإختطار وجود أحد الأعراض الجانبية التالية، يجب عليك التوقف عن تناول الدواء، والتوجه حالاً للطبيب:
ضعف طبيعي أو شعور، ارتباك، غثاس، حثقات، صعيرتان، الشعور بغثيان أو تقيؤ، أسهال، فقدان شهية.

تحدثت إلى طبيبك إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية أثناء تناول تراماداكس قطرات:

تعب شديد، فقدان الشهية، ألم شديد في البطن، غثاس أو نقص ضغط دم، متشنج، قد يشير هذا إلى أن لديك قصور في الغدة الكظرية (تواصل مع صوبيات الكورتيزول).
إذا واجبت هذه الأعراض، أو تفاصل مع طبيبك، اطلب سيطرة ما إذا كان يجب عليك تناول مكمل هرموني.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تتولت في الأديوة الأخرى، أدوية أخرى طبيبة أو الصيدلي بذلك.
لا يجوز تناول تراماداكس قطرات سوية مع مثبّطات MAO (أدوية معينة لعلاج الاكتئاب) أو إذا تناولتها خلال 14 يومًا قبل تناول تراماداكس قطرات.

من الممكن أن يحدث انخفاض بتأثير تراماداكس قطرات وقد تنقص عدد تأثيرها إذا تم تناوله سوية مع أدوية تحتوي على:

- كل باراميزولين (علاج نوبات الصرع)
- أوبنيتينون (مميع الغثيان)
- سيديركس طبيبك إذا كان عليك تناول تراماداكس قطرات وبديلة جرعة.

قد يزداد الإختطار لأعراض جانبية إذا كنت تتناول:

مسكّنات الألم الأخرى مثل كوكودين، أفيونيات، أيضاً لتخفيف من السعال) أو كحول بولاق، كيتولول، فيمبروفين، تراماداكس قطرات.
من الممكن أن تحدث تفاعلات، أو أن تشعر أنه من الممكن أن يعضي عليك إذا كنت واحد من المرضى الموصفة بديلة المتلازمة الأوجيمية (انظر للبلد 2 "الأعراض الجانبية")، والذوم (مثلاً بنزوديازيبينات) يزيد من الأديوية الفعالة، والذوم (تثبيط التنفس) الغيبوبية ومن الممكن أن يكون مهيداً للحيوة؛ فقط إذا لم يؤخذ الاستعمال المتزامن بعين الاعتبار. فقط إذا لم تكن هناك إمكانية لينتال دونية أخرى مع ذلك، أو إذا وصف لك طبيبك تراماداكس قطرات مع أدوية مؤنمة، فيجب أن تكون الجرعة ومنذ العلاج مترافق مع حدوثك من قبل الطبيب. من فضلك أخبر طبيبك عن كل الأدوية المؤنمة التي تتناولها، والترم بوصيات طبيبك بالنسبة للجرعة بعناية. إن الملط من الأاضغاة، أو الأربابا

أو يكونوا واعيين للعاطف والأعراض من الممكن أن يساعد تواصل مع طبيبك إذا كنت تعائش دون أعراض.
أدوية الية من الممكن أن تسبب إختلاجات (نوبات صرع) بالنسبة للألم.

مضادة للذهان. قد يكون الإختطار لحذوث نوبة أعلى إذا كنت تتناول تراماداكس قطرات بنفس الوقت. سيديركس طبيبك فيما يتعلق بالأعراض الجانبية.
أدوية مؤنمة مضادة للاكتئاب. من الممكن أن يتفاعل تراماداكس قطرات معها.
من الممكن أن تعائش متلازمة السيروتونين (انظر للبلد 4 "مخاطر أعراض جانبية").
مضادات الإختطال الكورمانين (مشتقات الكورمانين) (أدوية لتسبب الدم) مثل المارغرين. فعالية هذه الأدوية في خطط الدم من الممكن أن تكون متأثرة وبالتالي من الممكن أن يظهر تريب.

استعمال الدواء والطعام

لا يؤثر الطعام على فعالية تراماداكس قطرات.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا تسترب المشروبات الروحية خلال فترة العلاج بتراماداكس قطرات، حيث أن تأثيره قد يكون أقوى.

الأطفال والمراهقين

استعمال تراماداكس قطرات لدى أطفال لديهم صعوبات في التنفس.

ترامادول غير موصى به لدى أطفال لديهم صعوبات في التنفس. إن أعراض التسمم بالترامادول من الممكن أن تكون أكثر وخامة لدى هؤلاء الأطفال.

العمل الإرضاع والرضع

لا تتولّى لبنك تراماداكس قطرات إذا كنت حاملاً أو تعتقدين أنك حامل.
إذا بدأ حدثت مع طبيبك عن ذلك وكنت الفاتدة من العلاج، تفوق الإختطار لتسبب ضرر للرضع.
إذا كنت تتناولين تراماداكس قطرات أثناء الحمل، من الممكن أن يسبب ذلك تلفل العلق ومعالجة أعراض الظلم بعد الولادة، التي تتطلب العلاج.

لا يجوز تناول تراماداكس قطرات أثناء الإرضاع لأن ترامادول يفرز حثاساً، ومن الممكن أن يؤثر على رضعتك.

استأذي إلى التجربة على البشر. لا يؤثر ترامادول على خصوبة المرأة أو الرجل.

القيادة واستخدام الآلات

طبيبك قطرات من الممكن أن يسبب الغثاس، الأديوة وتوسّش الروية، وذلك من الممكن أن يضرر برتود فوكل، إذا كنت تشعر أن ردود فوكل متأثرة، امتنع عن قيادة السيارة أو مرآكبات أخرى، لا تستغل أجهزة كويريانية أو الآت.

من الممكن أن يؤثر الدواء على قدرتك على القيادة لأنه من الممكن أن يسبب لك الغثاس أو التقيؤ، امتنع عن القيادة خلال تناول هذا الدواء.
قد يتعلم كسويز تروا عليك.
تلك مع طبيبك أو مع الصيدلي إذا كنت متقرباً من القيادة أمنة خلال تناول هذا الدواء.

بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركعتان الدراجات أو من الألعاب المائية هامة من الشوارع وما شابه.

معلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على السوكروز.
إذا كنت تعاني في الماضي من قبل طبيبك أن لديك عدم تحمل لحثاس، يجب استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء، من الممكن أن يضرر بالأسنان.
يحتوي الدواء على ماركرو جول وجينسولون هيدروكسي مترات، الذي من الممكن أن يؤدي إلى عدم الراحة بعدئذ وأسهال.
يحتوي الدواء على 160 ملغ من السيتالوبرول جليكول كل مل.
يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليومل صوديوم (23 ملغ) بكل مل، مما يعني أنه في الواقع "خالئ من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائماً وفقاً لتعليمات الطبيب.
عليك أن تخصص مع طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بالنسبة لجرعة وطريقة العلاج بدواء.
الجرعة وطريقة العلاج تحددان كيف طبيبك فقط.

يجب أن تكون الجرعة ملائمة لوخامة الألم وللحساسية الشخصية لتلك الألم.

بشكل عام، يجب تناول الجرعة الآتال التي تسكن الألم.

لا يجوز تناول أكثر من 400 ملغ ترامادول هيدروكلوريد (160 مغ) في اليوم.
الو إذا ارتكبت طبيبك لفعل ذلك، فقط في حال تم إرشادك بطريقة أخرى من قبل طبيبك، الجرعة الاعتيادية هي.

البالغين والمراهقين من قبل 14 سنة فأفوق:
50-100 ملغ ترامادول هيدروكلوريد (20-40 قطرة) كل 4-6 ساعات.
الأطفال
تراماداكس قطرات ليس مخصصاً للأطفال ما دون جيل 14.

فترة التسكين

لدى فة التسكين (فوق جيل 75) قد يتم تأخير أفرز ترامادول من الجسم.
إذا كان ذلك ينطبق عليك، فمن الممكن أن يوصي طبيبك بإضافة الأوصال الزمنية بين الجرعات.

مرض كبد أو كلّي وخفيف (قصور)/ مرضي الكبدال (غثيل الكلّي)
يجب أن يتعمق المتعاملون الذين لديهم قصور في الكبد و/أو الكليّة، يسوّق وخيد عن تناول تراماداكس قطرات.
إذا كنت تعاني من قصور بسببى وممتدل أو متوسط من الممكن أن يوصي الطبيب بإضافة الفاصل الزمني بين الجرعات.

مرض كبد أو كلّي وخيد (قصور)/ مرضي الكبدال (غثيل الكلّي)

يجب البقع من القليل من الماء أو التطهير على القليل من السكر.

انتبه! يجب الحرص على قياس الجرعة بقطارة الفئينة.

كيف من يجب عليك تناول تراماداكس قطرات؟

لا يجوز تناول تراماداكس قطرات إذا كنت حاملاً أو تعتقدين أنك حامل.
إذا بدأ حدثت مع طبيبك عن ذلك وكنت الفاتدة من العلاج، تفوق الإختطار لتسبب ضرر للرضع.
إذا كنت تتناولين تراماداكس قطرات أثناء الحمل، من الممكن أن يسبب ذلك تلفل العلق ومعالجة أعراض الظلم بعد الولادة، التي تتطلب العلاج.

لا يجوز تناول تراماداكس قطرات أثناء الإرضاع لأن ترامادول يفرز حثاساً، ومن الممكن أن يؤثر على رضعتك.

استأذي إلى التجربة على البشر. لا يؤثر ترامادول على خصوبة المرأة أو الرجل.

القيادة واستخدام الآلات

طبيبك قطرات من الممكن أن يسبب الغثاس، الأديوة وتوسّش الروية، وذلك من الممكن أن يضرر برتود فوكل، إذا كنت تشعر أن ردود فوكل متأثرة، امتنع عن قيادة السيارة أو مرآكبات أخرى، لا تستغل أجهزة كويريانية أو الآت.

من الممكن أن يؤثر الدواء على قدرتك على القيادة لأنه من الممكن أن يسبب لك الغثاس أو التقيؤ، امتنع عن القيادة خلال تناول هذا الدواء.
قد يتعلم كسويز تروا عليك.
تلك مع طبيبك أو مع الصيدلي إذا كنت متقرباً من القيادة أمنة خلال تناول هذا الدواء.

بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركعتان الدراجات أو من الألعاب المائية هامة من الشوارع وما شابه.

معلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على السوكروز.
إذا كنت تعاني في الماضي من قبل طبيبك أن لديك عدم تحمل لحثاس، يجب استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء، من الممكن أن يضرر بالأسنان.
يحتوي الدواء على ماركرو جول وجينسولون هيدروكسي مترات، الذي من الممكن أن يؤدي إلى عدم الراحة بعدئذ وأسهال.
يحتوي الدواء على 160 ملغ من السيتالوبرول جليكول كل مل.
يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليومل صوديوم (23 ملغ) بكل مل، مما يعني أنه في الواقع "خالئ من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائماً وفقاً لتعليمات الطبيب.
عليك أن تخصص مع طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بالنسبة لجرعة وطريقة العلاج بدواء.
الجرعة وطريقة العلاج تحددان كيف طبيبك فقط.

يجب أن تكون الجرعة ملائمة لوخامة الألم وللحساسية الشخصية لتلك الألم.

بشكل عام، يجب تناول الجرعة الآتال التي تسكن الألم.

يجب التوجه فوراً للطبيب إذا كنت تعائش أعراض لرد فعل تحسسي (حكة، تورم اللسان و/أو الحنجرة و/أو صعوبات في البلع أو التشرش، هives)، تورم حمراف في الجلد) بالإضافة إلى صعوبات في التنفس.

أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشر):
دوخة.
غثيان.

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 100):
الارثاس، غثاس.

تعب، إرتجاف، جفاف في الفم، تقيؤات، أسهال.

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):
تأثيرات على القلب وعلى الدورة النموية (الراك لفقات القلب، نبض سريع، الشعور بالإضعاف والأثنيان).

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):
ردود فعل حسية (مثل حكة، طفح).

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):
ردود فعل حسية (مثل حكة، طفح).
أظهر عرض جانبية إذا تلفقت أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعائى من عرض جانبي لم يكر في النشرة.
عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "لرئع أو لثوقوت لرواي بطق تسويل الموجد في الرضعة الرسمية لعمولة وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجه إلى الرسطة أو لتبثتة للإبلاغ عن أعراض جانبية أو عن طريق التواصل مع طبيبك.

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):
ردود فعل تحسسية (مثل صعوبات في التنفس، صغفر، انتفاخ في الجلد) وصعوبة في القيادة، علاج هذا البرنامج يوضع كيفية تقليل الجرعة تدريجياً حتى إيقاف التناول.

إذا تناولت بخاطف جرعة أعلى
بشكل عام، إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة إضافية لا ينبغي أن يسبب هذا أعراضاً سلبية.
مرضى تناول الجرعة التالية كالمعتاد.

إذا كنت تتناولت أنت أو شخص آخر كمية كبيرة من تراماداكس قطرات نفغة واحدة، يجب التوجه فوراً للمستشفى أو الطبيب.
أخضر

عورة الدواء
علامات الجرعة المفرطة تشمل حثقات، صعيرتان جدًا، تقيؤات، انخفاض ضغط الدم، نضبات قلب سريعة، انشيار، فقدان الوعي، إختلاجات وصعوبات في التنفس أو تنفس سطحي.

إذا نسيبت تناول الدواء

إذا نسيبت تناول تراماداكس قطرات، من المرجح أن يعود الألم.
لا تتناول جرعة إضافية.
العروض عن الجرعة المنسية، ببساطة استمر بتناول الدواء كالمعتاد.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز إيقاف تناول الدواء بشكل مفاجئ.
إذا اردت إيقاف تناول الدواء، استشر الطبيب أولاً.
سيسترح لك كيف تفعل ذلك، بشكل عام عن طريق تقليل الجرعة بالتدريج.
عليك تكون أعراض الظلم الغير مرغوية قليلة، إذا توقفت عن تناول تراماداكس قطرات، من الممكن أن يضرر بالأسنان.

لا يجوز إيقاف تناول الدواء، فمن الممكن أن يحدث تباطؤ في التنفس.
ضعف العضلات.
صعوبات أو عدم التبول، قلة البول.

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدمين من بين 10,000):
ارتفاخ، بقرصيات، اكتيد.

أعراض جانبية شوية عما غير معروف (أعراض التي لم يحدث شيوها بعد):
متسوى منخفض جدًا من السكر في الدم.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال في كل دواء، استخدام تراماداكس قطرات قد يؤدي إلى أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين.
لا تفز من قراءة قائمة الأعراض الجانبية.
من الممكن ألا تعائى من أي واحد منها.
والأو أعراض بالجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال) (انظر للبلد

2 "قبل استعمال الدواء")؛

تعلق وإيمان (انظر لاحقاً "كيف أعلم أنني ممن")؛

فطام عند توقف عن تناول تراماداكس قطرات من الممكن أن تعائش أعراض

فطام التي تشمل عدم ارتياح، صعوبات في النوم، عصبية، قلق، إرباك لفقات القلب، ارتفاع في ضغط الدم، غثيان، إسهال، ارتجاف، تعرق.

كيف أعلم أنني ممن؟

إذا لاحظت أو جردت إحدى العلامات التالية أثناء تناول تراماداكس قطرات، فمن الممكن أن تكون هذه علامة على الإدمان:

كنت تشترى الحاجة لتناول الدواء أكثر من طول من تلك الموصى بها.
كنت تشترى الحاجة لتناول جرعة أعلى من الموصى بها.
كنت تستعمل الدواء لأسباب تختلف عن تلك الموصوفة.

عندما توقفت عن تناول الدواء فإلك تشعر بسوء، وتوسّمر بتحسن مجدداً إنما تتناول الدواء.

إذا لاحظت أحد هذه الأعراض عليك التحث مع طبيبك.

أظهر عرض جانبية إذا تلفقت أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعائى من عرض جانبي لم يكر في النشرة.
عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "لرئع أو لثوقوت لرواي بطق تسويل الموجد في الرضعة الرسمية لعمولة وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجه إلى الرسطة أو لتبثتة للإبلاغ عن أعراض جانبية أو عن طريق التواصل مع طبيبك.

5. كيف تحذّر الوعاء؟

تحتفظ بتمسول يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.
والأو الرضع وبذلك تمنع التسمم.
لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) الذي يظهر على نفس العبوة.
تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
شروط التخزين:
حزّن تحت 25 درجة مئوية.
يمكن الاستعمال بعد الفتح الأولي لمدة 4 أشهر.

لا يجوز التخلص من الأدوية في المجاري أو في سلة القمامات المنزلية.
أسأل الصيدلي كيف التخلص من الأدوية التي لا تستعمل بعد.
هذه الوسائل سوف تساهم بالحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة للمركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على: Purified water, sucrose, propylene glycol, glycerol, sodium cyclamate, saccharin sodium, potassium sorbate, macroglycoerol hydroxystearate, mint oil, anise flavour artificial

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:

محتوي جفاف في شكل صقارة، لزج قليل.
محتوي قئينة الدواء على قطرة، لثليل فقئ كمية للدواء تحتوي كل قئينة على 10 ملغ من المستحضر.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 109-75-27636

نتججها في كانون الثاني 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة للتسبب وتطبيق القواعد.
تم تصاغة هذه النشرة بصيغة المنكّر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

Tramadex Drops PIL PB0523-06

المنتج وصاحب التسجيل:

دكسل م. ص.

متلازمة السيروتونين التي من الممكن أن تتمثل بتغير في الوعي النفسي (تشمل الأعراض التالية: عدم هدوء، هلاوس، غيبوبة (coma) وتأثيرات أخرى مثل حمى، ارتفاع في ضغط اللثقل، ضعف دم غير مسفر، تشنجات غير ارادية لتصلب في العضلات، قلة التنفس)
والأو أعراض بالجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال) (انظر للبلد