

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פנטאמד 100 מק"ג
פנטאמד 200 מק"ג
פנטאמד 300 מק"ג
פנטאמד 400 מק"ג
פנטאמד 600 מק"ג
פנטאמד 800 מק"ג

טבליות תת לשוניות

הרכב:

כל טבליה תת לשונית מכילה:
החומר הפעיל וכמותו:

פנטאמד 100 מק"ג: פנטניל (כציטראט) * Fentanyl (as citrate) micronized 100 mcg
פנטאמד 200 מק"ג: פנטניל (כציטראט) * Fentanyl (as citrate) micronized 200 mcg
פנטאמד 300 מק"ג: פנטניל (כציטראט) * Fentanyl (as citrate) micronized 300 mcg
פנטאמד 400 מק"ג: פנטניל (כציטראט) * Fentanyl (as citrate) micronized 400 mcg
פנטאמד 600 מק"ג: פנטניל (כציטראט) * Fentanyl (as citrate) micronized 600 mcg
פנטאמד 800 מק"ג: פנטניל (כציטראט) * Fentanyl (as citrate) micronized 800 mcg

*שעבר מיקרוניזציה

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה. התרופה מיועדת למבוגרים מעל גיל 18.

• נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, תרופות אחרות המדכאות מערכת עצבים מרכזית (כולל סמים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושת ישנוניות עמוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ומוות.
• תרופות ממשפחת האופיאטים עלולות לגרום להתמכרות, בעיקר בשימוש ממושך, והינן בעלות פוטנציאל לשימוש לרעה ולמינון יתר. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית ואף לגרום למוות. וודא כי הינך מכיר את שם התרופה, המינון שהינך לוקח, תדירות המתן, משך הטיפול, תופעות הלוואי והסיכונים הפוטנציאליים. מידע נוסף אודות הסיכון לתלות והתמכרות ניתן למצוא בקישור:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

1. למה מיועדת התרופה?

פנטאמד מיועד לטיפול בכאב מתפרץ בחולים אונקולוגים אשר מטופלים בתרופות חזקות לשיכוך כאבים (אופיאטים) בקביעות. כאב מתפרץ הוא כאב שמופיע באופן פתאומי, למרות שהינך משתמש באופן קבוע בתרופה אופיאטית לשיכוך כאבים.

קבוצה תרפויטית: החומר הפעיל בטבליות תת לשוניות פנטאמד הינו פנטניל. פנטניל משתייך לקבוצת תרופות נרקוטיות חזקות המשמשות לשיכוך כאבים אשר נקראת אופיאטים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל, פנטניל, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").
- אם הינך סובל מבעיות נשימה חמורות.
- אם אינך משתמש בקביעות בתרופת מרשם מסוג אופיאט מידי יום ובזמנים קבועים במשך שבוע לפחות לצורך שליטה על כאבך המתמשך (לדוגמה תרופות אופיאטיות כגון: קודאין, פנטניל, הידרומורפון, מורפין, אוקסיקודון, פתידין). אם אינך משתמש בתרופה מסוג זה, **אסור לך** להשתמש בפנטאמד מכיוון שהתרופה עלולה להעלות את הסיכון לנשימה איטית באופן מסוכן ו/או שטחית, או להפסקת נשימה.
- אם אתה סובל מכאב קצר טווח השונה מכאב מתפרץ.
- אם הינך מטופל בתרופות המכילות סודיום אוקסיבט.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- **ספר לרופאך או לרוקח לפני הטיפול אם הינך סובל או סבלת בעבר מהמצבים הבאים, מכיוון שרופאך יצטרך להתחשב במידע זה בהתאמת המינון עבורך:**
 - חבלת ראש, משום שפנטאמד עלול למסך את חומרת החבלה.
 - בעיות נשימה או אם הינך סובל ממחלת חולשת השרירים (מיאסטניה גרביס).
 - אם הינך סובל מבעיות לב ובמיוחד אם הינך סובל מקצב לב איטי.
 - לחץ דם נמוך.
 - מחלת כבד או כליות, יתכן ורופאך יצטרך להתאים מינון ביתר זהירות.
 - גידול במוח ו/או עלייה בלחץ תוך גולגולתי (עלייה בלחץ במוח הגורמת לכאבי ראש חזקים, בחילות/הקאות וטשטוש ראייה).
 - כיבים בפה או דלקת רירית הפה (נפיחות ואודם בחלל הפה).
 - אם הינך נוטל תרופות נגד דיכאון או פסיכואזה, קרא בעיון את הסעיף הבא, "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות".
 - אם אי פעם פיתחת אי ספיקת יותרת הכליה או חוסר בהורמוני מין (חסר באנדרוגן) עם שימוש באופיאטים.

בתקופת הטיפול בפנטאמד, עליך להודיע לרופא או לרופא השיניים שהינך מטופל בתרופה זו, אם:

- אתה עתיד לעבור ניתוח כלשהו.
- אתה חווה כאב או רגישות מוגברת לכאב (hyperalgesia) אשר אינם מגיבים למינון גבוה יותר של התרופה כפי שנקבע על ידי הרופא.
- אתה סובל משילוב של התסמינים הבאים: בחילות, הקאות, אנורקסיה, עייפות, חולשה, סחרחורות ולחץ דם נמוך. שילוב תסמינים אלה עשוי להוות סימן למצב של סכנת חיים אפשרית הקרויה בשם אי ספיקת יותרת הכליה, מצב שבו בלוטות האדרנל אינן מייצרות מספיק הורמונים.

ייתכן שהרופא שלך יצטרך לבדוק אותך בצורה זהירה יותר אם:

- אתה או מישהו מבני משפחתך אי פעם השתמשתם לרעה או סבלתם מתלות באלכוהול, תרופות מרשם או סמים אסורים ("התמכרות")
- אתה מעשן
- אם סבלת מבעיות במצב רוח (דיכאון, חרדה או הפרעת אישיות) או שטופלת על ידי פסיכיאטר בגלל מחלות נפשיות אחרות

שימוש חוזר בפנטאמד עלול להוביל לתלות ולשימוש לרעה אשר עלולים לגרום למינון יתר מסכני חיים. חשוב שתתייעץ עם רופא אם אתה דואג שאתה עלול לפתח תלות בפנטאמד.

בעיות נשימה הקשורות לשינה

פנטאמד עשוי לגרום לבעיות נשימה הקשורות לשינה, כגון דום נשימה בשינה (הפסקות נשימה בזמן השינה) והיפוקסמיה בזמן השינה (רמת חמצן נמוכה בדם). התסמינים עלולים להיות: הפסקות נשימה בשינה, התעוררות בלילה עקב קוצר נשימה, קושי להמשיך לישון או נמנום מוגבר במהלך היום. אם אתה או מישהו אחר שמתם לב לתסמינים אלו, פנה אל הרופא. הרופא עשוי לשקול הפחתת מינון.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

תרופות מסויימות עלולות להגדיל או להקטין את ההשפעות של פנטאמד. לכן ספר לרופא אם אתה מתחיל טיפול, משנה מינון או מפסיק את הטיפול עם התרופות הבאות מכיוון ויתכן והרופא יצטרך להתאים את המינון של פנטאמד:

- תרופות אנטי פטרייטיות המשמשות לטיפול בזיהומים פטרייטיים, לדוגמה קטוקונאזול או איטראקונאזול.
- אנטיביוטיקות מקבוצת המאקרולידיים המשמשות לטיפול בזיהומים, לדוגמה אריתרומיצין.
- תרופות אנטי ויראליות השייכות למשפחת מעכבי האנזים פרוטאז המשמשות לטיפול בזיהומים הנגרמים ע"י וירוסים, לדוגמה ריטונאביר.
- ריפאמפין או ריפאבוטין (תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים חיידיקיים).
- קארבאמאזפין, פניטואין או פנובארביטאל (תרופות המשמשות לטיפול בעוויתות/פרכוסים).
- תרופות ממקור צמחי המכילות היפריקום [St John's wort (*Hypericum perforatum*)].
- תרופות המכילות אלוהול.
- תרופות ממשפחת מעכבי האנזים מונואמין אוקסידאז (MAOI), המשמשות לטיפול בדיכאון חמור ובמחלת פרקינסון. דווח לרופאך אם נטלת תרופה מסוג זה בשבועיים האחרונים.
- סוגים מסויימים של משככי כאבים חזקים, הנקראים אגוניסטים/אנטגוניסטים חלקיים לדוגמה בופרנורפין, נלבופין ופנטזוצין. ייתכן ותחוש תסמינים של תסמונת גמילה (כגון בחילה, הקאות, שלשול, חרדה, צמרמורת, רעד והזעה) בזמן השימוש בתרופות אלה.

פנטאמד עלול להגביר את השפעתן המרדימה של התרופות הבאות (תרופות הרגעה) ובנוסף להגביר את הסיכון לדיכוי נשימתי וירידה בלחץ הדם:

- תרופות אחרות לשיכוך כאבים חזקים (תרופות ממשפחת האופיאטים לשיכוך כאבים או שיעול)
- משככי כאבים לכאבים עצביים (גאבאפנטין ופריגאבאלין)
- תרופות להרדמה כללית (המיועדות להרדמה בזמן ניתוחים)
- תרופות להרפיית שרירים
- תרופות להשריית שינה
- תרופות לטיפול ב:◀
- דיכאון
- אלרגיות (אנטיהיסטמינים מרדימים חוסמי H1)
- חרדות ופסיכוזא (תרופות ממשפחת הברביטורטים, בנזודיאזפינים, למשל דיאזפאם, תרופות משרות שינה או נוגדות חרדה)
- תרופות המכילות קלונדין (לטיפול ביתר לחץ דם)

השימוש בפנטאמד במקביל לשימוש בתרופות שגורמות לך להרגיש ישנוני (תרופות הרגעה) כמו בנזודיאזפינים, מגביר את הסיכון לנמנום, קשוי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ועשוי להיות מסכן חיים. לכן, יש לשקול שימוש בפנטאמד יחד עם תרופות הרגעה רק כאשר אין אפשרויות טיפול אחרות. אך אם הרופא בכל זאת מחליט על שימוש בפנטאמד יחד עם תרופות הרגעה, המינון ומשך הטיפול צריכים להיות מוגבלים ע"י הרופא.

אנא ספר לרופא על כל תרופות ההרגעה שאתה נוטל, ועקוב בקפידה אחר המינון שהומלץ לך על ידי הרופא. ייתכן שיהיה מועיל ליידע חברים או קרובי משפחה על מנת שיהיו מודעים לסימנים ולתסמינים המפורטים לעיל. צור קשר עם הרופא כאשר אתה חווה תסמינים כאלה.

הסיכון לתופעות לוואי מסוימות אחרות עולה אם אתה נוטל תרופות כגון נוגדי דיכאון או אנטי פסיכוטיים, מכיוון שתיתכן תגובה בין תרופתית המתבטאת בשינויים במצב הנפשי [לדוגמה אגיטציה (אי שקט), הזיות, תרדמת (קומה)], ותופעות אחרות כגון חום גבוה מעל 38°C , עלייה בקצב לב, לחץ דם לא יציב ורפלקסים מוגברים, נוקשות שרירים, חוסר קואורדינציה ו/או תופעות במערכת העיכול (לדוגמה בחילות, הקאות, שלשול). במקרה זה, הרופא ייעץ לך אם פנטאמד מתאימה עבורך.

שימוש בתרופה יחד עם מזון ושתייה

מיץ אשכוליות עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי של פנטאמד ולכן אין לשתות מיץ אשכוליות בזמן הטיפול בפנטאמד.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

פנטאמד עלול לגרום לנמנום במטופלים מסוימים. אין לצרוך אלכוהול בעת הטיפול בתרופה מבלי להיוועץ ברופא כיוון שעלול להיגרם נמנום יתר.

הריון והנקה

אין להשתמש בפנטאמד אם הינך בהריון, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש ע"י הרופא מכיוון שפנטניל עלול לגרום לתסמיני גמילה בילוד ולסכן את חייו. אין להניק במהלך הטיפול בפנטאמד, ואין להתחיל להניק לפני שחלפו לפחות 5 ימים מהמנה האחרונה של פנטאמד. פנטניל יכול לעבור לחלב אם ועלול לגרום לישנוניות ודיכוי נשימתי בתינוק היונק. **אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני שימוש בתרופות.**

נהיגה ושימוש במכונות

פנטאמד עלול לפגוע ביכולתך הנפשית ו/או הפיזית לבצע משימות בעלות סיכון אפשרי כגון נהיגה או הפעלת מכונות. אם הינך מרגיש סחרחורת, טשטוש ראייה או נמנום בזמן שימוש בפנטאמד, אין לנהוג ברכב או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פנטאמד מכיל נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

לפני התחלת הטיפול בפנטאמד רופאך יסביר לך כיצד עליך לקחת פנטאמד על מנת להשיג הקלה יעילה בכאב מתפרץ. יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. התכשיר מיועד לשימושך בלבד לפי הנחיות רופאך. **התכשיר אסור לשימוש באדם אחר**

מלבדך, משום שהוא עלול להוות סיכון חמור לבריאות, במיוחד בילדים.
פנטאמד הוא תרופה שונה מתרופות אחרות שיתכן ונטלת בעבר לטיפול בכאב מתפרץ. **תמיד יש ליטול פנטאמד במינון הנקבע לך על ידי רופאך** - מינון זה יכול להיות שונה מהמינון של תרופות אחרות שנטלת בעבר לטיפול בכאב מתפרץ.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

התחלת הטיפול - מציאת המינון המתאים ביותר
על מנת שפנטאמד יפעל ביעילות, על הרופא לזהות את המינון המתאים ביותר לטיפול בכאבך המתפרץ. פנטאמד משווק במספר מינונים. ייתכן ותידרש לנסות מינונים שונים של פנטאמד במשך מספר התקפים של כאב מתפרץ על מנת למצוא את המינון המתאים ביותר עבורך. רופאך יעזור לך בזאת וידריך אותך כיצד למצוא את חוזק הטבליה המתאים ביותר. אם אינך חש בהקלה מספקת בכאב לאחר מנה אחת, ייתכן ורופאך ידריך אותך ליטול מנה נוספת לטיפול בהתקף של כאב מתפרץ.

אין ליטול מנה נוספת, אלא אם כן רופאך הורה לך, משום שהדבר עלול להביא לצריכת מינון יתר.

ייתכן ורופאך יורה לך ליטול מנה הכוללת יותר מטבליה אחת ברצף. **ניתן לעשות זאת רק אם הרופא הורה על כך מפורשות.**

יש להמתין שעתיים לפחות מנטילת המנה האחרונה של פנטאמד ועד נטילת המנה הבאה לטיפול בהתקף נוסף של כאב מתפרץ.

מנת אחזקה (המשך הטיפול) - לאחר שנמצא המינון המתאים ביותר עבורך
ברגע שאתה ורופאך מצאתם את מנת הפנטאמד ששולטת בכאבך המתפרץ, אין ליטול מנה זאת יותר מארבע פעמים ביום. **מנת פנטאמד יכולה להכיל יותר מטבליה אחת.** יש להמתין שעתיים לפחות מנטילת מנת הפנטאמד האחרונה ולפני נטילת המנה הבאה לטיפול בהתקף נוסף של כאב מתפרץ. אם לדעתך מנת הפנטאמד שהינך נוטל אינה שולטת בכאב המתפרץ שלך באופן מספק, דווח לרופאך, ייתכן ויש צורך להתאים מנה מחדש. אין לשנות מינון פנטאמד, אלא אם כן נאמר מפורשות ע"י הרופא. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

אופן השימוש:

פנטאמד מיועד לשימוש מתחת ללשון. יש להניח את הטבליה מתחת ללשון, שם היא תתמוסס במהירות, וכך החומר הפעיל, פנטניל, ייספג ברירית הפה. כאשר נספג, פנטניל מתחיל לשכך את הכאב.

כאשר הינך סובל מכאב מתפרץ, קח את המנה שנקבעה על ידי רופאך באופן הבא:

- אם פירך יבש, לגום מים בכדי ללחלחו. ניתן לירוק או לבלוע את המים.
- מקם את הטבליה מתחת ללשון אחורה ככל האפשר עד להמסתה המלאה.
- פנטאמד יתמוסס במהירות מתחת ללשון וייספג על מנת להקל על הכאב.

אין למצוץ, לחצות, לכתוש, ללעוס או לבלוע את הטבליה.
יש להניח את הטבליה בשלמותה מתחת ללשון.
אין לשתות או לאכול עד להמסה מלאה של הטבליה מתחת ללשון.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:

- יש להוציא מיד שאריות התרופה מהפה.
- ספר על כך למטפל שלך או לאדם אחר.

•פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אתך. על המלווה של המטופל לשמור על ערנות המטופל באמצעות דיבור עימו או נענועו מידי פעם.

תסמינים של מינון יתר כוללים:

- נמנום קיצוני
 - נשימה שטחית ואיטית
 - תרדמת
- במידה ותסמינים אלו מופיעים יש להזעיק סיוע חירום רפואי מיד.

אם בטעות נטל מבוגר או ילד מן התרופה, יש להפנותו מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אם אינך סובל יותר מכאב מתפרץ, אתה יכול להפסיק את השימוש בפנטאמד, אך עליך להמשיך להשתמש בתרופה האופיאטית הקבועה שלך לטיפול בכאב מתמשך על פי הוראות רופאך.

אם אתה מפסיק ליטול פנטאמד, ייתכן ותסבול מתופעות גמילה הדומות לתופעות הלוואי של פנטאמד.

אם הינך סובל מתופעות גמילה או מודאג משיכוך כאבך, עלייך להיוועץ ברופא. הרופא ישקול האם יש לך צורך בתרופה לטיפול בתופעות גמילה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

אם הינך מרגיש מנומנם באופן קיצוני או בלתי רגיל, או שנשימתך נעשית איטית או שטחית, יש לפנות מיד לרופא או להגיע לבית החולים הקרוב לקבלת טיפול דחוף (ראה גם סעיף 3 "אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר").

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה:
•בחילות

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100:
•סחרחורת, כאבי ראש, נמנום יתר
•קוצר נשימה
•דלקת בחלל הפה, הקאות, עצירות, יובש בפה
•הזעה, לאות/עייפות/חוסר אנרגיה

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000:
•תגובות אלרגיות, רעד, הפרעות בראייה או טשטוש ראייה, האטה או האצה בקצב לב,

לחץ דם נמוך, איבוד זיכרון
•דיכאון, מחשבות חשדניות או הרגשת פחד ללא סיבה, הרגשת בלבול, הרגשת חוסר התמצאות, הרגשת חרדה/חוסר שקט/עצב, תחושת שמחה יוצאת דופן (אופוריה), שינויים במצב הרוח
•הרגשת מלאות מתמשכת, כאב בטן, קלקול קיבה
•כיבים בפה, בעיות בלשון, כאב בפה או בגרון, לחץ בגרון, כיבים בשפתיים או בחניכיים
•איבוד תיאבון, איבוד או שינוי בחוש הטעם/ריח
•יקושי להירדם או הפרעות בשינה, חוסר שימת לב/להיות מוסח בקלות, חוסר אנרגיה/חולשה
•הפרעות בעור, פריחה, גרד, הזעת לילה, רגישות ירודה למגע, נטייה להיחבל בקלות
•כאב או נוקשות במפרק, נוקשות שרירים
•תסמיני גמילה מסמים (כגון בחילה, הקאות, שלשול, חרדה, צמרמורת, רעד, הזעה), נטילת מינון יתר בטעות, בגברים: אי יכולת להגיע ו/או לשמור על זקפה, הרגשה כללית לא טובה.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

•לשון נפוחה, בעיות נשימה חמורות, נפילות, הסמקה, תחושת חמימות יתר, שלשול, פרכוסים (עוויתות), נפיחות של הידיים או הרגליים, ראייה או שמיעה של דברים שלא קיימים במציאות (הזיות), חום, תלות בסם (התמכרות), שימוש יתר בסם, ירידה ברמת ההכרה או אובדן הכרה, פריחה מגרדת ודליריום (תסמינים עשויים לכלול שילוב של אגיטציה, חוסר שקט, חוסר התמצאות, בלבול, פחד, ראייה או שמיעה של דברים שלא קיימים במציאות, הפרעות שינה, סיוטים).

שימוש ממושך בפנטניל במהלך ההריון עלול לגרום לתסמיני גמילה בילוד אשר עלולים להיות מסכני חיים (ראה סעיף 2).

דיווח תופעות לוואי

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

•מנע הרעלה! פנטאמד הינו תרופה חזקה מאוד לשיכור כאבים שעלולה לסכן חיים אם נלקחה בטעות על ידי ילד. לכן, יש לשמור תרופה זו וכל תרופה אחרת במקום סגור ונעול מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

•מומלץ לשמור תרופה זו במקום נעול.

•אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית והמגשית (בליסטר). תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

•תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

•כיצד להיפטר מטבליות שאין בהן שימוש? אם נשאר לך טבליות פנטאמד שאין בהן צורך יותר, יש למסור אותן לבית המרקחת הקרוב בכדי להשמידן בצורה בטוחה ובכך להגן על הסביבה. אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית.

6. מידע נוסף

•נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Mannitol, silicified microcrystalline cellulose, magnesium stearate, croscarmellose sodium.

•כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

פנטאמד הינו טבליה לבנה קטנה למתן מתחת ללשון. הטבליה מגיעה במגוון חוזקים וצורות שונות. רופאך ירשום לך את החוזק ואת מספר הטבליות המתאימים לך.

טבלית פנטאמד 100 מק"ג היא טבליה לבנה עגולה
טבלית פנטאמד 200 מק"ג היא טבליה לבנה בצורה אליפטית
טבלית פנטאמד 300 מק"ג היא טבליה לבנה בצורת משולש
טבלית פנטאמד 400 מק"ג היא טבליה לבנה בצורת יהלום
טבלית פנטאמד 600 מק"ג היא טבליה לבנה בצורת האות "D"
טבלית פנטאמד 800 מק"ג היא טבליה לבנה בצורת קפסולה

פנטאמד משווק באריזות של 30 טבליות. הטבליות ארוזות במגשיות (בליסטרים).

•שם בעל הרישום וכתובתו: אינובמד פארמה בע"מ, ת.ד. 2349, בני ברק.

•שם היצרן וכתובתו:

קרן פארמה, ס.ל. טראסה, ברצלונה, ספרד.

נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

•מספרי רישום התרופות בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פנטאמד 100 מק"ג 173-43-36706

פנטאמד 200 מק"ג 173-44-36707

פנטאמד 300 מק"ג 173-45-36708

פנטאמד 400 מק"ג 173-46-36709

פנטאמד 600 מק"ג 173-47-36710

פנטאמד 800 מק"ג 173-48-36711

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.