



עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקנירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## נרגיג טבליות 2.5 מ"ג

כל טבלייה מצופה מכילה: נארטריפטאן (כהידרוולוריד) 2.5 מ"ג  
naratriptan (as hydrochloride) 2.5 mg.

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוספים".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

נרגיג טבליות 2.5 מ"ג מכונה בעلون זה "נרגיג".

נרגיג אינה מומלצת לילדים מתחת לגיל 18 ולמבוגרים מעל גיל 65.

### 1. למה מירועת התרופה?

נרגיג משמשת לטיפול במיגרנה.

תסמנני מיגרנה עלולים לגרום על-ידי התרחבות זמנית של כלי דם בראש. נרגיג מפחיתה את התרחבות כלי דם אלה. זה מאפשר מסיע לשכך את כאב הראש ולהקל על תסמננים אחרים של התקף מיגרנה, כגון בחילה או הקאה ורגשות לאור ולcold.

#### קבוצה תרפואיית:

נרגיג מכילה נארטריפטאן (כהידרוולוריד), השיריך לקבוצת תרופות הנקראט טריפטאנים (נקראת גם אгонיסטים סלקטיביים לסרוטוניין 5-HT<sub>1</sub>).

### 2. לפני השימוש בתרופה

#### אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לנארטריפטאן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בסעיף 6).
- אם יש לך בעית לב, כגון אי-ספיקת לב או כאבים בחזה (תשוקת חזה), או אם היה לך התקף לב.
- אם יש לך בעיות בזרימת הדם ברגליך אשר גורמות לכאבים דמווי התכווצות בזמן שאתה הולך (מחלת כלי דם היקפיים).
- אם היה לך שבע מוחי או שבע מוחי חולף (מכונה גם התקף איסכמי חולף או A/T).
- אם יש לך לחץ דם גבוה (ייתכן שתוכל ליטול נרגיג אם לחץ הדם הגבוה שלך הוא מתון ומטופל).
- אם יש לך מחלת כליות אוCBD.
- עם תרופות אחרות למיגרנה, כולל אלו המכילות ארגוטאמין, או עם תרופות דומות, כגון מתיסרגיד או עם אgonיסטים אחרים לcolestan 5-HT<sub>1</sub>, כמו סומאטריפטאן.  
אם אחד מ אלה חל עליך:  
← פנה לרופא שלך, ואל תikh נרגיג.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

**לפני הטיפול בнерמיג, ספר לרופא אם:**

**יש לך גורמי סיכון נוספים כלשהם**

**• אם הינך מעשן כבד או משתמש בטיפול בתחלפי ניקוטין, ובמיוחד**

**• אם הינך גבר מעל גיל 40,** או

**• אם הינך אישה לאחר גיל המעבר.**

במקרים נדירים מאוד, אנשים פיתחו בעיות לב חמורות לאחר נטילת נרמיג, אף על פי שלא היו להם סימנים של מחלת לב לפני השימוש בתרופה.

אם אחת מהנקודות ברשימה מתיחסת אליך, ייתכן שיש לך סיכון גדול יותר לפתח מחלת לב – לכן:

← **ספר לרופא שלך כדי שתפקיד הלב שלך יוכל לבדוק לפני שנרמיג נרשם עבורה.**

**אם אתה אלרגי לאנטיביוטיקות הנקרואות סולפונאמידים**

במקרה זה, ייתכן שתיה אלרגי גם לנרמיג. אם אתה יודע שאתה אלרגי לאנטיביוטיקה

**אך אין בטוח אם היא סולפונאמיד:**

← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני נטילת נרמיג.**

**אם אתה לוקח נרמיג לעיתים קרובות**

נטילה תכופה מדי של נרמיג עלולה להחמיר את כאבי הראש שלך.

← **ספר לרופא שלך אם חווית זאת.** הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק לחת נרמיג.

**אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה לוקח נרמיג**

תופעות אלה עלולות להיות עצות אך הן בדרך כלל חולפות במהירות. אם איןן חולפות במהירות, או שהן חמימות:

← **פנה מיד לקבالت עזרה רפואית.** סעיף 4 של עلون זה כולל מידע נוסף על תופעות לוואי אפשריות אלה.

מקרים של עיורון חולף או קבוע, או אובדן ראייה חלקי משמעותית, דווחו בעת שימוש באגוניסטים סלקטיביים לסרוטוניין (5-HT<sub>1</sub>). הקשר הסיבתי בין תופעות אלו לבין השימוש באגוניסטים סלקטיביים לסרוטוניין (5-HT<sub>1</sub>) לא נקבע במפורש מכיוון שהפרעות ראייה יכולות להיות חלק מהתקף מיגרנוצי.

**אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות**

ישנן תרופות שאסורה לחת יחד עם נרמיג ואחרות עלולות לגרום לתופעות לוואי אם הן נלקחות יחד עם נרמיג.

**אם אתה לוקח, או אם אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

**• תרופות כלשהן למיגרנה שלך אשר מכילות טריפטאן/אגוניסט 5-HT<sub>1</sub>-1agonist.** כגון סומאטריפטאן או זולמייטריפטאן. אל תikhך נרמיג באותו זמן עם תרופות אלה. הפסק לחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני נטילת נרמיג.

**• ארגוטאמין** שם משמש לטיפול במיגרנה או תרופות דומות, כגון מתיסרגיד. אל תikhך נרמיג באותו זמן עם תרופות אלה. הפסק לחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני נטילת נרמיג.

**• נוגדי דיכאון** כלשהם המשמשים כמעכבים סלקטיביים של ספיגה חומרת של סרוטוניין (SSRIs), כגון ציטלופראם, פלאוקסטין או פארוקסטין, או כמעכבים של ספיגה חומרת של סרוטוניין ונוראפינפרין (SNRIs) כגון נולפאקסין. אם אין בטוח, פנה לרופא או לרוקח שלך.

**• היפריקום (Wort's John St.)** לטיפול בדיכאון. שימוש בתרופות צמחיות המכילות היפרילcum בזמן שאתה לוקח נרמיג עלול להעלות את הסבירות לתופעות לוואי.

## היריון והנקה

- אם את בהיריון או מניקה, חושבת שיתכן שאת בהיריון או אם את מתכונת להרhot, התיעצzi עם הרופא לפני השימוש בתרופת זו. יש מידע מוגבל בלבד על הבטיחות של נרמיג לנשים בהיריון, אם כי עד כה אין ראייה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדמים. הרופא שלך עשוי להמליץ שלא תיקח נרמיג בזמן שאת בהיריון.
- **אל תנייקי את תינוקך במשך 24 שעות לאחר נטילת נרמיג.** אם את שואבת חלב במהלך זמן זה, השליכי את החלב ואל תתני אותו לתינוקך.

## נigua ו שימוש במכונות

- התרופת שלך או תסמיini המיגרנה עלולים לגרום לך לנמנום. אם אתה מושפע, אל תנגה או תעשייל מכונות.

## מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופת נרמיג מכילה לקטוז

- נרמיג מכילה כמוות קטנה של סוכר הנקרא לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שלך שיש לך אי-סכנות לסוכרים מסוימים:  
← פנה לרופא שלך לפני נטילת נרמיג.

נרמיג מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל טבליה **לכן ניתן לומר כי היא למעשה 'נטולת נתרן'.**

## 3. כיצד השתמש בתרופת?

קח נרמיג רק לאחר שכאב הראש המיגרנוטי שלך מתחילה.  
**אל תייח נרמיג כדי לנסות למנוע התקף.**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. عليك לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

## כמה לקחת

- המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המקובל הוא:  
• **המננה המקובלת למבוגרים בגילאי 18 עד 65** היא טבליה אחת של נרמיג.

## צורת הנטילה

יש ליטול את הטבליה בשלהמתה עם מים.  
אסור לכתחוש/לחצוץ/ללעוס את הטבליה.

narmitig אינה מומלצת לילדים מתחת לגיל 18 ולמבוגרים מעל גיל 65.  
**אין לעבור על המנה המומלצת.**

## מתי לקחת נרמיג

- **עדיף לקחת נרמיג מיד כשאתה מרגיש שמיגרנה מתחילה,** אם כי ניתן לקחת אותה בכל זמן במהלך התקף.

## אם תסמיini המיגרנה חוזרים

- אתה יכול לקחת טבליה שנייה של נרמיג לאחר 4 שעות, אלא אם כן יש לך נזק בклיות או בכבד.

- **אם יש לך נזק בклיות או בכבד אל תייח יותר מטבליה אחת ב-24 שעות.**
- **אין ליטול יותר משתי טබליות ב-24 שעות.**

## אם לטבליה הראשונה אין השפעה

- **אל תייח טבליה שנייה לאוותו התקף.**

אם נרמיג לא הקלה עלייך:

← פנה לרופא או לרוקח שלך לקבלת ייעוץ.

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר

• אל תיקח יותר משתי טבליות נרמיג ב-24 שעות.

נטילה של יותר מדי נרמיג עלולה לגרום לך לחЛОות. אם לקחת יותר משתי טבליות נרמיג ב-24 שעות:

← **פנה לרופא שלך.**

אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעלך מן התרופת, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופתאיתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם שהינך לוקח תרופה.** הרכב משקפיים אם הינך צריך להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

#### 4. **תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בнерמיג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מ אף אחת מהן.

פנה לרופא שלך מיד אם אתה מביחס באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות –  
ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף:

• הדופק עלול להיות מהיר יותר, איטי יותר או לשנות את הקצב (מופייה ב-עד 1 מתוך 100 אנשים).

• כאב באזן התחתון השמאלי של הבطن ושלשול דמי (דלקת איסכמית של המעי הגס – מופייה ב-עד 1 מתוך 1,000 אנשים).

• תגobaה אלרגית (מופייה ב-עד 1 מתוך 1,000 אנשים). **סימני האלרגיה כוללים פריחה; חרלה (גבושיםות מגדרות); גרד; צפיפות בנשימה; עפיפות, פנים או שפתיים נפוחים; התמוטטות.**

אם אתה חש באחד מהתסминים אלה זמן קצר אחרי נטילת נרמיג:  
← אל תיקח יותר. פנה מיד לרופא.

• כבדות, לחץ או כאב בחזה, בגיןו או בחלקים אחרים של הגוף (מופייה ב-עד 1 מתוך 100 אנשים). תופעות אלה עלולות להיות עזות אך בדרך כלל חולפות במהירות.

אם תופעות אלה ממשיכות או חמימות (במיוחד הכאב בחזה):

← קבל עזרה רפואי בדחיפות. במספר קטן מאוד של אנשים תס敏ינים אלה יכולים להגרם על-ידי התקף לב.

#### توفעות לוואי נוספות

**توفעות לוואי שכיחות (common) – توفעות שמופיעות ב-עד 1 מתוך 10 אנשים:**

• בחילה או הקאה, אם כי זה עלול להיות עקב המיגרנה עצמה.

• עיריפות, נמנום או ישנוניות, או הרגשה כללית לא טוביה.

• סחרחות, תחושת עקצוץ או הופעת גלי חום.

אם אתה חש באחת מהתופעות האלה:

← **פנה לרופא או לרוקח שלך.**

**توفעות לוואי לא שכיחות (uncommon) – توفעות שמופיעות ב-עד 1 מתוך 100 אנשים:**

•  **הפרעות בראייה** (אם כי עלולות להיות בגל התקף המיגרנה עצמו).

• **עליה קלה בלחץ הדם** אשר עלולה להתרחש עד ל-12 שעות לאחר נטילת נרמיג.

אם אתה חש באחת מהתופעות האלה:

← פנה לרופא או לרוקח שלך.

**תופעות לוואי נדירות מאד (very rare) – תופעות שMOVED מ-1 מתוך 10,000 אנשים:**

- **בעיות לב**, כולל כאבים בחזה (תעוקת חזה) והתקף לב.
- **זרימת דם לкорיה לידיים ולרגליים**, הגורמת כאב ואי נוחות.  
אם יש לך סימנים אלו:  
← **פנה לרופא או לרוקח שלך.**

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעلون, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לkishor: <https://sideeffects.health.gov.il/>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוחה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-30°C.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

## 6. מידע נוסף

- **בנוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**  
ליבת הטבלייה:

Microcrystalline cellulose, anhydrous lactose, croscarmellose sodium, magnesium stearate.

ציפוי הטבלייה:

Methylhydroxypropylcellulose, titanium dioxide (E171), triacetin, iron oxide yellow (E172), indigo carmine aluminium lake (E132).

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:  
טבליות נרמיג הן ירוקות, מצופות פילם, בצורת האות "D", מוטבעות CE5 GX בצד אחד. הן זמינים באירועים בליסטר של 2 או 4 טבליות.  
יתכן שלא כל גדיי האירוע ישווקו.

- **בעל הרישום:** גלקסוסמיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.  
**יצרן:** גלקסוסמיטקלין טריידינג סרביסס לימייד, דבלין, אירלנד.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 113-42-29550-01.

- לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עلون זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.  
נערך באפריל 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK.

© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכיין שלה.

*Nar PT v6C*