

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

دكسامول كولد للعلاج في النهار،حبسولات

كل حبسولة تحتوي على:

باراسيتامول (Paracetamol) 325 ملغ،

جوافينيسين (Guafenesin) 200 ملغ،

سودوإيفيدرين هيدروكلوريد

(Pseudoephedrine hydrochloride) 25 ملغ،

دكستروميثورفان هيدروبروميد

(Dextromethorphan hydrobromide) 10 ملغ.

المواد غير الفعالة والمساعدة للصمادة في الدواء - انظر اللند 6 "معلومات إضافية" وللند 2 "معلومات مهمة حول قسم من مراكب الدواء".

أفرا هذه النشرة بأكملها يمتنع قبل استخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موزجة عن الدواء. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى فإسأل الطبيب أو الصيدلي. يعطى دواء الدواء دون الحاجة لوصفة طبية وهو مخصص للبالغين والأطفال فوق جبل 12 سنة. يجب عليك تناول الدواء وفقا للتعليمات الواردة في اللند 3 "كيفية استخدام الدواء" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

يجب التوجه للطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام من الزرع من استخدام الدواء أو في أي حالة تظهر فيها أعراض جديدة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

هذا الدواء مخصص لتخفيف أعراض الرشح، السعال واحتقان الأنف المرتبطة بسخونة والام- للعلاج في النهار.

الفصلية للعلاج:

باراسيتامول – مسكن للألام وخافض للسخونة.

جوافينيسين – طارد للبلغم.

سودوإيفيدرين – مخفف لاحتقان الأنف.

دكستروميثورفان – كابئ للسعال.

2. قبل العلاج بدكسامول كولد للعلاج في النهار، أخبر الطبيب لا تستخدم الدواء إذا:

- كنت حساسا (أرجي) للمكونات الشطة (باراسيتامول، جوافينيسين، سودوإيفيدرين، دكستروميثورفان أو لمضادات أخرى للاحتقان أو لأي من المكونات الأخرى التي يحتوي عليها هذا الدواء (انظر اللند 6).
- كنت تعالج بالتران بادوية من فصيلة مثبطات مونامين أو أكسيداز (MAOis) (العلاج للكتئاب) أو بادوية مثبطات مونامين أو أكسيداز عكوسة (RIMAs) أو خلال 14 يوما من وقف العلاج بها. إذا كنت تتناول أدوية من فصيلة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين الماضيين.
- إذا كنت تتناول أو تتناول خلال الأسبوعين الماضيين أدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية نفسية أدوية للحالات العاطفية أو أدوية لمرض الباركنسون.
- كنت تعالج في نفس الوقت بمضادات أخرى للاحتقان، أدوية إضافية للسعال والبرد.
- إذا كنت تتناول أدوية من فصيلة مضمرات بيتا (تستعمل لعلاج مشاكل القلب، ضغط الدم المرتفع).

- كنت تعاني من مرض في القلب أو فرط ضغط الدم.
- كان لديك مرض السكري.
- كنت طفلا عمرك أقل من 12 عامًا.
- كنت تعالج في نفس الوقت بمستحضرات أخرى تحتوي على باراسيتامول (إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الدواء الذي تتناوله يحتوي على باراسيتامول، فاستشر الطبيب أو الصيدلي).
- كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (الثيرويد).
- كنت تعاني من ارتفاع الضغط داخل العين (جلوكوما).
- كنت تعاني من مرض كلوي حاد.
- كنت تعاني من ورم الغايم (ورم نادر في الغدة الكظرية يؤثر على ضغط الدم ووتيرة القلب).
- كنت تتناول أدوية تحفز أو تثبط الشهية أو أدوية لعلاج الربو (أدوية محاكية الودي).

تحذيرات خاصة بشأن استخدام الدواء

- إذا كنت قد طورت في الماضي أعراضا جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على باراسيتامول، فلا تتجنب تناول مستحضرات تحتوي على باراسيتامول، لكي لا تسبب تآتية أعراضا جلدية شديدة.
- يجب توأستحضر على الباراسيتامول، والذي قد يسبب تلف الكبد عندما:
 - يعطى بجرعة أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة.
 - تم استهلاك مشروبات كحولية أثناء العلاج.
 - تم تناول أدوية أخرى تؤثر على عمل الكبد.
 - لا يجوز استخدام هذا الدواء في أوقات متقاربة دون استشارة الطبيب.
 - استشر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية أخرى خافضة للحرارة ولتسكين الالم أو الأدوية للرشح دون استشارة طبيب أو صيدلي لمنع جرة عفرطة أو التسهم من الباراسيتامول.
 - لا يجوز تناول أدوية أخرى من فصيلة دكسامول و/ أو غيرها من المستحضرات التي تحتوي على الباراسيتامول.
 - يجب تناول جرعة عالية (ضمن الحد الموصى به) من دواء أثناء الصوم.
 - إذا كنت حساسا لأي طعام أو دواء، يجب عليك إبلاغ الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
 - قد يؤدي تناول هذا الدواء بشكل دائم لفترة طويلة من الزمن إلى الإلزام. تناول هذا الدواء كما هو موصوف في هذه النشرة.

إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- مرض أو ضعف في الأداء الوظيفي للقلب و/ أو الأوعية الدموية (مثل: مرض الشرايين التاجية - انسداد الشرايين أو الأوردة)
- مرض أو ضعف في جهاز التنفس، مثل: الربو أو إذا كنت تعاني من نوبة ربو، يجب استمر لفترة طويلة، معال مصحوب بموى، طمخ جلدي وصداع مستمر
- مرض من حيث أو ضعف في الأداء الوظيفي للكبد
- مرض في الأداء الوظيفي للكلى
- مشاكل في التبول أو تصخم البروستاتا (تسبب إدرار أو بوترية عالية)
- ضعف في الأداء الوظيفي للغدة الدرقية (الثيرويد)
- ضعف في الأداء الوظيفي للبروستاتا
- إذا كنت متعلما على المواد الأفيونية أو الكحول أو العقاقير الموصوفة أو العقاقير المحظورة
- عانيت مؤخرا من أعراض الطعام من الكحول أو المخدرات مثل: اضطراب عاطفي، أو قلق، تعرق أو ارتخاف
- برقان

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تتولدت مؤخرا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية لا تستلزم وصفة طبية ومكحات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. يجب إسلط الطبيب أو الصيدلي بشكل خاص إذا كنت تتناول دواء من المجموعات التالية أو إذا أنهيت لتتو العلاج بالأدوية التالية:

- أدوية مضادة للكلولين (لعلاج التشنجات والتقلصات مثل أتروبين).
- أدوية من فصيلة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الاختيارية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين الماضيين (انظر اللند 2،3،4،5 يجوز استخدام الدواء إذا)
 - أدوية مضادة لتخثر الدم وخاصة وارفارين
 - أدوية مضادة للاكتئاب (بما في ذلك مثبطات MAO، RIMAs - انظر اللند 2، "في تستخدم الدواء") أو إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين الماضيين
 - مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات
 - أدوية للاكتئاب. لأمراض نفسية لحالات عاطفية أو لمرض الباركنسون أو إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين (انظر اللند 2،3،4،5 يجوز استخدام الدواء إذا)
 - موكلوباميد - دواء مضاد للاكتئاب
 - أدوية لخفض ضغط الدم مثل: غوانيثيدين، ميثيلدوبا، حاصرات الخاليا العصبية الأدرالية
 - أدوية لخفض ضغط الدم مثل: غوانيثيدين، ميثيلدوبا، حاصرات الخاليا العصبية الأدرالية
 - بريتيليوم وبينيتاينين أو غيرها من (adrenergic neuron blockers) ديريسوكوين.
 - بريتيليوم وبينيتاينين أو غيرها من (adrenergic neuron blockers) ديريسوكوين.
 - تستخدم الدواء (مثل: حاصرات بيتا - انظر اللند 2، 3، "في تستخدم الدواء") حاصرات ألفا أو معسكات الأوعية (الموسى) وأدوية القلب (مثل أمودارون، كينيدين).
 - المستحضرات التي تحفز نشاط الأيماث في الكبد (مثل: فينيتوين [الإفخلاجات، باربيورات]
 - أدوية مضادة للأختلاجات (علاج الصرع) مثل: فينيتوين، كاربامازيبين
 - ميثوكلوباميد أو دوميبريدون (علاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي)
 - كلورامفينيكول أو جوافينيسين (مضادات حيوية)
 - بروبيسيد (علاج القرص)
 - كوليسترامين (خفض مستوى الدهون في الدم)
 - مستحضرات مضادة لالتهاب جرد سينترويدي
 - أقراص منع الحمل
 - جلوكورتيكول القلب (الأدوية الستيرويدية

اضطرابات وتيرة القلب أو فشل القلب مثل ديجوكسين)
قوالبات الأروغ (Ergot alkaloids)- لعلاج الصداع النصفي مثل إريوغتامين أو مينيسبرجيد
كريبتينوسين (دواء يعطى أثناء الولادة لتقليلس الرحم)
تريبرينيد
أدوية لعلاج التهابات الفطرية
سينكاليبست لعلاج فرط نشاط ثانوي للعدة الدرقية
ميثادون
علاج الألم الشديد

يجب اعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ فوكلوكسيلين (مضاد حيوي) عقب إختطار وخيم لعدم السلامة في الدم والوسائل
metabolic acidosis
High anion gap
الذي يتطلب علاج عاجل وقد يحدث بالأخص في حالات تضمر كلوي وخيم، إلتان الدم (وضع تواجذ فيه البكتيريا وسومها في الدم وتؤدي لتضمر الأعضاء)، سوء تغذية، إلمان كحول مزمن، وفي حالات يتم فيها استعمال الجرعة اليومية القصوى من باراسيتامول.

يجب ابتلاع الحسولة مع الماء، يسمح بشطر الحسولة. لا توجد معلومات بخصوص مضغ أو سحق الحسولة.
السوائل
الذي يتطلب علاج عاجل وقد يحدث بالأخص في حالات تضمر كلوي وخيم، إلتان الدم (وضع تواجذ فيه البكتيريا وسومها في الدم وتؤدي لتضمر الأعضاء)، سوء تغذية، إلمان كحول مزمن، وفي حالات يتم فيها استعمال الجرعة اليومية القصوى من باراسيتامول.
إذا كانت تعاني أو عانيت في الماضي من:
مرض أو ضعف في الأداء الوظيفي للقلب و/ أو الأوعية الدموية (مثل: مرض الشرايين التاجية - انسداد الشرايين أو الأوردة)
مرض أو ضعف في جهاز التنفس، مثل: الربو أو إذا كنت تعاني من نوبة ربو، يجب استمر لفترة طويلة، معال مصحوب بموى، طمخ جلدي وصداع مستمر
مرض من حيث أو ضعف في الأداء الوظيفي للكبد
مرض في الأداء الوظيفي للكلى
مشاكل في التبول أو تصخم البروستاتا (تسبب إدرار أو بوترية عالية)
ضعف في الأداء الوظيفي للغدة الدرقية (الثيرويد)

ضعف في الأداء الوظيفي للبروستاتا
إذا كنت متعلما على المواد الأفيونية أو الكحول أو العقاقير الموصوفة أو العقاقير المحظورة
عانيت مؤخرا من أعراض الطعام من الكحول أو المخدرات مثل: اضطراب عاطفي، أو قلق، تعرق أو ارتخاف
الخطر لتلف الكبد

الحمل والإرضاع

لا يجوز استخدام هذا الدواء إذا كنت حاملا أو مرضعة. إذا كنت حاملا أو مرضعة، فتعتقدن أنك قد تكونين حاملا أو تخططين للحمل، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الدواء.

الاستخدام لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص للأطفال فوق جبل 12 سنة. انظر للند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج بأي أعراض جانبية أو دواء آخر يتم إعطاؤه للطفل.

السياسة واستخدام الآلات

قد يجعلك الدواء تشعر بالتعب والوار، ولذلك قد يؤثر على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات أو الآلات.

لا يجوز للسياسة أو تشغيل آلات حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك.
بالنسبة للأطفال، فيجب تحذير هم من ركوب الدراجة أو اللعب بالقرب من الشارع وما إلى ذلك.

معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء
يجتوي هذا الدواء على Ponceau 4R aluminum lake (E124)، والذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.
يجتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليوم من الصوديوم (ملغ) لكل حبسولة. أي أنه "خال من الصوديوم".

3. كيفية استخدام الدواء؟

يجب عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.
لا يأمر الطبيب بخلاف ذلك، فإن الجرعة المتبعة عادة هي:

البالغون والأطفال فوق جبل 12 سنة: 1-2 حبسولات، كل 4-6 ساعات، حتى 4 مرات في اليوم.
لا يجوز تجاوز جرعة تزيد عن 8 حبسولات في اليوم.
المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا: يجب استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الدواء.
لأنهم قد يكونوا حساسين لمستحضرات من هذا النوع
يجد استخدام الدواء المتزامن لدكسامول كولد للعلاج في الليل لا يجوز تجاوز جرعة يومية إجمالية من 8 حبسولات
يجد استخدام الدواء المتزامن لدكسامول كولد للعلاج في الليل، يجب استبدال جرعة دكسامول كولد للعلاج في النهار بجرعة دكسامول كولد للعلاج في الليل، وعدم تناولها كإضافة للجرعة القصوى الموصى بها
على أعلاه من دكسامول كولد للعلاج في النهار).
انتظر 4 ساعات على الأقل بين تناول جرعة واحدة والتي تليها.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.
يجب عليك التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام رغم استخدام الدواء أو في حال تظهر أعراض جديدة.

طريقة تناول:

يجب ابتلاع الحسولة مع الماء، يسمح بشطر الحسولة. لا توجد معلومات بخصوص مضغ أو سحق الحسولة.

إذا تناولت جرعة على غير طريق الخطأ
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، فغير إلتان الدم (وضع تواجذ فيه البكتيريا وغرفة الطوارئ في المستشفى وخيم ضرورة الدواء محلى.

إذا كان شعورك جيدا، فإن العلاج الفوري ضروري.
بسبب الخطر لتطور تلف شديد للكبد، يمكن أن تكون أعراض الجانبية: غثيان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية، الإلم في البطن، توروم، زيادة التعرق، أو حساسية في الجلد، الغثي من البطن وقد لا يمكن شدة الضرر للكبد.
تشنجات عضلية، تهيج نفسي، ارتباك، نعاس، ماسع بمسوى البيضة (أو العي)، حركات سريعة وغير إرادية لتعنين، مشاكل في القلب (وتيرة سريعة للقلب)، مشاكل في التنسيق، اضطراب عقلي جدا مصحوب بالارتباك، الميل إلى الانفعال الزائد.

إذا نسيت تناول الدواء، خذ الجرعة التالية حسب الحاجة.
شرطية أنه تم تناول الجرعة الأخيرة قبل 4 ساعات على الأقل من تناول الجرعة التالية. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول الأدوية في الغلازا! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء، ضع الظنارات إذا كنت في حاجة إليها.
إذا كنت لديك استجابة حول استخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يسبب استخدام دكسامول كولد للعلاج في النهار أعراضا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا

تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد تعاني من أي منها.

أعراض جانبية شديدة

يجب التوقف عن استخدام الدواء والتوجه للطبيب فورا عند ظهور ما يلي:

- ردود فعل تحسسية وخيمة التي تشمل طفح جلدي مثل الشرى (التي قد تكون مصحوبة ببنور وتقرش الجلد)، وحكة، تورم الوجه، الشفتين، الفم، اللسان، الحلق (التي قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع، تورم الأطراف وتيرة سريعة للقلب
- قد يسبب الباراسيتامول، في حالات نادرة، ظهور أمراض جلدية وخيمة يمكن أن تكون علاماتها: احمرار، طفح جلدي، بنور، تلف واسع للجلد. قد تظهر أعراض جانبية جلدية وخيمة حتى لو كنت قد تناولت في الماضي مستحضرات تحتوي على العنصر البراق باراسيتامول دون أي مشكلة. في حالة حدوث أعراض جانبية للجلد، توقف عن العلاج وتوجه للطبيب على الفور.

عدم راحة في البطن

دوار، نعاس، ارتباك

هلوسة (تدائر) (سماع أصوات ورؤية مشاهد غير موجودة، أفكار أو مشاعر غير منطقية)
مشكلة في التبول، خاصة عند الرجال الذين لديهم مشكلة في غدة البروستاتا
علامات التحورات في منظومة الدم مثل: التعب غير المرور، أنزفة، ظهور كدمات، تطور ثلوثات بسهولة أكبر.

وتيرة غير منتظمة للقلب، صداع مفاجي، الشثيد، غثيان، تقيؤات، إرتباك، إفخلاجات، اضطرابات في الرؤية

مفاجي وشديد في البطن أو نزيف في المستقيم (في إمداع الشرج) بسبب التهاب القولون نتيجة لعدم كفاية إفاة (Ischaemic colitis).
انخفاض تدفق الدم إلى القلب الذي يمكن أن يسبب نوبة صدرية (عدم راحة أو ألم في الصدر، في العنق، في الظهر، في الفك، في الكتفين، في الذراعين)، أو نوبة قلبية

سكتة دماغية (ضعف في الوجه، في الذراعين أو في الساقين أو مشاكل في النطق)

انذلاع الصدغي الحمعي، احمرار في الجلد، أو العديد من بقرات الصديد (أعراض متحملة
Acute Generalised Exanthematous
Pustulosis) – AGEP (والتي قد تحدث خلال المراحل الأولى من العلاج بهذا الدواء.

فقدان مفاجي للرؤية

فقدان مفاجي للرؤية

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جدا (الأعراض التي تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من كل عشرة):

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 10-10 مستخدمين من بين 100):
قلبي، تورم، زيادة التعرق، أو حساسية في الجلد، الغثي من البطن وقد لا يمكن شدة الضرر للكبد.
تشنجات عضلية، تهيج نفسي، ارتباك، نعاس، ماسع بمسوى البيضة (أو العي)، حركات سريعة وغير إرادية لتعنين، مشاكل في القلب (وتيرة سريعة للقلب)، مشاكل في التنسيق، اضطراب عقلي جدا مصحوب بالارتباك، الميل إلى الانفعال الزائد.

أعراض جانبية شيوها غير معروف (الأعراض التي لم يتم تحذير شيوها بها):
قلبي، تورم، زيادة التعرق، أو حساسية في الجلد، الغثي من البطن، تورم، زيادة التعرق، أو حساسية في الجلد، الغثي من البطن وقد لا يمكن شدة الضرر للكبد.
تشنجات عضلية، تهيج نفسي، ارتباك، نعاس، ماسع بمسوى البيضة (أو العي)، حركات سريعة وغير إرادية لتعنين، مشاكل في القلب (وتيرة سريعة للقلب)، مشاكل في التنسيق، اضطراب عقلي جدا مصحوب بالارتباك، الميل إلى الانفعال الزائد.

أعراض جانبية شيوها غير معروف (الأعراض التي لم يتم تحذير شيوها بها):

اضطرابات في النوم
بعض سريع أو غير منتظم أو خفان (إدراك نبضات القلب)
نعاس

ارتفاع ضغط الدم
ألم في البطن، إسهال، تقيؤ

ألم عند التبول

وخز أو عدم الإحساس في كفتي اليدين والقدمين

رعاش

انخفاض في تدفق الدم إلى عصب

المرض الذي قد يتسبب بفقدان الرؤية (Ischaemic optic neuropathy)

تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن استخدام الدواء والتوجه للطبيب فورا عند ظهور ما يلي:

- التهلق والإلمان - عند التوقف عن تناول الدواء، قد تعانين أعراض الطعام، والتي تشمل: الشعور بعدم الهضم، وصعوبات في النوم، عصبية، القلق، خفقان، ارتعاج في ضغط الدم، تقيؤات وغثيان، إسهال، رعشة وتعرق

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبلغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "דווח על תופעות לוואי עקוב סיפול תרופות" الموجود في الصفحة الرئيسية (www.health.gov.il) موقع وزارة الصحة الذي يوجه إلى النموذج الإلكتروني للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسليم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومحال رؤيتهم، وبذلك تمنع التسهم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ انتهاء) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين تحت درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

- لا يجوز القاء الأدوية لمياه الصرف الصحي أو لسلة النفايات المنزلية، أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. هذا التدابير سوف تساعد في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المراكبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضا على:

Croscarmellose sodium, talc, povidone, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), methylcellulose, silica colloidal anhydrous, macrogol 400, brilliant blue FCF aluminum lake (E133), ponceau 4R aluminum lake (E124), quinoline yellow aluminum lake (E104), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى البوة:

حبسولة بلون أزرق مع خط مشطر على كلا الجهتين.

أحجام الحبوب المعتمدة: 10، 16، 20، 30، 40، 50

حبسولة. قد لا يتم تسويق جميع أحجام البويات. تم التفتيح في نيسان 2023 وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في قسم الصحة: 057-04-26978-0

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل:

دكسل م.ص.

شارع دكسل 1، أور عيكفا 3060000، إسرائيل