

עלון לצרcn לפי תקנות הרווחים (תקנירם) התשמ"ז – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פוסרנוול 1000 מ"ג אבקה למtanן דרך הפה

כל שקיק מכיל 1000 מ"ג

lanthanum (as carbonate hydrate) (כקרבונט הידראט),

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 ("מידע נוספת") בעלון זה.

קרא בעיון את העلون עד סוף בטרכם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה. תרופה זו אינה מיועדת למשתמשים מתחת לגיל 18. הבטיחות והיעילות של פוסרנוול בילדים מתחת לגיל 18 לא נבדקה.

חשוב ליטול את התרופה עם האוכל או מיד אחריו.

ידע את הרופא אם עלייך לעבר צילומי רנטגן כיוון שהשימוש בפוסרנוול עשוי להשפיע על התוצאות.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להורדת רמות גבוהות של זרחן (fosfate) בדם (היפרfosfatemia) בחולי איספיקת קליפות כרונית המטופלים בהמודיאליה או דיאליזה פריטוניאלית אמבולוטורית#התרופה מיועדת גם לחולים במחלת קליפות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה עם רמות גבוהות של זרחן בסרום (גדול מ- 1.78 מילימול/ליטר) אשר לא נשלוות באמצעות דיאטה דלת זרחן בלבד.

פעולות רפואיות: פוסרנוול נקשרת במעי לזרchan שמקורו במזון. זרחן הקשור בדרך זו אינו יכול להיספג על ידי הגוף ובכך פוסרנוול מסייעת בהורדת רמת הזרחן בדם.

קבוצה רפואיית: תרופה לטיפול בעודף אשלגן ועודף זרחן.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל לננטנים קרבונט הידראט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
- רמות הזרחן בדם נמוכות (היפרfosfatemia).

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בפוסרנוול, ספר לרופא אם הינך סובל או סבלת בעבר מ:

- סרטן בקיבה או במעי
- מחלת דלקתית של המעי, כולל דלקת כיבית של המעי הגס או מחלת קrhohn
- ניתוח בבטן, ציהום או דלקת של הבטן/המעיים (דלקת הצפק)
- וכי קיבה או מעיים
- חסימת מעיים#או תנוועתיות איטית#של המעי#(כגון עצירות וסיבוכים בקיבה בעקבות סוכרת)
- פעילות יתרודה של הכליה או הכליות

בדיקות ומעקב

לפני תחילת השימוש בתרופה הרופא יפנה אותך לבדיקת רמות זרחן בدم. בתקופת הטיפול, כל 2-3 שבועות, הרופא יבדוק את רמת הזרchan בדמך ועשוי להעלות את המינון עד אשר רמת הזרchan שלך בדם תהיה ברמה הרציה.

אם אתה סובל מבעיות ירודה של הכליות הרופא עשוי להחליט לבדוק את רמת הסידן בדמך מפעם לפעם. אם יש לך מעט מדי סידן, יתכן שתיתנתן לך תוספת סידן.

ידע את הרופא אם עלייך לעבור צילום רנטגן, כיון שהשימוש בפוסרנוול עשוי להשפיע על התוצאות.

אם אתה נדרש לעבור בדיקת אנדרוסקופיה של מערכת העיכול, ידע את הרופא שלך שאתה נוטל פוסרנוול מכיווןשמי שמבצע את בדיקת האנדוסקופיה יכול להבחין בשאריות של פוסרנוול (לנטנותם) במערכת העיכול.

תגובהות בין-תרופתיות

אם אתה נוטל, נטלה לאחרונה או אתה עשוי ליטול תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח.

פוסרנוול עשוי להשפיע על ספיקת תרופות מסוימות של מערכת העיכול.

- אם הינך נוטל אחת מהתרופות הבאות עלייך ליטול אותן לפחות שעתיים לפני או אחרי נטילת פוסרנוול:

- כלורוקווין – לשיגרון (ראומטיזם) או קדחת (מלריה).
- קטוקונזול – לziehomim פטרייתים.
- אנטיביוטיקה – טטרציקלין או דוקסיציקlein.
- לבוטירוקסין (لتת פעילות של בלוטת התריס) – יש לקחת שעתיים לפני או שעתיים אחרי נטילת פוסרנוול. הרופא עשוי לדרוש עוקב אחר רמות ה-TSH (הורמן מגירה בלוטת התריס – thyroid-stimulating hormone) בזמן לצורה הדוקה.
- אנטיביוטיקה לבליה משפחת הפלוקסצין (כולל צ'יירופולוקסצין) – יש להמתין שעתיים לפני או 4 שעות אחרי נטילת פוסרנוול.

שימוש בתרופה ומדוז

יש ליטול פוסרנוול עם או מיד לאחר האוכל. ראה סעיף 3 להנחיות שימוש בפוסרנוול.

הירין והנקה

אין להשתמש בתרופה במהלך ההריון.

אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שהינך בהריון או מתכונת להיכנס להריון עלייך להיעז布 רפואי או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

היות שלא ידוע האם התרופה עוברת לתינוק בחלב אם, אין להניך בזמן שימוש בפוסרנוול. אם הינך מניקה, היועצי' רפואי או ברוקח לפני נטילת תרופות כלשהן.

נהיגה ושימוש במכונות

תרופה זו עלולה לגרום לעויתם לתוחות סחרחות או תוחות שחזור (ורטיגו). אם אתה חווית תוחשות אלה, עלייך להיזהר בנהיגה או בהפעלת מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פוסרנוול מכילה גליקוז. אם נאמר לך על ידי הרפואי כי הינך סובל מיי סבירות לסתוכרים מסוימים, היועץ רפואי לפני השימוש בתרופה. כל שקיק פוסרנוול 750 מ"ג ו-1000 מ"ג מכיל 641.7 ו-855.6 מ"ג של Dextrans בההתאמה, המכילים גליקוז.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

יש ליטול פוסרנול עם האוכל או מיד לאחר האוכל. הסיכוי להופעת תופעות לוואי כגון בחילות והקאות הינו גדול יותר אם נוטלים את התרופה לפני האוכל. אבקת פוסרנול לבליה מיעדת לערבוב עם מזון רך (כגון רסק תפוחים או מוצר מזון דומה) ולאחר מכן לבליה. אין צורך בהוספת נוזלים.

אין לפתח את השקייק עד לזמן השימוש. ערבעת את כל תכולת השקייק עם 2-1 כפות מלאות במזון רך. שים לב שהמנה כוללת ערבבה במזון.EDA שטעורבת האבקה לבליה והמזון נאכלת מיד (טור 15 דקות). אין לשמר אבקת פוסרנול המעורבתת במזון לשימוש במועד מאוחר יותר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. הרופא יורה לך כמה שקייקים עליך ליטול עם כל ארוחה (המנה היומיית שלך תחולק בין הארוחות). מספר השקייקים שתיקח תלוי בכמות הזרחן במזון שאתה אוכל וברמות הזרחן בدمך.

לפני התחלת השימוש בפוסרנול אבקה, יתכן שהרופא הורה לך להשתמש בפוסרנול טבליות לעיסה על מנת למצוא את המינון המתאים לך. פוסרנול טבליות לעיסה קיימות במספר חזקים ומאפשרות עליות קטנות במינון. המינון המקבול הוא בדרך כלל שקייק של 750 או 1000 מ"ג, 3 פעמיים ביום עם ארוחה.

פוסרנול עובדת על ידי קישור של זרחן מהאוכל במעי. לכן, חשוב מאד לחתך פוסרנול בכל ארוחה. אם אתה משנה את המשטר התזונתי שלך, צור קשר עם הרופא כי יתכן שתזדקק לחתוך מנה נוספת של פוסרנול. הרופא יורה לך מה عليك לעשות במקרה זה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר
אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר עליך לפנות לרופא להערכת הסיכון ולקבלת ייעוץ. סימפטומים של מינון יתר עשויים להתבטא בבחילות וכאבי ראש. אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעליל לצד מין התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול פוסרנול
חשוב ליטול פוסרנול עם כל ארוחה. אם שכחת ליטול פוסרנול בזמן המיעוד, אין ליטול מנה כפולה כדי לפצوت על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל, עם הארוחה הבאה והיוועץ ברופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

כמו בכל תרופה השימוש בפוסרנוול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

חלק מתופעות הלואוי עלולות להיות חמורות. אם תופעות הלואוי הבאות מופיעות, עלייך לפנות מידית לקבלת עזרה רפואי:

- קרע בקיר המעי (הסימנים כוללים: כאב בטן חמורים, צמרמות, חום, בחילה, הקאות או רגשות של הבطن). זו תופעת לוואי נדירה (עלולה להופיע בשכיחות של עד משתמש 1 מתוך 1000).
- חסימת מעיים (הסימנים כוללים: נפיחות חמורה; כאב בטן, התנפחות או עוויתות; עצירות חמורה).
- תופעת לוואי זו אינה שכיחה (עלולה להופיע בשכיחות של עד משתמש 1 מתוך 100).
- אם הופעה אצלך עצירות אשר לא הייתה קיימת קודם לכן או שאתה סובל מעיצרות חמורה, עלייך לפנות לרופא כי יתרן שהעצירות הינה סימן מוקדם לחסימת המעי. עצירות הינה תופעת לוואי שכיחה (עלולה להופיע בשכיחות של 1 מתוך 10 משתמשים).

תופעות לוואי נוספות, פחות חמורות, כוללות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להופיע ביותר מ-1 מתוך 10):

- בחילות, הקאות, שלשול, כאב בטן, כאב ראש, גירוד, פריחה.

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע בשכיחות של עד משתמש 1 מתוך 10):

- צרבת, נפיחנות (אג'ם במעי).
- גם רמות נמוכות של סידן בدم (היפוקלזמי) הינה תופעת לוואי שכיחה; הסימפטומים עלולים לכלול תחושת דגדוג בידים וברגליים, התכווצויות שרירים והתקכווצויות בבטן, או עוויתות בשדרי הפנים והרגליים.

תופעות לוואי שאין שכיחות (עלולות להופיע בשכיחות של עד משתמש 1 מתוך 100):

- עייפות; תחושת חוסר נוחות; כאב בחזה, חולשה; נפיחות בידים וברגליים; כאבים בגוף; סחרחות; תחושת סחרור (ורטיגנו); שיהוקים; דלקת בקיבה ובמעי (גסטראונטריטיס); קשיי עיכול; תסמונת המעי הריגץ; יושב בפה; בעיות שנייניות; דלקת بواسט או בפה; כאה רכה; עליה ברמות אנדמיי כבד מסוימים, ברמות חרמוני יתרת בלוטת התannis (פאראтирואיד); עליה ברמות אלומיניום, סידן וגלוקוז בدم; עליה או ירידת ברמות זרחן בدم; צימאון; ירידת בمشקל; כאבי מפרקים; כאבי שרירים; החלהות והידקקות העצומות (דולדול עצם - אוסטאופורוזיס); העדר תיאבן או תיאבן מוגבר; דלקת גרון; נשירת שיער; הדעת יתר; הפרעות בחוש הטעם ועליה בספירת תא הדם הלבנים.

לא ידוע (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- שרירות של התרופה במערכת העיכול

אם הופעה תופעת לוואי, אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעילון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 30°C .

אין להשליך תרופות לביב או לאשפזה הביתי. היועץ ברוקח כיצד להיפטר מתרופות אשר אין משמש בהן עוד. צעדים אלה מסיעים בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

dextrates (hydrated), colloidal anhydrous silica and magnesium stearate.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?

פוסרנול אבקה הינה אבקה למtanן דרך הפה בצבע לבן עד קרם (off-white) ארוזה בשקיק.
קופסה מכילה 90 שקיקים (9 ארייזות קרטון קטנות של 10 שקיקים כל אחת).

בעל הרישום והיבואן וכתובתו: טקדה ישראל בע"מ, רח' אפעל 25, פתח תקווה 4951125

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פוסרנול 750 מ"ג אבקה למtanן דרך הפה: 153-35-34025

פוסרנול 1000 מ"ג אבקה למtanן דרך הפה: 153-36-34022

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך ביוני 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.