

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקנירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

**פוסרנוול 500 מ"ג טבליות לעיסה
פוסרנוול 750 מ"ג טבליות לעיסה
פוסרנוול 1000 מ"ג טבליות לעיסה**

כל טבליה לעיסה מכילה 500 מ"ג; 750 מ"ג; 1000 מ"ג של החומר הפעיל לננטום (קربונט הידראט), (lanthanum as carbonate hydrate).

חומרים בלתי פעילים וآلרגניים: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 ("מידע נוספת") בעילון זה.

קרא בעילון את העילון עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה. תרופה זו אינה מיועדת למשתמשים מתחת לגיל 18. הבטיחות והיעילות של פוסרנוול בילדים מתחת לגיל 18 לא נבדקה.

שים לב: לא לבלווע! חובה ללווע את כל הטעביה.

חשוב ליטול את התרופה עם הארוחה או מיד אחריה.

ידע את הרופא אם עיר לעבר צילומי רנטגן כיוון שהשימוש בפוסרנוול עשוי להשפיע על התוצאות.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להורדת רמות גבוהות של זרחן (פוסופט) בדם (היפרפוספטמיה) בחולי אי ספיקת כליות כרוניית המטופלים בהמודיאליה או דיאליזה פריטוניאלית אמבולטורית#התרופה מיועדת גם לחולים במחלת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה עם רמות גבוהות של זרחן בסרום (גודול מ-1.78 מילימול/ליטר) אשר לא נשלtot באמצעות דיאטה דלת זרחן בלבד.

פעילות רפואית: פוסרנוול נקשרת בmundי לזרchan שמקורו במזון. זרחן הקשור בדרך זו אינו יכול להיספג על ידי הגוף ובכך פוסרנוול מסייעת בהורדת רמת הזרחן בדם.

קבוצה רפואית: תרופות לטיפול בעודף אשלגן ועודף זרחן.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה ורישי (אלרגי) לחומר הפעיל לננטום קרבונט הידראט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).
- רמות הזרחן בדם נמוכות (היפרפוספטמיה).

**اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בפוסרנוול, ספר לרופא אם הין סובל או סבלת בעבר מ:**

- סרטן בKİבה או במעי
- מחלת דלקתית של המעי, כולל דלקת כייבת של המעי הגס או מחלת קrhoן
- ניתוח בבטן, זיהום או דלקת של הבטן/המעיים (דלקת הצפק)
- וכייבת או מעיים
- חסימת מעיים#או תנומתיות איטית של המעיים (כגון עצירות וסיבוכים בKİבה בעקבות סוכרת)
- פעילות יתרה של הכליה או הכליה

חשיבות מוגברת ללבולו את טבליות פוסרנוול עד סופן ולא לבלוואוווו כשהן שלמות או לאחר שנלעסו בצורה חלקית. דבר זה יפחית את הסיכון לסתובוקים מזיקיים במערכת העיכול כגון קרע של קיר המעי, חסימת מעי, עצירות (ראה סעיף 4).

בדיקות ומעקב

לפני תחילת השימוש בתרופת הרופא יפנה אותו לבדיקת רמות זרחן בدم. בתקופת הטיפול, כל 2-3 שבועות, הרופא יבודק את רמת הזרchan בדם ועשוי להעלות את המינון עד אשר רמת הזרchan שלך בדם תהיה ברמה הרצiosa.

אם אתה סובל מפעילות יתרה של הכליות הרופא עשוי לבדוק את רמת הסידן בדמך מפעם לפעם. אם יש לך מעט מד' סידן, יתכן שתיננתן לך תוספת סידן.

ידע את הרופא אם עלייך לעבור צילום רנטגן, כיון שהשימוש בפוסרנוול עשוי להשפיע על התוצאות.

אם אתה נדרש לעבור בדיקת אנדווקופיה של מערכת העיכול, ידע את הרופא שלך שאתה נוטל פוסרנוול מכיווןשמי שמבצע את בדיקת האנדוקופיה יכול להבחן בשאריות של פוסרנוול (לנטנותם) במערכת העיכול.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה נוטל, נטלה לאחרונה או אתה עשוי ליטול תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על הרופא או לוחץ.

פוסרנוול עשויה להשפיע על ספיקת תרופות מסוימות מערכת העיכול.

- אם הינך נוטל אחת מהתרופות הבאות עלייך ליטול אותן לפחות שעתיים לפני או אחרי נטילת פוסרנוול:
 - קלורוקווין – לשיגרון (ראומטיזם) או קדחת (מלריה).
 - קטוקונזול – לziehomim פטריתיים.
 - אנטיביוטיקה – טרטציילין או דוקסיציקlein.
 - לבוטירוקסין (لتת פעילות של בלוטת התריס) – יש לקחת שעתיים לפני או שעתיים אחרי נטילת פוסרנוול. הרופא עשוי לרצות לך אחר רמות ה-TSH (הורמון מגירה בלוטת התריס – thyroid-stimulating hormone) בדמך בצורה הדזקה.
 - אנטיביוטיקה לבליה משפחת הפלוקסצין (כולל ציפרופולוקסצין) – יש להמתין שעתיים לפני או 4 שעות אחרי נטילת פוסרנוול.

שימוש בתרופה ומזו

יש ליטול פוסרנוול עם או מיד לאחר האוכל. ראה סעיף 3 להנחיות שימוש בפוסרנוול.

הירין והנקה

אין להשתמש בתרופה במהלך ההירין.

אם הינך בהירין או מניקה, חשוב שתינך בהירין או מתכוננת להיכנס להירין עלייך להיעז ברופא או ברוקח לפניו השימוש בתרופה.

היות שלא ידוע האם התרופה עוברת לתינוק בחלב אם, אין להינק בזמן שימוש בפוסרנוול. אם הינך מניקה, היועץ ברופא או ברוקח לפניו נטילת תרופות כלשהן.

בנייה ושימוש במכונות

תרופה זו עלולה לגרום לעיתים לתוחשת סחרחות או תוחשת סחרור (ורטיגו). אם אתה חווה תוחשות אלה, עלייך להיזהר בניהיגה או בהפעלת מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פוסרנוול מכילה גליקוז. אם נאמר לך על ידי הרופא כי הינך סובל מאי סבירות לסתוכרים מסוימים, היועץ ברופא לפניו השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

יש ליטול פוסרנוול עם האוכל או מייד לאחר האוכל. הסיכוי להופעת תופעות לוואי כגון בחילות והקאות הינו גדול יותר אם נוטלים את התרופה לפני האוכל. יש לילועו את הטబליות עד סוף ולא לבלוע אותן כשהן שלמות. כדי לעזור בעיסיה, ניתן לכתוש את הטబליות. אין צורך בהוספת נזלים.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. הרופא יורה לך כמה טబליות עליך ליטול עם כל ארוחה (המנה היומיית שלך תחולק בין הארוחות). מספר הטబליות שתיקח תלוי בכמות הזרחן ממזון שאתה אוכל וברמות הזרחן בدمך. המינון המקביל הוא בדרך כלל 3 טబליות ביום עם ארוחה.

פוסרנוול עבדת על ידי קישור של זרחן מהאוכל במעי. לכן, חשוב מאד לקחת פוסרנוול בכל ארוחה. אם אתה משנה את המשטר התזונתי שלך, צור קשר עם הרופא כי יתכן שתזדקק לקחת מנה נוספת של פוסרנוול. הרופא יורה לך מה عليك לעשות במקרה זה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטلت בטיעות מינון גבוהה יותר
אם נטلت בטיעות מינון גבוהה יותר עליך לפנות לרופא להערכת הסיכון ולקבלת ייעוץ. סימפטומים של מינון יתר עשויים להתבטא בבחילות וכאבי ראש.

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעליל מין התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול פוסרנוול
חשוב ליטול פוסרנוול עם כל ארוחה. אם שכחת ליטול פוסרנוול בזמן המوعد, אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל, עם הארוחה הבאה והיוועץ ברופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
יש להתميد בטיפול כפי שהומליך על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הניר זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה השימוש בפוסרנוול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

חלק מתופעות הלואן עלולות להיות חמורות. אם תופעות הלואן הבאות מופיעות, عليك לפנות מידית לקבלת עזרה רפואי:

- קרע בקיר המעי (הסימנים כוללים: כאבי בטן חמורים, צמרמורות, חום, בחילה, הקאות או רגישות של הבطن). זו תופעה לוואי נדירה (עלולה להופיע בשכיחות של עד מעתך 1 מתוך 1000).
- חסימת מעיים (הסימנים כוללים: נפיחות חמורה; כאבי בטן, התנפחות או עוויתות; עצירות חמורה). תופעת לוואי זו אינה שכיחה (עלולה להופיע בשכיחות של עד מעתך 1 מתוך 100).
- אם הופיעה אצלך עצירות אשר לא הייתה קיימת קודם לכן או שאתה סובל מעיצרות חמורה, عليك לפנות לרופא כי יתכן שהעצירות הינה סימן מוקדם לחסימת המעי. עצירות הינה תופעת לוואי שכיחה (עלולה להופיע בשכיחות של 1 מתוך 10 משתמשים).

תופעות לוואי נספנות, פחות חמורות, כוללות:

- תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להופיע בSCIHOOT של עד משתמש 1 מתוך 10):

- צרבת, נפיחנות (גזים במעי).
- גם רמות נמוכות של סידן בدم (היפוקלצמיה) הינה תופעת לוואי שכיחה; הסימפטומים עלולים לכלול תחושת דגדוג בידים וברגליים, התכווצויות שרירים והתקכווצויות בבטן, או עוויתות בשורי' הפנים והרגליים.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להופיע בשכיחות של עד משתמש 1 מתוך 100):

- עייפות; תחושת חוסר נוחות; כאב בחזה, חולשה; נפיחות בידים וברגליים; כאבים בגוף; סחרחות; תחושת סחרור (ורטיגו); שיוקים; דלקת בקיבה ובמעי (גסטרואנטריטיס); קשיי עיכול; תסמונת המעי הרגיז; יובש בפה; בעיות שניינימ; דלקת بواسט או בפה; צואה רכה; עליה ברמות אנדמיי כבד מסויימים, ברמות הורמוני יתרת בלוטת התannis (פאראтирואיד); עליה ברמות אלומיניום, סידן וגלוקוז בדם; עליה או ירידת ברמות זרחן בדם; צימאון; ירידת משקל; כאבי מפרקים; כאבי שרירים; החלשות והידקקות העצומות (דולדול עצם - אוסטאופורוזיס); העדר תיאבן או תיאבן מוגבר; דלקת גרון; נשירת שיער; הצעת יתר; הפרעות בחוש הטעם ועליה בספירת תא הדם הלבנים.

לא ידוע (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- שרירות של התרופה במערכת העיכול

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן מחייבת, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אחר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי קר תמנעו הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האخرון של אותו חודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 30°C .

אין להשליך תרופות לביב או לאשפלה הביתיית. היועץ ברוקח כיצד להיפטר מתרופות אשר אין משתמש בהן עוד. צעדים אלה מסוימים בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

dextrates (hydrated), colloidal anhydrous silica and magnesium stearate.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?

טבלייה ללייסה לבנה, עגולה ושטוחה עם הטבעה:
פוסרנוול 500 מ"ג טבליות ללייסה – 'S405/500'
פוסרנוול 750 מ"ג טבליות ללייסה – 'S405/750'
פוסרנוול 1000 מ"ג טבליות ללייסה – 'S405/1000'

אריזת קרטון המכילה בקבוקים לפי הכמות:
פוזרנול 500 מ"ג טבליות לעיסה – 45, 90 טבליות לעיסה
פוזרנול 750 מ"ג טבליות לעיסה – 15, 90 טבליות לעיסה
פוזרנול 1000 מ"ג טבליות לעיסה – 90 טבליות לעיסה
יתכן שלא כל האrizות משוקחות.

בעל הרישום והיבואן וכתובתו: טקדה ישראל בע"מ, רח' אפעל 25, פתח תקווה 4951125

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פוזרנול 500 מ"ג טבליות לעיסה: 00 140 50 31968

פוזרנול 750 מ"ג טבליות לעיסה: 00 140 51 31998

פוזרנול 1000 מ"ג טבליות לעיסה: 00 140 52 31969

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך ביוני 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.