

**עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**מינולט™  
טבליות מצופות**

כל טבליה מצופה מכילה:  
אתינילאסטרדיול 0.03 מ"ג Ethinylestradiol  
גסטודן 0.075 מ"ג Gestodene

**חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה:** ראי בפרק 6.

**קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשמשי בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעבירי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

**1. למה מיועדת התרופה?**

מינולט מיועדת למניעת היריון ושייכת לקבוצת תרופות המכונה "גלולות למניעת היריון". כל אחת מהטבליות מכילה שני הורמונים נקביים, אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (גסטודן).

**קבוצה תרפויטית:** גלולות משולבות למניעת היריון, שילוב של אסטרוגן ופרוגסטוגן.

**מספר דברים שחשוב לדעת על גלולות משולבות:**

- כאשר נוטלים אותן בצורה נכונה, גלולות משולבות הן אחת השיטות ההפיכות האמינות ביותר למניעת היריון.
- הן עלולות להעלות מעט את הסיכון לפקקת (קרישי דם) בוורידים ובעורקים, במיוחד בשנה הראשונה או בנטילה חוזרת לאחר הפסקה של 4 שבועות או יותר.
- עלייך להיות ערנית ולפנות לרופא אם את חוששת כי הינך סובלת מתסמינים של קרישי דם (ראי פרק 2, "מינולט ופקקת (קרישי דם)").
- מינולט, כמו יתר הגלולות למניעת היריון, אינה מונעת הדבקות בזיהום ה-HIV (איידיס) או במחלות אחרות המועברות ביחסי מין. אם את חושבת שאת עלולה להיות בסיכון עלייך להשתמש בקונדום בנוסף לגלולה.

**2. לפני השימוש בתרופה**

לפני שאת מתחילה ליטול מינולט עלייך לקרוא את המידע על פקקת (קרישי דם) בפרק 2. חשוב במיוחד לקרוא את החלק של התסמינים של פקקת (ראי פרק 2, "מינולט ופקקת (קרישי דם)").

**אין להשתמש בתרופה אם:**

הינך נתונה באחד מהמצבים הבאים. במקרה בו יש לך את אחד מהמצבים המפורטים מטה עלייך לספר על כך לרופא. הרופא ידון איתך על אמצעים אחרים למניעת היריון אשר מתאימים יותר.

- את רגישה (אלרגית) לאתינילאסטרדיול או לגסטודן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בפרק 6).
- יש לך (או אי פעם היה לך) קרישי דם בכלי הדם ברגליים (פקקת ורידים עמוקה, DVT), בריאות (תסחיף ריאתי, PE) או באיברים אחרים.
- ידוע לך כי יש לך הפרעה אשר משפיעה על קרישת הדם למשל - חסר בחלבון C, חסר בחלבון S, חסר באנטי תרומבין III, פקטור 5 ליידין או מנוגדנים אנטי-פוספוליפידיים.
- הינך עומדת בפני ניתוח או אם הינך עתידה להיות במצב של חוסר תנועה ממושך ("ראי מינולט ופקקת (קרישי דם)").
- אי פעם היה לך התקף לב או שבץ.
- יש לך (או אי פעם היתה לך) תעוקת חזה (מצב הגורם לכאב חזק בחזה ויכול להיות סימן ראשוני להתקף לב) או התקף איסכמי חולף (TIA) תסמיני שבץ זמניים].
- יש לך אחת מהמחלות הבאות אשר עלולות להעלות את הסיכון להיווצרות קרישי דם בעורקים:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- סוכרת חמורה עם נזק לכלי דם</li> <li>- לחץ דם גבוה מאוד</li> <li>- רמות גבוהות של שומנים בדם (כולסטרול או טריגליצרידים)</li> <li>- מצב של יתר הומוציסטאין</li> <li>• יש לך או אי פעם הייתה לך דלקת הבלב (פנקריאטיטיס) עם רמות גבוהות של שומן/טריגליצרידים בדם.</li> <li>• יש לך (או אי פעם הייתה לך) סוג של מיגרנה המכונה "מיגרנה עם אורה".</li> <li>• יש לך סרטן השד או חשד לסרטן השד.</li> <li>• יש לך סרטן בדופן הרחם, צוואר הרחם או בנרתיק.</li> <li>• יש לך גידול בכבד (ממאיר או שפיר).</li> <li>• יש לך מחלת כבד ותפקוד הכבד עדיין לא חזר למצב תקין.</li> <li>• יש לך דימום בלתי מוסבר מהנרתיק (עד לקבלת אבחנה מהרופא).</li> <li>• אם הינך בהיריון או אם קיימת אפשרות שהינך בהיריון.</li> <li>• אם הינך מיניקה.</li> <li>• יש לך הפטיטיס C (דלקת כבד נגיפית), ואת נוטלת תרופות המכילות אומביטאסוויר/פאריטאפרוויר/ריטונאוויר, דאסאבוויר, גלקפרוויר/פיברנטסוויר או סופוסבוויר/ולפטסוויר/ווקסילפרוויר (ראי "תגובות בין תרופתיות").</li> </ul>
--

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

<p><b>יש לפנות לטיפול רפואי מיידי:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• אם הבחנת בתסמינים אפשריים לקריש דם היכולים להעיד על כך שאת סובלת מקריש דם ברגל (כלומר מפקקת ורידים עמוקה), מקריש דם בריאה (תסחיף ריאתי), מהתקף לב או שבץ (ראי "מינולט ופקקת (קרישי דם)").</li> </ul> <p>למידע על התסמינים לתופעות לוואי חמורות אלו פני לפרק 2 "איך לזהות תסמינים של קריש דם".</p>
---

אם יש לך את אחד מהמצבים הבאים, יש להיוועץ ברופא לפני תחילת נטילת מינולט. גם במקרה בו אחד או יותר מהמצבים מתפתח או מחמיר בתקופת הטיפול במינולט יש להיוועץ ברופא:

- אם יש לך מחלת קרוהן או קוליטיס כיבית (מחלה דלקתית כרונית של המעי).
- אם יש לך זאבת אדמנתית מערכתית (SLE - מחלה המשפיעה על מערכת החיסון).
- אם יש לך תסמונת המוליטית אורמית (HUS - הפרעה במערכת קרישת הדם הגורמת לכשל כלייתי).
- אם יש לך אנמיה חרמשית (מחלה תורשתית של כדוריות הדם האדומות).
- אם יש לך רמות גבוהות של שומנים בדם (היפרטריגליצרידמיה) או אם ישנה היסטוריה משפחתית של מצב זה. היפרטריגליצרידמיה נמצאה קשורה לסיכון מוגבר לפתח פנקריאטיטיס (דלקת בבלב).
- אם את לפני ניתוח או אם הינך עתידה להיות במצב של חוסר תנועה ממושך (ראי "מינולט ופקקת (קרישי דם)").
- אם את לאחר לידה, הינך בסיכון מוגבר להיווצרות קרישי דם. עלייך לשאול את הרופא כמה זמן לאחר הלידה תוכלי להשתמש במינולט.
- אם יש לך דלקת בוורידים מתחת לעור (פקקת שטחית בוורידים).
- אם יש לך ורידים דליתיים.
- אם יש לך קשריות (נודולות) בשד, מחלת שד פיברוציסטית, צילום רנטגן לא תקין של השד או ממוגרפיה לא תקינה.
- אם יש לך כאבי ראש חמורים או אפילפסיה.
- אם את סובלת מדיכאון.
- אם יש לך מחלה בכיס המרה, בלב או בכליות.
- יתר לחץ דם.
- סוכרת.
- הפרעה בחילוף החומרים הידועה בשם פורפיריה.
- בעיות כבד.
- הופעת כתמים חומים על הפנים והגוף כמו אלו אשר מופיעים במהלך היריון (כלואזמה).
- שרירן ברחם (גידול שפיר (בלתי-סרטני) הגדל מרקמה סיבית שרירית של דופן הרחם).
- בעיה עם הרכבת עדשות מגע.
- מיגרנות.

- הפרעות בראייה.
- סידנהם כוריאה (מחלה המאופיינת בתנועות גוף מהירות, תנועות עוויתיות לא מתואמות המשפיעות בעיקר על הפנים, כפות הרגליים והידיים).
- מחלת פמפיגואיד - Pemphigoid gestationis (מחלת עור עם שלפוחיות המתרחשת בזמן היריון).
- אובדן שמיעה הקשור לטרשת אוזן.
- הפרעות ברמות שומנים בדם (רמות גבוהות או נמוכות של שומנים בדם).
- מחסור בסידן המלווה בעוויתות שרירים.
- דלקת בוורידים (פלביטיס).
- נפיחות בפנים, בעיניים, בפה או קשיי נשימה.
- אם את חווה תסמינים של אנגיואדמה כגון נפיחות הפנים, הלשון ו/או לוע ו/או קושי בבליעה או פריחה (סרפדת) שיתכן שילוו בקשיי נשימה, פני לרופא מייד.
- תכשירים המכילים אסטרוגנים עלולים לגרום או להחמיר תסמינים של אנגיואדמה תורשתית ואנגיואדמה נרכשת.
- **הפרעות פסיכיאטריות**  
ישנן נשים אשר דיווחו על דיכאון או מצב רוח דיכאוני תוך כדי שימוש באמצעי מניעה הורמונליים כולל בשימוש במינולט. דיכאון יכול להיות רציני ועלול לעיתים להוביל למחשבות אובדניות. אם את חווה שינויים במצב רוח וסממנים דיכאוניים, צרי קשר עם הרופא בהקדם האפשרי לצורך המשך ייעוץ רפואי.

## מינולט ופקקת (קרישי דם)

השימוש באמצעי מניעה הורמונליים משולבים כגון מינולט מעלה את הסיכון להתפתחות של קריש דם בהשוואה לסיכון בנשים שלא משתמשות באמצעים אלו. במקרים נדירים, קריש דם יכול לגרום לחסימה של כלי דם ולגרום לבעיות חמורות. קרישי דם יכולים להתפתח:

- בוורידים [פקקת ורידים, תסחיף פקיקי בוורידים (VTE)]
- בעורקים [פקקת עורקים, תסחיף פקיקי בעורקים (ATE)].

ההחלמה מקריש דם לא תמיד מלאה. במקרים נדירים, עלולים להישאר סימנים חמורים או במקרים נדירים מאוד זה יכול להיות קטלני.

חשוב לזכור שהסיכון הכללי להתפתחות קריש דם מזיק בשל השימוש במינולט™ הינו קטן.

## איך לזהות תסמינים של קריש דם?

פני לרופא בדחיפות אם את מבחינה באחד או יותר מהתסמינים הבאים.

ממה את כנראה סובלת?	האם את חשה באחד או יותר מהסימנים הבאים?
פקקת ורידים עמוקה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• נפיחות באחת הרגליים או לאורך וריד ברגל או בכף הרגל במיוחד כאשר זה מלווה ב:</li> <li>• כאב או רגישות ברגל אשר עלולים לבוא לידי ביטוי רק בעמידה או הליכה</li> <li>• תחושת חמימות באותה הרגל</li> <li>• שינויים בצבע העור ברגל, למשל הופכת להיות חיוורת, אדומה או כחולה.</li> </ul>
תסחיף ריאתי	<ul style="list-style-type: none"> <li>• קוצר נשימה פתאומי ולא מוסבר או נשימה מהירה</li> <li>• שיעול פתאומי ללא סיבה אשר עלול להיות דמי</li> <li>• כאב חד בחזה אשר עלול להתגבר עם נשימה עמוקה</li> <li>• תחושת סחרור או סחרחורת</li> <li>• דופק מהיר או לא סדיר.</li> </ul> <p>אם אינך בטוחה, פני לרופא מכיוון שחלק מהסימנים הללו כמו שיעול או קוצר נשימה עלולים להיתפס בטעות כסימנים למצב קל יותר כגון זיהום במערכת הנשימה (למשל התקררות).</p>
פקקת בווריד הרשתית (קריש דם בכלי הדם של העין)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• סימנים אשר לרוב מופיעים בעין אחת:</li> <li>• איבוד ראייה מיידי או</li> <li>• טשטוש ראייה ללא כאב אשר יכול להתפתח לאיבוד ראייה.</li> </ul>

<p>התקף לב</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• תחושת כאב בחזה, חוסר נוחות, לחץ, כבדות</li> <li>• תחושת לחץ (לחיצה) או מלאות בחזה, בזרוע או מתחת לעצם החזה</li> <li>• תחושת מלאות, קושי בעיכול או תחושת חנק</li> <li>• תחושת חוסר נוחות בחלק העליון של הגוף המוקרנת לגב, ללסת, לגרון, לזרוע ולבטן</li> <li>• הזעה, בחילות, הקאות או סחרחורות</li> <li>• חולשה קיצונית, חרדה או קוצר נשימה</li> <li>• דופק מהיר או לא סדיר.</li> </ul>
<p>שבץ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• חולשה פתאומית או העדר תחושה בפנים, בזרוע או ברגל, במיוחד בצד אחד של הגוף</li> <li>• בלבול פתאומי, קושי בדיבור או בהבנה</li> <li>• קושי פתאומי בראייה בעין אחת או בשתי העיניים</li> <li>• קושי פתאומי בהליכה, סחרחורות, איבוד שיווי המשקל או קואורדינציה</li> <li>• כאב ראש חמור או ממושך המופיע בפתאומיות ללא סיבה ידועה</li> <li>• אובדן הכרה או עילפון עם או ללא התקף.</li> <li>• לעיתים התסמינים של שבץ יכולים להיות קצרים מאוד עם החלמה מלאה כמעט מיידי, אבל את עדיין צריכה לפנות בדחיפות לטיפול רפואי מאחר שאת עלולה להיות בסיכון לשבץ נוסף.</li> </ul>
<p>חסימה של כלי דם אחרים על ידי קריש דם</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• נפיחות וכיחלון קל בגפיים</li> <li>• כאב חריף ופתאומי בבטן (בטן חריפה).</li> </ul>

## פקקת ורידים

### מה יכול לקרות אם נוצר קריש דם בווריד?

- השימוש באמצעי מניעה הורמונליים משולבים קשור לעלייה בסיכון להתפתחות קרישי דם בוורידים (פקקת ורידים). אולם תופעת לוואי זו נדירה. היא יכולה לקרות בתדירות הגבוהה ביותר במהלך השנה הראשונה לשימוש באמצעי מניעה הורמונלי משולב.
- אם קריש דם התפתח בווריד ברגל או בכף הרגל הוא עלול לגרום לפקקת ורידים עמוקה.
- אם קריש דם נע מהרגל ומתמקם בריאה הוא עלול לגרום לתסחיף ריאתי.
- במקרים נדירים מאוד קריש דם עלול להיווצר בווריד באיבר אחר כמו בעין (פקקת בווריד הרשתית).

### מתי הסיכון להתפתחות קריש דם בווריד הוא הגבוה ביותר?

הסיכון הגבוה ביותר להתפתחות קריש דם בווריד הינו במהלך השנה הראשונה לנטילת אמצעי מניעה הורמונלי משולב בפעם הראשונה. הסיכון עלול להיות גבוה גם כאשר את חוזרת ליטול אמצעי מניעה הורמונלי משולב (תכשיר זהה לזה שלקחת בעבר או אחר) לאחר הפסקה של 4 שבועות או יותר.

לאחר השנה הראשונה, הסיכון יורד אך תמיד יהיה מעט גבוה בהשוואה למצב בו לא היית נוטלת אמצעי מניעה הורמונלי משולב.

כאשר מפסיקים ליטול מינולט הסיכון להתפתחות קריש דם חוזר למצב נורמלי תוך מספר שבועות.

### מה הסיכון להתפתחות קריש דם?

הסיכון תלוי בנטייה הטבעית שלך לפקקת ורידית ובסוג אמצעי המניעה ההורמונלי המשולב שאת נוטלת. הסיכון הכולל לקריש דם ברגל או בריאה (פקקת ורידים עמוקה או תסחיף ריאתי) בשימוש עם מינולט הוא קטן.

- מתוך כל 10,000 נשים אשר לא נוטלות אמצעי מניעה הורמונלי משולב ואינן בהיריון, כשתי נשים יפתחו קריש דם בשנה.
- מתוך כל 10,000 נשים אשר נוטלות אמצעי מניעה הורמונלי משולב אשר מכיל לבונורגסטרל, נורתסטירון או נורגסטימאט, כ-5-7 יפתחו קריש דם בשנה.

- מתוך כל 10,000 נשים אשר נוטלות אמצעי מניעה הורמונלי משולב אשר מכיל אתינילאסטרדיול וגסטודן כגון מינולט, כ-12-9 יפתחו קריש דם בשנה.
- הסיכון לפתח קריש דם ישתנה בהתאם להיסטוריה הרפואית (ראי "גורמים המעלים את הסיכון להיווצרות קריש דם" למטה).

הסיכון לפתח קריש דם בשנה	
נשים אשר אינן נוטלות אמצעי מניעה הורמונלי משולב (גלולה/מדבקה/טבעת) ואינן בהיריון	כ-2 מתוך 10,000 נשים
נשים אשר נוטלות אמצעי מניעה הורמונלי משולב אשר מכיל לבונורגסטורל, נורתיסטרון או נורגסטוימאט	כ-5-7 מתוך 10,000 נשים
נשים אשר נוטלות מינולט	כ-9-12 מתוך 10,000 נשים

### גורמים המעלים את הסיכון שלך להיווצרות קריש דם בווריד:

- הסיכון להיווצרות קריש דם עם נטילת מינולט קטן אך ישנם מצבים אשר מגבירים סיכון זה. הסיכון שלך יהיה גבוה יותר:
- אם את בעודף משקל (BMI מעל  $30 \text{ kg/m}^2$ )
  - אם לאחד מקרובי המשפחה הקרובה שלך היה קריש דם ברגל, בריאה או באיבר אחר בגיל צעיר (למשל פחות מגיל 50). במקרה כזה ייתכן כי יש לך הפרעה תורשתית במערכת קרישת הדם.
  - אם את צריכה לעבור ניתוח או נמצאת במצב של חוסר תנועה ממושך בגלל פציעה או מחלה, או הרגל שלך נמצאת בגבס. ייתכן שיהיה צורך להפסיק את השימוש במינולט כמה שבועות לפני הניתוח או בזמן שאת מוגבלת תנועתית. אם את צריכה להפסיק את השימוש במינולט, שאלו את הרופא מתי את יכולה להתחיל שוב ליטול מינולט.
  - עם העלייה בגיל (במיוחד מעל גיל 35)
  - אם ילדת לפני מספר שבועות.

הסיכון להיווצרות קריש דם גדל ככל שיש לך יותר מצבים מגבירי סיכון.

טיסה (מעל 4 שעות) עלולה להגביר את הסיכון לקריש דם באופן זמני, במיוחד אם יש לך מצבים אחרים המגבירים את הסיכון.

חשוב לציין בפני הרופא אם אחד מהמצבים המוזכרים מעלה רלוונטי עבורך, אפילו אם אינך בטוחה. ייתכן שהרופא יחליט כי יש להפסיק ליטול מינולט.

אם אחד או יותר ממצבים אלו משתנה בזמן השימוש במינולט, למשל קרוב משפחה מדרגה ראשונה חווה פקקת ללא סיבה ידועה או אם העלית הרבה במשקל, ספרי על כך לרופא.

## פקקת עורקים

### מה יכול לקרות אם נוצר קריש דם בעורק?

כמו קריש דם בווריד, קריש דם בעורק עלול לגרום לבעיות חמורות. למשל הוא עלול לגרום להתקף לב או שבץ.

### גורמים המעלים את הסיכון שלך להיווצרות קריש דם בעורק:

- חשוב לציין כי הסיכון להתקף לב או שבץ כתוצאה מנטילת מינולט קטן מאוד אך הוא עלול לעלות:
- עם העלייה בגיל (מעל גיל 35)
  - אם הינך מעשנת. מומלץ להפסיק לעשן כאשר הינך נוטלת אמצעי מניעה הורמונלי משולב כגון מינולט. אם אינך מצליחה להפסיק לעשן ואת מעל גיל 35, ייתכן שהרופא ייעץ לך להשתמש באמצעי מניעה מסוג אחר.
  - אם את בעודף משקל
  - אם יש לך יתר לחץ דם שאינו נשלט על ידי טיפול תרופתי
  - אם לאחד מקרובי המשפחה הקרובה שלך היה בגיל צעיר (מתחת לגיל 50) התקף לב או שבץ. במקרה כזה ייתכן שאת גם כן בסיכון גבוה להתקף לב או שבץ
  - אם לך או לקרוב משפחה שלך מדרגה ראשונה יש רמת שומנים גבוהה בדם (כולסטרול או טריגליצרידים)
  - אם הינך סובלת ממיגרנה, במיוחד מיגרנות עם אאורה
  - אם יש לך בעיה בלב (הפרעות במסתמים, הפרעת קצב הנקראת פרפור פרודוריים)
  - אם יש לך סוכרת.

אם יש לך יותר מאחד מהמצבים האלו או אם אחד מהם חמור במיוחד, הסיכון להיווצרות קריש דם עלול להיות אף גבוה יותר.

אם אחד מהמצבים האלו משתנה במהלך השימוש במינולט, למשל אם התחלת לעשן, קרוב משפחה מדרגה ראשונה חווה פקקת ללא סיבה ידועה או אם עלית הרבה במשקל, ספרי על כך לרופא.

### **גלולות למניעת היריון וסרטן**

סיכון לסרטן שד קיים בכל אישה בין אם היא נוטלת גלולות או לא נוטלת גלולות. סרטן שד מופיע לעיתים רחוקות בנשים מתחת לגיל 40, אך הסיכון עולה ככל שהאישה מבוגרת יותר.

סרטן השד שכיח מעט יותר אצל נשים שנוטלות גלולות לעומת נשים שאינן נוטלות גלולות. אם האישה מפסיקה ליטול את הגלולה, זה יגרום לכך ש-10 שנים לאחר הפסקת נטילת הגלולה הסיכון לאבחנת סרטן השד באישה זו יהיה זהה לסיכון לאישה שמעולם לא נטלה את הגלולה. נראה כי פחות סביר שסרטן השד יתפשט בגוף בנשים אשר התגלה אצלן סרטן שד ונטלו גלולות לעומת נשים שלא נטלו גלולות.

לא ברור אם הגלולה גורמת לסיכון מוגבר לסרטן השד. ייתכן שנשים שנוטלות גלולות נבדקות לעיתים קרובות יותר כך שסרטן השד מתגלה מוקדם יותר.

הסיכון לגילוי סרטן שד לא מושפע ממשך הזמן בו נוטלת האישה גלולות אלא מהגיל שבו הפסיקה ליטול את הגלולה. זאת כי הסיכון לסרטן שד עולה ככל שהאישה מבוגרת יותר.

דיווחים על גידולים ממאירים בכבד אצל נשים שנוטלות גלולות לאורך זמן הינם נדירים. גידולים שפירים בכבד נצפו בנשים אשר נטלו את הגלולה. הפסקת נטילת הגלולה עלולה להיות הכרחית אם יש הפרעה פתאומית או ממושכת בתפקוד הכבד. אין ליטול את הגלולה עד שתפקוד הכבד חזר למצב התקין.

מספר מחקרים מרמזים כי נטילת גלולות למניעת היריון עלולה להעלות את הסיכון לסרטן צוואר הרחם, אולם זה יכול להיות בגלל ההבדל בדפוס התנהגות מינית ולא בגלל הגלולה. על כל הנשים לעבור בדיקת משטח צוואר הרחם באופן סדיר. זיהום כרוני על ידי וירוס הפפילומה (HPV) הינו גורם הסיכון החשוב ביותר לסרטן צוואר הרחם.

עליך לשקול את הסיכונים האפשריים אל מול היתרונות של נטילת הגלולה.

### **פגיעה בראייה**

דווחו מקרים של פקקת בעצב הראייה (סגירה של עורק הראייה המרכזי הגורמת לאיבוד ראייה פתאומי בדרך כלל כמעט מלא) בעת נטילת גלולה למניעת היריון. יש להפסיק את נטילת הגלולה למניעת היריון אם יש איבוד ראייה בלתי מוסבר, חלקי או מלא, נפיחות מהירה בגלגל העין, ראייה כפולה או כל שינוי פתאומי בראייה.

### **מחלה בכיס המרה**

במספר מחקרים דווחה עלייה בסיכון היחסי למחלה בכיס המרה בנשים הנוטלות גלולות למניעת היריון ואסטרוגנים.

### **דימום לא סדיר**

כמו בכל הגלולות, בחודשים הראשונים את יכולה לחוות דימום לא סדיר מהנרתיק (הכתמה או דימום בין-וסתי) בין וסת לווסת. ייתכן שתצטרכי להשתמש באמצעי היגיינה מתאימים, אך המשיכי ליטול את הגלולות כרגיל. דימום לא סדיר מהנרתיק בדרך כלל יפסיק כשגופך יסתגל לגלולות (בד"כ לאחר 3 מחזורים של נטילת גלולות). אנא פני לרופא אם הוא ממשיך, מתגבר או מתחיל שוב.

אם שכחת ליטול גלולה ולאחר מכן אינך מקבלת דימום במרווח נטול הגלולות, יש לשקול אפשרות של היריון.

אם שכחת ליטול גלולה אחת (או יותר), וקיימת יחסי מין לא מוגנים, ייתכן שאת בהיריון. היוועצי ברופא או ברוקח לגבי אמצעי מניעה לשעת חירום.

לאחר שימוש בגלולות ישנן נשים אשר עלולות לחוות אל-וסת (היעדר מחזור חודשי) או מיעוט וסת (וסת נדיר או קל מאוד), במיוחד אם המצב הזה כבר היה קיים.

### **עישון**

דווחי לרופא אם התחלת לעשן במהלך נטילת מינולט.  
הסיכון לפקקת עורקים ולהתקף לב או שבץ בזמן נטילת מינולט עולה אם הינך מעשנת. מומלץ להפסיק לעשן כאשר הינך נוטלת אמצעי מניעה הורמונלי משולב כגון מינולט. אם אינך מצליחה להפסיק לעשן ואת מעל גיל 35, ייתכן שהרופא ייעץ לך להשתמש באמצעי מניעה מסוג אחר.

### **בדיקות, מעקב ומבחני מעבדה**

הרופא יבדוק אותך לפני שירשום לך מינולט; יש לחזור על הבדיקה באופן סדיר. תדירות ואופי הבדיקות צריכים להיות מבוססים על הנחיות וניסיון מעשי ולהתאים לאישה הפרטנית. במהלך הבדיקה לחץ דם אמור להימדד, והיא אמורה לכלול בדיקה של הרחם והאיברים מסביב, שדיים, אגן ובטן. הרופא גם צריך לשים לב להיסטוריה המשפחתית.

יש לבצע בדיקת PAP אם המטופלת פעילה מבחינה מינית או אם יש אינדיקציה אחרת.

לפני ביצוע בדיקות דם יש להודיע לרופא שהינך נוטלת את הגלולה מאחר שהתכשיר עלול להשפיע על תוצאות הבדיקות.

### **תגובות בין תרופתיות**

**אם את לוקחת או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח.**

- תרופות מסוימות עלולות להתערב בפעילות הגלולה. חלק מהתרופות עלולות למנוע את פעילות הגלולה ועלולות לגרום לדימום חריג (דימום בין מחזורים) ומחזור לא סדיר, אלו כוללות:
- תרופה לטיפול באפילפסיה (כגון פניטואין, פרימידון, קרבמזפין, אוקסקארבאזפין, טופירמאט)
  - חלק מתרופות לטיפול בשחפת (ריפאבוטין)
  - פנילבוטזון, דקסמטזון (תרופות אנטי דלקתיות)
  - מודפניל (לטיפול בהפרעות שינה מוגברות במהלך היום)
  - חלק מהתרופות לטיפול ב-HIV/אייס (מעכבי פרטאז)
  - תרופות מסוימות להרגעה ושינה (המכונות "ברביטורטים")
  - גריזופולבין (תרופה לטיפול בזיהומים פטרייתיים)
  - תרופות הגורמות לקיצור זמן המעבר של מזון במערכת העיכול
  - אנטיביוטיקות מסוימות (לדוגמה ריפמפיצין)
  - תערובת צמחית הידועה לרוב כ-St. John's wort (היפריקום פרפורטום).

אם את נוטלת את אחת מהתרופות הנזכרות לעיל יש להשתמש באמצעי מניעה נוסף, למשל קונדום, בזמן נטילתן - ובנוסף במשך 7 הימים הבאים. ייתכן שהרופא ינחה אותך להשתמש באמצעי מניעה נוספים אלה במשך זמן ארוך יותר. בנוסף, עקבי אחר ההנחיות ב-"אם שכחת ליטול מינולט" בפרק 3 בעלון זה.

St. John's wort (היפריקום פרפורטום): דימום בין-וסתי והריונות לא מתוכננים דווחו אצל נשים אשר נוטלות גלולות ו-St. John's wort (היפריקום פרפורטום). אם יש שימוש במקביל בגלולה ו-St. John's wort, מומלץ להשתמש באמצעי מניעה לא הורמונלי במקביל, כמו קונדום.

תרופות מסוימות עלולות להקטין את הפעילות של אנזימי הכבד. דבר זה עלול לגרום לעלייה של מרכיבי הגלולה בדם. דוגמאות לתרופות כאלו כוללות את אטורבסטטין, אינדינוויר, פלוקונאזול וטרולינודמיצין.

תרופות המשפיעות על הספיגה של הגלולה במעיים (כגון חומצה אסקורבית (ויטמין C) ופרצטמול) עלולות להיות בעלות השפעה דומה.

הגלולה עלולה להשפיע על הדרך שפועלות תרופות אחרות, או להעלות את הסיכון של תופעות לוואי אפשריות. אלו כוללות תרופות מסוימות אשר מתפרקות על ידי הכבד (כגון ציקלוספורין, תיאופילין, קורטיקוסטרואידים) והתרופות פלונאריזין ולאמוטריג'ין.

אין להשתמש במינולט אם יש לך הפטיטיס C (דלקת כבד נגיפית) ואת נוטלת תרופות המכילות אומביטאסוויר/ פאריטאפרוויר/ ריטונאוויר, דאסאבוויר, גלקפרוויר/פיברנטסוויר או סופוסבוויר/ ולפטסוויר/ ווקסילפרוויר, משום שתכשירים אלו עלולים להביא לעלייה בתוצאות של תפקודי כבד (עלייה באנזימי כבד מסוג ALT) בבדיקות הדם.  
הרופא ירשום לך אמצעי מניעה אחרים לפני תחילת הטיפול בתרופות אלו.

כשבועיים לאחר סיום הטיפול בתרופות אלו ניתן יהיה להתחיל שוב את השימוש במינולט. ראי סעיף "אין להשתמש בתרופה אם".

כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות, יש להימנע ברופא או ברוקח לפני נטילה של תרופה נוספת בתקופת השימוש במינולט.

#### **היריון, הנקה ופוריות**

אם הינך בהיריון או מיניקה, חושבת שיתכן שאת בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, היוועצי ברופא או ברוקח לפני נטילת התרופה.

אם נכנסת להיריון, הפסיקי ליטול את הכדורים מייד והיוועצי עם הרופא. השתמשי באמצעי מניעה אחר, כמו קונדום, עד אשר ההיריון יאושר. כמויות קטנות של אמצעי המניעה הסטרואידלי ו/או מטבוליטים זוהו בחלב האם של אמהות מיניקות, ומספר תופעות לוואי כולל צהבת והגדלה של השדיים דווחו אצל התינוק. באופן כללי השימוש בגלולה אינו מומלץ עד אשר האם גמלה לחלוטין את הילד מהנקה.

#### **נהיגה ושימוש במכונות**

למינולט אין השפעה ידועה על היכולת לנהוג או להשתמש במכונות.

#### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

מינולט מכילה לקטוז מונוהידראט וסוכרוז - אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פני לרופא לפני נטילת התרופה.

הטבליה מכילה נתרן סידן אדטאט. תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבליה, ניתן להגדירה כי הינה "ללא נתרן" מבחינה מהותית.

### **3. כיצד תשתמשי בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

#### **אודות האריזה**

האריזה עוצבה על מנת לסייע לך לזכור לקחת את הטבליה במועד. כל מגשית מכילה 21 טבליות. כל טבליה מסומנת על גבי אריזת המגש בשם היום בשבוע ובחץ המורה על כיוון ההתקדמות. יש ליטול את הטבליה הראשונה ביום הראשון של הווסת בהתאם ליום בשבוע המסומן על גבי המגשית. זהו היום שבו יהיה עלייך להתחיל כל פעם שתתחילי מגשית חדשה. המשיכי בנטילת הטבליות בכיוון החצים עד גמר כל הטבליות. **המינון המקובל בדרך כלל הוא:** טבליה אחת מדי יום **בשעה קבועה**, מהיום הראשון לווסת ובמשך 21 ימים רצופים ולאחר מכן הפסקה בת 7 ימים בנטילת הגלולות. בהפסקה זו בד"כ תופיע הווסת.

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה. אין מידע לגבי כתישה, חציה או לעיסה של הטבליה.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

משך הטיפול ייקבע ע"י הרופא.

#### **התחלת החפיסה הראשונה**

**כיצד תתחילי בחפיסתך הראשונה כאשר בחודש האחרון לא השתמשת באמצעי מניעה הורמונליים?**

יש ליטול את הטבליה הראשונה ביום הראשון של הווסת, זהו היום הראשון למחזור – היום בו מתחיל הדימום. את תהיי מוגנת מייד.

אם התחלת ליטול את הטבליה הראשונה בכל יום אחר, עלייך להשתמש באמצעי מניעה אחר בנוסף, כגון קונדום, במשך 7 הימים הראשונים לנטילת הטבליות. זה נכון רק עבור המגשית הראשונה.

ניתן לקחת את הטבליה בכל שעה, אולם יש לבלוע את הטבליה באותה שעה כל יום, בדרך כלל נוח לקחת את הטבליה לפני השינה או דבר ראשון בבוקר.

לאחר שסיימת ליטול את כל 21 הטבליות במגשית, עשי הפסקה בת 7 ימים ללא טבליות. כנראה יהיה לך דימום בחלק מהימים האלו.



אין צורך להשתמש באמצעי מניעה נוספים בתקופת ההפסקה של 7 הימים בתנאי שנטלת את כל 21 הטבליות באופן עקבי, ובתנאי שתתחילי את המגשית הבאה בזמן.

### **המגשית הבאה**

לאחר הפסקה בת 7 ימים ללא טבליות, התחילי את המגשית הבאה. עשי זאת בין אם נפסק הדימום או לא. באופן זה נטילת כל מגשית תתחיל תמיד באותו היום בשבוע.

### **התחלת השימוש לאחר לידה או היריון**

הרופא ייעץ לך בנוגע לנטילת גלולות לאחר לידה, הפלה יזומה או הפלה טבעית. ניתן להתחיל ליטול מינולט מייד לאחר הפלה טבעית או הפלה יזומה שהתרחשה ב-3 החודשים הראשונים להיריון.

אם הלידה היתה תקינה ללא סיבוכים מאוחרים, הינך ניידת באופן מלא, אינך מיניקה ולא היתה לך הפסקת היריון בחודש רביעי, חמישי או שישי להיריון, את יכולה להתחיל ליטול מינולט 28 ימים לאחר הלידה או הפלה. יש להשתמש באמצעי מניעה נוספים (כמו קונדום) ב-7 הימים הראשונים של נטילת הגלולה. אם קיימת יחסי מין לא מוגנים לאחר היום ה-21, אל תתחילי ליטול מינולט עד להתחלת הווסת.

אם את מיניקה, הגלולה המשולבת אינה מומלצת עבורך מאחר שהיא יכולה להקטין את זרימת החלב. אם יש לך שאלות בנוגע להתחלת מינולט לאחר לידה או היריון, שאלי את הרופא או הרוקח.

### **מעבר מגלולות אחרות למינולט**

אם את עוברת ליטול גלולות של מינולט לאחר שהשתמשת בגלולה אחרת, עקבי אחר הוראות הרופא.

במקרה של שינוי מגלולה משולבת אחרת של 21 יום מסוג אסטרוגן-פרוגסטרון למינולט, יש ליטול מינולט ביום שלמחרת סיום נטילת סדרת הגלולה הקודמת.

במקרה של שינוי מגלולות משולבות מסוג אסטרוגן-פרוגסטרון של 28 יום, התחילי לקחת מינולט ביום שלאחר נטילת הטבליה הפעילה האחרונה של הגלולה האחרת.

בכל אחד משני המקרים לא צפוי דימום עד לסיום הסדרה הראשונה של מינולט. אין צורך באמצעי מניעה נוספים במקרים אלה.

### **מעבר מגלולה המכילה פרוגסטרון בלבד או אמצעי מניעה מוזרקים או מושתלים למינולט:**

אם את עוברת מגלולה המכילה פרוגסטרון בלבד את יכולה להפסיק את נטילת הגלולה המכילה פרוגסטרון בלבד ביום כלשהו ולהתחיל ליטול מינולט ביום שלמחרת באותה שעה. יש להשתמש באמצעי מניעה נוסף, כמו קונדום, במשך שבעת הימים הראשונים לנטילת המגשית הראשונה.

אם את עוברת מזריקה למניעת היריון או שתל את יכולה להתחיל להשתמש במינולט ביום הוצאת השתל או ביום בו אמורה להינתן הזריקה הבאה. יש להשתמש באמצעי מניעה נוסף (כמו קונדום) במשך שבעת הימים הראשונים לנטילת המגשית הראשונה.

### **אם לא מופיע דימום לאחר סיום המגשית**

אם נטלת נכון את כל הגלולות זה לא סביר שאת בהיריון. אולם, עלייך לוודא כי אינך בהיריון לפני שאת מתחילה את המגשית הבאה.

### **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר של מינולט**

נטילה של יותר מידי טבליות של מינולט עלולה לגרום לבחילות, הקאות, רגישות בשדיים, סחרחורת, כאב בטן, ישנוניות/עייפות. דימום עלול להופיע בחלק מהנשים. במקרה של מנת יתר, צרי קשר עם הרופא או הרוקח.

**אם בטעות בלע ילד מן התרופה,** פני מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, והביאי אריזת התרופה איתך.

### **אם שכחת ליטול מינולט:**

**אם עברו פחות מ-12 שעות מהמועד בו היה עלייך ליטול טבליה,** קחי טבליה מייד כשנזכרת, והמשיכי לקחת את הטבליות הבאות כרגיל.

**אם עברו יותר מ-12 שעות מהמועד בו היית אמורה ליטול טבליה**, יש ליטול את הטבליה האחרונה ששכחת מייד כשנזכרת והמשיכי לקחת את שאר הטבליות כרגיל, אפילו אם המשמעות היא נטילה של 2 טבליות באותו יום. המשיכי ליטול מינולט עד לסיום המגשית כרגיל והשתמשי באמצעי מניעה נוסף (קונדום למשל) במשך 7 הימים הבאים. אם 7 הימים בהם נדרש שימוש באמצעי מניעה נוסף, נמשכים מעבר ליום בו את נוטלת את הטבליה האחרונה במגשית הנוכחית, יש להתחיל את המגשית הבאה למחרת נטילת הטבליה האחרונה של המגשית הנוכחית ללא הפסקה. במקרה זה יתרחש דימום מהנרתיק (הווסת) רק בסיום המגשית השנייה. אם אינך מקבלת את הווסת בסיום המגשית השנייה יש לפנות לרופא מייד, לפני התחלת השימוש במגשית חדשה.

#### **אם הינך סובלת מהקאות או שלשולים**

ייתכן שהגלולה לא תעבוד. אם השלשולים או ההקאות מופיעים **תוך 4 שעות** מנטילת הטבליה, עקבי אחר ההוראות של "אם שכחת ליטול מינולט - אם עברו פחות מ-12 שעות מהמועד בו היה עליך ליטול טבליה". את הטבליה הנוספת יש ליטול ממגשית רזרבית. אם ההקאות או השלשולים מופיעים לאחר **יותר מ-4 שעות** מנטילת הטבליה, המשיכי בנטילה כרגיל, אך את עלולה לא להיות מוגנת מהיום הראשון להופעת השלשולים או ההקאות. השתמשי באמצעי מניעה נוסף, כגון קונדום, במהלך התקופה של השלשולים וההקאות עד להתחלת השימוש במגשית הבאה.

#### **אם ברצונך להפסיק ליטול את התרופה**

את יכולה להפסיק את השימוש במינולט בכל עת. אם אינך מעוניינת להיכנס להיריון, התייעצי עם הרופא לגבי אמצעי מניעה יעילים אחרים.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדקי התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה. הרכיבי משקפיים אם הינך זקוקה להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועצי ברופא או ברוקח.**

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש במינולט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבלי מאף אחת מהן.

אם את סובלת מתופעת לוואי, במיוחד אם היא חמורה או מתמשכת או אם הינך חשה בשינוי כלשהו בבריאותך ואת חוששת שיתכן שהוא נובע משימוש במינולט פני אל הרופא.

עלייה בסיכון להיווצרות קריש דם בוורידים (פקקת ורידים) או בעורקים (פקקת עורקים) קיימת עבור כל הנשים המשתמשות באמצעי מניעה הורמונלי משולב. למידע מפורט יותר ראי פרק 2 "לפני שימוש בתרופה".

#### **פני מייד לרופא אם את חשה באחד מהתסמינים הבאים:**

- נפיחות הפנים, השפתיים או הגרון הגורמת לקושי בבליעה או בנשימה וכן גרד ופריחה. הדבר יכול להיות סימן לאלרגיה חמורה למינולט
- פריחה חמורה ופתאומית
- כאב ראש חריף או מיגרנה
- קושי בראייה או בדיבור
- כאב או נפיחות ברגליים
- עילפון
- כאב בחזה או בבטן
- קוצר נשימה
- חוסר תחושה ביד או ברגל
- שיעול דמי
- גושים בשדיים.

#### **תופעות לוואי חמורות**

פני לרופא מייד אם את חווה אחד מהתסמינים הבאים של אנגיואדמה: נפיחות הפנים, הלשון ו/או לוע ו/או קושי בבליעה או פריחה (סרפדת) שיתכן שילוו בקשוי נשימה (ראי גם "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה")

הרופא כנראה יפסיק את השימוש במינולט אם:

- הופיעה צהבת
- לחץ הדם עלה
- אם את סובלת ממצב אשר יכול להחמיר עם שימוש בגלולה ומראה סימנים של החמרה (ראי פרק 2 "לפני השימוש בתרופה").

#### אם יש לך דימום בזמן נטילת הטבליות

בתחילת השימוש בטבליות ייתכן דימום בין וסתי או דימום מכתים, אך הווסת אמורה להסתדר לאחר מספר חודשים. אולם אם הדימום כבד, ממושך או חוזר היועצי ברופא.

מינולט יכולה לגרום לתופעות לוואי קלות. ספרי לרופא אם התסמינים הבאים מטרידים אותך:

#### תופעות לוואי שכיחות מאוד – תופעות שמופיעות ביותר ממשתמשת אחת מעשר:

- כאב ראש, כולל מיגרנה
- דימום בין וסתי/הכתמות.

#### תופעות לוואי שכיחות – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשות מתוך 100:

- כאב בטן/התכווצויות בבטן
- בחילות והקאות
- שינויים במשקל הגוף
- שינויים בדחף המיני
- מצבי רוח דיכאוניים, עצבנות
- סחרחורת
- רגישות בשדיים או הפרשה מהשדיים
- אקנה
- דימום לא סדיר או דימום כואב או העדר דימום
- אצירת נוזלים או נפיחות
- שינויים בהפרשות נרתיקיות, זיהום נרתיקי כמו פטריה בנרתיק.

#### תופעות לוואי שאינן שכיחות – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשות מתוך 1,000:

- שינויים בתיאבון
- פריחה, הופעה של כתמים חומים על הפנים והגוף כמו אלו המתרחשים בהיריון (כלואזמה), גרד
- דילול השיער או שיעור לא רגיל
- עליית לחץ הדם
- שינויים ברמות השומנים בדם
- עוויותות בבטן, נפיחות.

#### תופעות לוואי נדירות – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשות מתוך 10,000:

- תגובות אלרגיות חמורות כולל אנגיואדמה וסרפדת (נפיחות בעור המלווה בגרד וחרלת)
- אי סבילות לגלוקוז
- בעיות בשימוש בעדשות מגע
- אדמנת קשרית (Erythema nodosum)
- ירידה ברמות חומצה פולית בדם
- עימרון מרה הגורם לצהבת (זרימה לא תקינה של נוזל המרה בכבד גורמת להצהבה של העור)
- קריש דם מזיק בווריד או בעורק לדוגמה:
  - ברגל או בכף רגל (פקקת ורידים עמוקה)
  - בריאה (תסחיף ריאתי)
  - התקף לב
  - שבץ
  - שבץ קטן או תסמינים חולפים דמויי שבץ, תופעה הידועה בשם אירוע איסכמי חולף
  - קרישי דם בכבד, בקיבה/מעי, בכליות.

הסיכוי לקריש דם עלול להיות גבוה יותר אם יש לך אחד מהמצבים האחרים אשר מגבירים את הסיכון (ראי פרק 2 למידע נוסף על מצבים המגבירים את הסיכון לקרישי דם ולתסמינים של קרישי דם).

#### תופעות לוואי נדירות מאוד – תופעות שמופיעות בפחות ממשתמשת אחת מתוך 10,000:

- קרישי דם מזיקים בווריד או עורק לדוגמה:
  - בעין
- הסיכוי לקרישי דם עלול להיות גבוה יותר אם יש לך אחד מהמצבים האחרים אשר מגבירים את הסיכון (ראי פרק 2 למידע נוסף על מצבים המגבירים את הסיכון לקרישי דם ולתסמינים של קרישי דם).
- מחלה בכיס המרה (כולל אבנים בכיס המרה)
- פנקריאטיטיס (דלקת בבלבל), הפרעה בדם הנקראת סינדרום אורמי (מצב שבו קרישי דם גורמים לכשל כלייתי)
- החמרה של זאבת אדמנתית (מחלה דלקתית אשר יכולה להשפיע על חלקים רבים בגוף כולל עור, מפרקים ואיברים פנימיים), פורפיריה וכוריאה (הפרעה תנועתית)
- דלקת בעצב הראייה (עלול להוביל לעיוורון חלקי או מלא)
- החמרה במצב דליות ורידים
- דלקת איסכמית של המעי הגס (דלקת עקב זרימת דם לא מספקת למעי הגס)
- גידול שפיר בכבד
- סרטן בכבד
- חום ופריחה בפנים ובגפיים.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

**מנעי הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנעי הרעלה. אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן את התרופה מתחת ל-25°C. יש לשמור את המגשית באריזת הקרטון על מנת להגן מאור.

## 6. מידע נוסף

**נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:**

Lactose Monohydrate, Sucrose, Maize Starch, Calcium Carbonate, Talc, Macrogol 6000, Povidone K-25, Magnesium Stearate, Povidone K-90, Sodium Calcium Edetate, Wax E Pharma, Purified Water (q.s.).

כל טבליה מכילה: 37.5 מ"ג לקטוז מונוהידראט ו-19.7 מ"ג סוכרוז.  
בנוסף הינה מכילה נתרן.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

- אריזה קרטון המכילה מגשית אחת של 21 טבליות בצבע לבן.
  - אריזת קרטון המכילה 3 מגשיות, כל מגשית מכילה 21 טבליות בצבע לבן.
- ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

**בעל הרישום:** פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

**מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

050-50-25757 עודכן ב-04/2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות