

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משוקת על פי מרשם רפואי בלבד

פינטפלה תמיישה (פומוי)

החומר הפעיל וكمותו:

כל מ"ל תמיישה מכיל 2.2 מ"ג פנפלורמין (fenfluramine hydrochloride) כ Fenfluramine hydrochloride (fenfluramine hydrochloride).

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בסעיף 2 וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעalon, לתקשיר פינטפלה קיים מדריך מידע בטיחותי למטופל ולהורי המטופל.
מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בפינטפלה ולפעול על פיו.
יש לעיין במדריך מידע בטיחותי למטופל ולהורי המטופל ובעalon לצריכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר.
יש לשמר את המדריך לעיון נוספת במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

פינטפלה מיועדת לטיפול בהתקפים אפילפטיים הקשורים לתסמונת בשם דרווה (Dravet syndrome) כתוספת לטיפולי אנטי-אפילפטיים לחולים בני שנתיים ומעלה.

פינטפלה אינה מיועדת לטיפול בהשמנת יתר.
קבוצה טיפולית – התרופה שייכת לקבוצת תכשירים אנטי-אפילפטיים.

2. לפני שימוש בתרופה: אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה או ילך רגש (אלרגי) לחומר הפעיל (fenfluramine) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוספת").
- אם אתה או ילך סובל ממחלה לב כגון "מחלת מסטם" או "יתר לחץ דם עורקי ריאתי" (לחץ דם גבוה בעורקי הריאה).
- אם אתה או ילך נטלו תרופות מקבוצת מעכבי מונואמין אוקסידאז בשבועיים האחרונים.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
פינטפלה מכילה פנפלורמין, על כן היא תרופה המוגדרת כסם. היא יכולה לגרום לתלות או עלולים לעשות בה שימוש לא נכון. יש לשמר את התרופה במקום בטוח כדי למנוע שימוש לא נכון.

- יש לשמור את פינטפלה במקום בטוח כדי להגן מגניבתה. מכירה או מסירה של פינטפלה אחרים עלולה לגרום נזק ונוגדת את החוק.
- ספר לרופא אם נעשה שימוש לרעה בתרופה על ידך או על ידי ילך או אם פיתחתם תלות באלכוהול, בתרופות מרשם או בסמים בלתי חוקיים.

פני הטיפול בפינטפלה ספר לרופא אם:

- אתה או ילך סובלים מלחץ תוך עיני (גלאוקומה).

- לrk או ילזר hו מוחשיות לפגיעה עצמית או אובדן.
- אתה או ילזר מטופלים בתרופה צ'פרופטידין, המיעדת לטיפול באלהות או לשיפור התיאבון.
- אתה או ילזר נוטלים תרופות שעשוית להעלות את רמות הסרotonin במות. תרופות אלה בשילוב עם פינטולה עלולות לגרום ל-"**תסמונת סרוטוני**" שהינו מצב מסכן חיים.

▪ תרופות שעשוית להעלות את רמת הסרotonin כוללות:

- טריפטנים (כגון סומטריפטן) – לטיפול במיגרנה
- מעכביamonaminergic אוקסידאז – לטיפול בדיכאון
- מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטוני (SSRI) או מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטוני ונורא芬פראין (SNRI) – או נוגדי דיכאון טריציקליים לטיפול בדיכאון וחרדה.

▪ סימנים לתסמונת סרוטוני כוללים:

- להיות נסער, היזות, עילוף
- בעיות לב וזרימת דם כגן דופק מואץ, לחץ דם עולה ויורד, טמפרטורת גוף גבוהה, הצעה
- עוויתות שרירים וחוסר תיאום
- בחילה ושלשלות

פנה אל הרופא מיד אם אתה חווה אחת מתופעות הלוואי החמורות הנ"ל.

ילדים

פינטולה אינה מיועדת לטיפול בילדים מתחת לגיל שנתיים. התכשיר לא נבדק באוכלוסייה זו. אין נתונים לגבי הבטיחות או היעילות של הטיפול בילדים מתחת לגיל שנתיים.

קשישים

אין נתונים על שימוש בפינטולה באוכלוסייה זו.

בדיקות ועקב

במשך תקופת הטיפול בתכשיר, תופנה על ידי הרופא לבדיקות:

לב – ביצוע אקו לב (ECHO). הרופא יודא שפעילות המסתומים בלב תקינה ושהליך בעורק בין הלב והריאות לא גבוה מדי.

מתחלת הטיפול שלך או של ילזר, יש לבצע אקו לב כל 6 חודשים, במשך השנה הראשונות של הטיפול, ולאחריה פעם בשנה.

אם הטיפול בפינטולה מופסק, עליך או על ילזר לבצע אקו לב 6 חודשים אחרי המנה الأخيرة.

משקל – הרופא יבדוק את המשקל לפני ובזמן הטיפול, כי פינטולה עשויה לגרום לירידה במשקל.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופחת. במילויים אתה או ילזר נוטל או נטל עד לאחרונה אחת מהתרופות הבאות:

- סטיריפנטול – תרופה לאפילפסיה. זה ידרוש התאמת מינון של פינטולה.
- טריפטאנים, מעכבי monoaminergic אוקסידאז, מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטוני (SSRI) או מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטוני ונורא芬פראין (SNRI).
- קרבזפין, פרימידון, ריפמפיקין, פנברבריטל וברבටוראטים אחרים, פנטואין ואפאירנד – במקרה זה תידרש העלאת המינון של פינטולה.

פינטולה עלולה להשפיע על פעילותן של תרופות אחרות. כמו כן, תרופות אחרות עשויות להשפיע על הפעולות של פינטולה.

פינטולה עשויה לגרום לך או ילזר לשינויים. אתה או ילזר עשויים להרגיש יותר ישוניים אם נוטל תרופות נגד דיכאון.

שימוש בתרופה ומדוזן

יש ליטול פינטולה עם או בלי מזון. במקרה של רגשות בקיבה, קח את התרופה עם אוכל. פינטולה מכילה כמות מאוד מוגבלת של חומרים ומתחילה לתזונה קטוגנית.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

שתיתת אלכוהול עם נטילת פינטפלה עלולה לגרום לשנןיות.

הירון, הנקה ופוריות

הירון: הנזונים לגבי השימוש בהירון מוגבלים. כאמור זירות עדיף להימנע מנטילת פינטפלה בזמן הירון.

הנקה: לא ידוע אם פנפלורמין מופרשת בחלב אם. לא ניתן לפסול סיכון לIONK. יש לשקל את יתרון ההנקה והחשיבות של הטיפול בפינטפלה ולקבל החלטה לגבי הפסקת ההנקה או לחילופין הימנע מנטילת פינטפלה.

פוריות: לא נמצא נתונים של השפעת פנפלורמין על פוריות לבני אדם, אך מחקרים בבעלי חיים מעלים אפשרות של פגיעה בפוריות בנקבות.

נהיגה ושימוש במכונות

פינטפלה עשויה לגרום לעייפות וישנוויות, עקב כך יש לה השעה מתונה על יכולת לנוהג במכונית או הפעלת מכונות. אם אתה מרגיש ישנוויות, עליך להימנע منهاiga או הפעלת מכונות. אם ילך מטופל בפינטפלה ומרגיש ישנווי, עליו להימנע מרכיבתה על אופניים או פעילות ספורטיבית אחרת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פינטפלה מכילה אומללה (E 215) ו sodium methyl p-hydroxybenzoate (E 219) sodium ethyl p-hydroxybenzoate - העולאים לגרום לתגובה אלרגיות מאוחרות.

פינטפלה מכילה sulfur dioxide (E220), אשר במקרים נדירים עלול לגרום לתגובה של רגשות יתר ועוותת סימפוניות (bronchospasm).

פינטפלה מכילה דקסטרוז (גלווקוז) אשר יכולה להזיק לשיניים. אם לך או ילך יש אי-סיבות לסוכרים מסוימים, עדכן את הרופא המטפל.

פינטפלה מכילה גנט – 23 מ"ג ב-12 מ"ל תמיישה. בריכוז זה התרופה נחשבת ל "לא נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בתוחה בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

- כל מנה תוגדר במספר מ"ל שיש ליטול.

• יש ליטול את התרופה פעמיים ביום.

• הרופא יתחיל הטיפול במינון נמוך, אשר אפשרי שיעלה בהדרגה על פי ההשפעה שיש לתרופה עליך או על ילך.

• המנה המרבית היא 6 מ"ל פעמיים ביום.

• אם אתה נוטל סטייריפנטול, המנה המרבית המותרת היא 4 מ"ל פעמיים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

- יש ליטול את התרופה עם מזון או בין ארוחות.

• פינטפלה הינה תמיישה ויש למדוד את המנה במרקם לשימוש פומי המצורף לאריזה.


• השתמש במרקם הירוק של 3 מ"ל למנות עד 3.0 מ"ל.

• השתמש במרקם הסגול למנות בין 3.2 מ"ל ל 6.0 מ"ל.


• פינטפלה מתאים לשימוש עם מרבית הצינוריות להזנה ישירה לקיבה או למעי הדק (אנטרליית).

• על מנת לנחות את הצינוריות יש למלא במים את מרקם המדידה ולשטוף את הצינורית 3 פעמים.

מזרק ירוק - 3 מ"ל
3 mL syringe - green




מזרק סגול - 6 מ"ל
6 mL syringe - purple







1



2



- רשום על האריזה את תאריך הפתיחה
- הריאונה של הבקבוק
- בפעם הריאונה שאתה פותח את הבקבוק,
עליך להצמיד את המתאים
- **הכנסת המתאים – ציור 1 ו- 2:**
- רחץ ונגב ידך ○
- הוציא את המתאים מאריזתו ○
- הניח את הבקבוק על משטח ישר ויציב ○
- פתח את הבקבוק ○
- דחוף את המתאים לצוואר הבקבוק ○
- החזק את הבקבוק ○
- ישר קו בין המתאים לחלק העליון של
הבקבוק ○
- דחוף עם כף ידך את המתאים לתוך הבקבוק ○
- עד שהוא ישתלב עם החלק העליון של
הבקבוק ○
- לאחר השימוש בתרופה, השאר את
המתאים בבקבוק ○
- הברג את מכסה הבקבוק, כאשר המתאים
נשאר בו ○

	<ul style="list-style-type: none"> • נטילת התרופה • ציר 3 ○ לפני מדידת המנה, הבטח כי בוכנתה המדידת נדחפה עד הסוף לתוך המזרק לשימוש פומי. ○ החזק את בקבוק התרופה בחזקה על משטח קשיח ושטוח. ○ דחוף את קצה המזרק לשימוש פומי לתוך מתאם הבקבוק עד שלא ניתן לדחוף אותו הלאה.
	<ul style="list-style-type: none"> • ציר 4 ○ החזק את המזרק לשימוש פומי והבקבוק ייחדיו והפוך אותם. ○ משור באטיות את הבוכנה כדי למשור את המנה הבוכנה. ○ החזק את המזרק לשימוש פומי והבקבוק ייחדיו ולאחר מכן הפוך. ○ החזק את הבקבוק בחזקה, משור בעדינות את המזרק לשימוש פומי מתוך מתאם הבקבוק.
	<ul style="list-style-type: none"> • ציר 5 ○ הנח את קצה המזרק לשימוש פומי נגד החלק הפנימי של החלק המטופל. ○ דחוף בעדינות את הבוכנה עד שהיא נלחצת במלואה. ישאר נפח קטן של התרופה בקצה. זה מקובל. ○ אין להתירות את התרופה אל החלק האחורי של הגרון מכיוון שהדבר עלול לגרום לחנק.
	<ul style="list-style-type: none"> • ציר 6 ○ הנח את הפקק בחזרה על הבקבוק וסובב עד שייעצר. ○ השאר תמיד את המתאים במקום בבקבוק.
	<ul style="list-style-type: none"> • שטיפת המזרק לשימוש פומי – ציר 7 ○ לאחר כל שימוש יש לשטוף את המזרק לשימוש פומי במים נקיים ולתת לו להתייבש באוויר. ○ שטוף את החלק הפנימי של המזרק ואת הבוכנה. ○ ניתן לשור מים נקיים לתוך המזרק עם הבוכנה ולדוחוף החוצה מספר פעמים כדי לנקיות את המזרק.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ אפשר להפריד את הבוכנה מהמזרק כדי לשטוף כל חלק בונפרד. ○ ניתן לשטוף את המזרק והבוכנה במדיח כלים. ○ המזרק והבוכנה חייבים להיות יבשים לחלווטן לפני השימוש הבא.
--	---

אם אתה או ילך נטל **בטיעות מינון גבואה יותר** פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. הסימנים הבאים עשויים להופיע: נסער, ישנווי או מבולבל, סומך או תחושה של חום, רעד והזעה.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד, קח את המנה מיד כשנזכרת אך אם המועד הקרוב לנטיילת המנה הבאה, אין ליטול מנה כפולה. **دلג על המנה ששכחת** וקח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם הרופא יחליט על הפסקת הטיפול בפינטפלה, הוא יוריד בצורה הדרגתית את המינון היומי במטרה לצמצם את הסיכון של פרכוסים וסתומים אפילפטיקוים. אתה או ילך תידרשו לבצע אקו לב שישה חודשים אחרי המנה الأخيرة של פינטפלה

אין ליטול תרופות בחושרי! בדוק התווות והמנה בכל פעם שאתה נטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זוקן להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפינטפלה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מ אף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

פינטפלה עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות.

יש לפנוך מיד לרופא אם אתה סובל מאחד הסימנים האלה המעידים על תסמונת סרטוני:

- אתה נסער, חזזה (רואה דברים שאינם שם) או מתעלף.
- בעיות לב ומחזור הדם כגון דופק מהיר, לחץ דם עולה ויורד, טמפרטורת גוף גבוהה, הזעה.
- עווית שרירים וחוסר קואורדינציה.
- תחושת בחילה ושלשלולים.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות המופיעות ביותר ממטופל אחד ב-10)

- נפילות
- שלשלולים
- הקאות
- ירידת בمشקל
- עצירות
- אובדן תיאבון
- חום
- ירידת ברמות הסוכר בدم
- אקו לב חריג
- תחושת עייפות, ישנוויות או חולשה

- זיהום בבית החזה וברונכיט
- רעד בידים, זרעות או רגלים
- פרוכסים ממושכים (סטטוס אפילפטיקו)

תופעות לוואי שכיחות (תופעות המופיעות ב��וגן אחד ב-10)

- גրיות
- זיהום באזניים
- התנוגות חריפה

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/תוויות.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמור בטמפרטורת החדר.
- אין לאחסן בקירור. אין להקפיין!
- לאחר פתיחה ראשונה, יש להשתמש תוך 3 חודשים ולאחסן בטמפרטורת החדר.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

- potassium citrate monohydrate
- citric acid monohydrate
- hydroxyethylcellulose
- (monosodium phosphate (E 339); Disodium phosphate (E 339)-pH stabilizers)
- sodium methyl para-hydroxybenzoate (E 219)
- sucralose (E 955)
- cherry flavouring powder:
 - dextrose (maize)
 - gum arabic/acacia gum (E414)
 - ethyl benzoate
 - sulfur dioxide (E 220)
 - natural flavouring preparations
 - natural flavouring substances
 - flavouring substances
 - maltodextrin (maize)
- sodium ethyl para-hydroxybenzoate (E 215)
- water for injections

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץיה

פינטפליה הינה תמיישה שקופה, חסרת צבע, בטעם דובדבן, מעט צמיגה.

כל אריזה מכילה:

- בקבוק אחד של תמיישה בנפח 60 מ"ל, 120 מ"ל, 250 מ"ל או 360 מ"ל.

- מתאים לבקבוק.
- 2 מזרקי מדידה של 3 מ"ל עם סימונים כל 0.1 מ"ל.
- 2 מזרקי מדידה של 6 מ"ל עם סימונים כל 0.2 מ"ל.

ויתכן שלא כל גודלי האריזות משווים.

בעל הרישום וכותבו: מדיסון פארמה בע"מ, השילוח 10, ת.ד 7090 פתח תקווה.

היצן וכותבו: Zogenix Inc., 5959 Horton Street, Suite 500 Emeryville, CA 94608, USA

נערכ בינוי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 99-96-41-36976-169

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים