

أوكسيكودونتين 10، 20، 40، 80 أقراص بالتحريير المراقب

المادة الفعالة:

يحتوي كلّ قرص من أوكسيكودونتين 10 على: 10 ملغ من أوكسيكودون هيدروكلوريد (oxycodone hydrochloride)
يحتوي كلّ قرص من أوكسيكودونتين 20 على: 20 ملغ من أوكسيكودون هيدروكلوريد (oxycodone hydrochloride)
يحتوي كلّ قرص من أوكسيكودونتين 40 على: 40 ملغ من أوكسيكودون هيدروكلوريد (oxycodone hydrochloride)
يحتوي كلّ قرص من أوكسيكودونتين 80 على: 80 ملغ من أوكسيكودون هيدروكلوريد (oxycodone hydrochloride)

لقراءة قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استخدامك للدواء.

تتضمن هذه النشرة معلومات ملخصة عن الدواء. وإذا كانت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
لقد وُصف هذا الدواء لعلاج حالتك. لا تعطه للآخرين. ذلك لأنه قد يؤديهم حتى إذا بدا لك أنّ حالتهم الطيّبة مشابهة.

من شأن الأدوية من فصيلة الأفيونيات أن تسبب الإدمان تحديداً عند استخدامها لفترة طويلة، كما أنّها قد تؤدي إلى إساءة الاستخدام والتجريح المفرط. وقد يتجلى ردّ الفعل على التجريح المفرط بتباطؤ التنفس ويمكنه أن يكون فتاكاً.
تحقق من معرفتك لاسم الدواء وكن على علم بالجرعة التي تتناولها ووتيرة تناولها وفترة العلاج والأعراض الجانبية والمخاطر الكامنة. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن خطر الاعتماد والإدمان في الرابط التالي:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_ar.pdf

إنّ تناول هذا الدواء بالتزامن مع الأدوية من فصيلة البنيزوديازيبينات أو أدوية أخرى تثبّط الجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول قد يسبب الشعور بالميل الشديد إلى النوم، وصعوبات التنفس (التثبيط التنفسي) والغيوبة والوفاة.

1. لأيّ غرض خصص هذا الدواء؟

الدواء مخصّص لتسكين الألم المتواصل المتوسط إلى الشديد.

الفصيلة العلاجية: مسكّنات الألام الأفيونية.

وصف هذا الدواء لك فقط وممنوع إعطاؤه لأيّ شخص آخر. قد تؤدي الأفيونيات إلى الإدمان وقد تتناكب أعراض الانسحاب في حال توقفت عن تناولها بشكل فجائي. تحقق من الحصول على شرح من طبيبك حول مدة العلاج بالدواء والموعّد المناسب للتوقّف عن تناوله والطريقة الآمنة للقيام بذلك.

2. قبل استخدام هذا الدواء

يُمنع استخدام هذا الدواء إذا:

- كنت حساساً (كان لديك تحسس) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد)، أو لأيّ واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (لقراءة قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6).
- كنت تعاني من مشاكل التنفس، مثل المرض الرئوي الانسدادي المزمن الخطير، الربو القصبي الخطير، والتثبيط التنفسي الخطير. وقد تشمل الأعراض ضيق التنفس، السعال أو ضعف أو تباطؤ التنفس أكثر من المتوقع.
- كنت تعاني من اختلال وظيفة المعى الدقيق (انسداد الأمعاء، أو إذا كان يُشكّ بوجود انسداد الأمعاء)، تباطؤ تفريغ المعدة، أو جاع البطن الخطيرة، أو الإمساك المزمن.
- كنت تعاني من مشكلة في القلب في أعقاب المرض الرئوي المتواصل (cor pulmonale).
- كنت تعاني من مستوى عالٍ من ثنائي أكسيد الكربون في الدم. قد تشمل الأعراض الدوار، النعاس، التعب، ضيق التنفس والصداع.
- كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل أخرى في الكبد تدوم لفترة طويلة، فاستشر الطبيب.
- كنت تعاني من الخلل الخطير في وظيفة الكليتين.
- ممنوع استخدام أوكسيكودونتين 80 إذا لم تكن معتاداً على استخدام العقاقير الأفيونية.
- لا يجوز استخدام أوكسيكودونتين 10، 20، 40 و80 لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنةً.

التحذيرات الخاصة المتعلقة باستخدام الدواء:

قبل العلاج بأوكسيكودونين (وخالاه)، أخبر الطبيب إذا:

- كنت أنت أو كان أحد أفراد عائلتك يعاني أو عانى سابقاً من الإدمان على الأفيونيات، الكحول، الأدوية أو المخدرات.
- كنت مدخناً.
- قد عانيت سابقاً من مشاكل مزاجية (الاكتئاب، القلق، اضطرابات الشخصية) أو عانيت سابقاً من مشاكل نفسية أخرى استلزمت العلاج من قبل طبيب نفسي.
- عانيت في الماضي من أعراض الانسحاب، مثلاً: التملل، القلق، الارتعاش، أو التعرق في أعقاب التوقف عن استهلاك الكحول أو الأدوية أو المخدرات.
- شعرت بالحاجة إلى تناول المزيد من الأقراص لتسكين الآلام ذاتها. قد تشير هذه الظاهرة إلى نشوء التحمل لتأثيرات الدواء أو الإدمان على الدواء. في هذه الحالة يترتب عليك مراجعة الطبيب لمناقشة العلاج والتفكير فيما إذا توجب تغيير الجرعة أو استبدال الدواء بمسكن آخر للألم.
- كنت مسناً أو منهكاً.
- كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية (القصور الدرقي)، لأنك قد تحتاج إلى جرعة أقل.
- كنت تعاني من الوذمة المخاطية وهي مشكلة في الغدة الدرقية تتمثل في الجفاف والجلد البارد والمنتفخ والمصاب بالوذمة وتؤثر على الوجه والأطراف.
- كنت تعاني من إصابة أو ورم في الدماغ، أو إصابة في الرأس، أو الضغط المتزايد داخل الجمجمة (قد يتمثل في الصداع الخطير والغثيان).
- كنت تعاني من نقص ضغط الدم أو نقص حجم الدم (الحالة التي قد تنشأ عن النزف الداخلي أو الخارجي الخطير، الحروق الخطيرة، فرط التعرق، الإسهال الخطير أو التقيؤ).
- كنت تشعر بالدوار الشديد، بالإغماء أو بانخفاض مستوى الوعي.
- كنت تعاني من مشكلة نفسية بسبب استخدام عقاقير معينة (الذهان التسممي) أو إدمان الكحول أو الهذيان الارتعاشي (الحالة الذهانية الناتجة عن الإقلاع عن تعاطي الكحول).
- كنت تعاني من التهاب البنكرياس (الحالة المسببة للأوجاع الشديدة في البطن والظهر)؛ مشاكل في كيس المرارة أو القنوات الصفراوية؛ مرض الأمعاء الالتهابي؛ تضخم البروستاتا، مما يسبب صعوبة التبول (لدى الرجال)؛ اختلال وظيفة الغدة الكظرية (مما قد تسبب الأعراض مثل الضعف، خسارة الوزن، الدوار، الغثيان، والتقيؤ)، مثل مرض أديسون.
- كنت تعاني من الخلل الخطير في وظيفة الرئتين. قد تشمل الأعراض ضيق التنفس والسعال.
- كنت تعاني من ألم متواصل لا علاقة له بالسرطان.
- كنت تعاني من حالة يتوقف فيها التنفس لديك لمدة قصيرة خلال النوم، مما يسمى انقطاع التنفس خلال النوم (sleep apnoea).
- كنت تعاني من مشاكل في الكليتين أو الكبد. انظر أيضاً البند "يُمنع استخدام هذا الدواء إذا".
- كنت تعاني أو قد عانيت سابقاً من مشاكل الجهاز الهضمي مثل سرطان المريء أو الأمعاء، والتضييق، أو قد خضعت لجراحة، أو كنت تعاني من الإمساك.

تحذيرات إضافية:

يُمنع مضغ، سحق، إذابة، شطر أو كسر القرص. لا تستخدم الدواء إذا كنت لا تستطيع بلع القرص بالكامل. إذا كنت تعاني من صعوبة البلع وصعب عليك بالتحديد بلع الأقراص، فيجب إبلاغ الطبيب المعالج بذلك قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

- تحتوي أقراص أوكسيكودونين على أوكسيكودون (وهو مركب أفيوني)، فلذا تُحتمل إساءة استخدامها. لا يجوز إعطاء أوكسيكودونين لأي شخص آخر. ويجب اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية لمنع وصول أي شخص باستثناء متلقي العلاج إلى هذا الدواء.
- من شأن الاستخدام المتواصل أن يسبب الاعتماد على المنتج!
- قد يؤدي تناول هذا الدواء بانتظام وبخاصة لمدة طويلة إلى الإدمان. قد يؤدي ذلك إلى جرعة زائدة مهددة للحياة. إذا كانت لديك مخاوف من أن تصبح مدمناً على المخدرات، فمن المهم أن تستشير طبيبك. تحقق من الحصول على شرح من طبيبك حول مدة العلاج بالدواء والموعد المناسب للتوقف عن تناوله والطريقة الآمنة للقيام بذلك.
- قد يؤدي الإدمان إلى أعراض الانسحاب عند التوقف عن تناول الدواء. قد تشمل أعراض الانسحاب التملل، صعوبات النوم، العصبية، عدم الهدوء، القلق، الشعور بدقات القلب (الخفقان)، زيادة ضغط الدم، الغثيان، التقيؤ، الإسهال، نقص الشهية، الارتعاش، القشعريرة، والتعرق. قبل التوقف عن استخدام الدواء، استشر الطبيب كي يرشدك إلى خفض الجرعة بالتدرج. من المهم ألا تتوقف عن تناول الدواء بشكل فجائي لأن ذلك يزيد من خطر نشوء أعراض الانسحاب. انظر أيضاً "إذا توقفت عن تناول الدواء" في البند 3.

- يزيد تناول الجرعات العالية من الأفيونيات أو تناول الأفيونيات أحياناً مقاربة من خطر نشوء الإدمان. قد يؤدي الاستخدام المفرط وسوء الاستخدام إلى تناول الجرعة المفرطة وحتى الوفاة.
- مشاكل الجهاز التنفسي المتعلقة بالنوم: من شأن الدواء أن يسبب و/أو يفاقم مشاكل التنفس خلال النوم، مثل انقطاع النفس أثناء النوم (توقف عملية التنفس خلال النوم - sleep apnoea) ونقص تأكسج الدم (انخفاض مستوى الأكسجين في الدم) خلال النوم. يجب إخبار الطبيب

- في حال لاحظت أنت أو إذا لاحظ شخص ما حولك الأعراض التالية: توقّف التنفّس خلال النوم، والاستيقاظ نتيجة لضيق التنفّس، الصعوبة في البقاء نائمًا أو الميل المتزايد إلى النوم خلال ساعات النهار. في هذه الحالة قد يوصي الطبيب بخفض الجرعة الدوائية.
- لا يجوز حقن الدواء. قد يسبّب حقن الدواء أعراضًا جانبية خطيرة بما في ذلك موت الأنسجة في موضع الحقن، والتلوث، والتهاب الرئتين، وتضرّر القلب الذي قد يسبّب الوفاة.
 - في أحيان نادرة، قد تجعلك زيادة الجرعة الدوائية أكثر حساسيةً للألم. في هذه الحالة يتعيّن عليك مراجعة الطبيب لاستشارته بخصوص العلاج.
 - إذا كنت قد خضعت مؤخرًا أو كان من المخطّط له خضوعك لعملية جراحية قريبًا، أو أيّ عملية منوطة بالتخدير، فيجب عليك إخبار الطبيب بتناولك لهذا الدواء. لا يوصى باستخدام الدواء قبل الجراحة. يجب توخّي الحذر عند استخدام الدواء خلال أول 24 ساعة بعد الجراحة تبعًا لتعليمات الطبيب (الذي قد يعدّل جرعتك).
 - ويُمنع الانتقال من وضعية الاستلقاء/الجلوس إلى وضعية الوقوف بشكل مفاجئ تحسبًا للدوخة أو الإغماء في الحالات المتطرّفة.
 - قد تشعر بتغيّرات هرمونية أثناء العلاج بهذا الدواء.
- الأطفال والمراهقون:** لا يجوز استخدام أوكسيكوتنين 10، 20، 40 و80 لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنةً.

الفحوص والمتابعة:

- خلال العلاج الطويل الأمد، يتوجّب عليك الخضوع لتقييمات دورية لتقييم الحاجة إلى العلاج المتواصل بالدواء.
- قد يتابع الطبيب التغيّرات الهرمونية المحتملة.

التفاعلات الدوائية:

قد يؤدي استخدام أوكسيكوتنين بالتزامن مع أدوية أخرى تثبّط الجهاز العصبي المركزي إلى تباطؤ التنفّس أو صعوبات التنفّس (التثبيط التنفّسي)، الميل الخطير إلى النوم، فقدان الوعي/الغيبوبة والوفاة. لهذا السبب سيفكر الطبيب في استخدام أوكسيكوتنين بالتزامن مع هذه الأدوية فقط إذا لم تتوفر خيارات علاجية أخرى وبشرط أن تكون الجرعة منخفضة ومدة الاستخدام قصيرة. تشمل هذه الأدوية: الأدوية الأفيونية الأخرى المستخدمة لتسكين الألم (على سبيل المثال: المورفين أو الكودائين)؛ الغابابنتينويدات (لعلاج الصرع) مثل بريغابالين؛ أدوية مضادة للقلق؛ أدوية مركنة، أدوية مهدئة، أدوية منومة (مثل البيزنوديازيبينات)؛ أدوية لعلاج المشاكل النفسية/الطبيّة النفسية (مثل الفينوثيازينات)؛ مضادات الاكتئاب، أدوية التخدير؛ مرخيات العضلات؛ أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع؛ أدوية من مجموعة مثبّطات إنزيم الأوكسيداز الأحادي الأمين (MAOIs) المستخدمة على سبيل المثال لعلاج الاكتئاب، مثل ترانيلسيبرومين، فينيلزين، إيزوكاربوكسازيد. ممنوع استخدام أوكسيكوتنين إذا كنت تتناول أو قد تناولت الأدوية من فصيلة MAOIs خلال الأسبوعين الأخيرين.

إذا لاحظت أو إذا لاحظ الأشخاص من حولك (الأصدقاء، العائلة، مقدّمو الرعاية) أنّك تستصعب التنفّس أو أنّه يزيد عليك إلى النوم بشكل كبير أو أنّك تفقد الوعي، فيجب مراجعة الطبيب في الحال.

تناول أوكسيكوتنين مع الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب من فصيلة SSRIs أو SNRIs (مثبّطات استرداد

السيروتونين/النورإبينفرين الانتقائية) أو غيرها من الأدوية السيروتونية المفعول قد يسبّب التسمّم بالسيروتونين. تشمل الأعراض ما يلي: التغيّرات في الحالة النفسية مثل التملل، رؤية أو سماع أشياء لا توجد في الواقع (الهلوسة)، فقدان الوعي/الغيبوبة؛ الخفقان السريع، تغيّرات في ضغط الدم، زيادة درجة حرارة الجسم، الاختلاجات العضلية، اختلال التناسق الحركي، تزايد المنعكسات، الصلابة؛ أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والقيء والإسهال. إذا كنت تتناول أدوية من فصيلة SSRIs أو SNRIs مثل سيتالوبرام، دولوكسيتين، إيسيتالوبرام، فلوكسيتين، فلوكسامين، باروكسيتين، سيرترالين أو فينلافاكسين، فقد يقلّ طبيبك من الجرعة. يجب مراجعة الطبيب إذا شعرت بهذه الأعراض.

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية المصرفة بدون وصفة طبيب والإضافات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. قد يقوم الطبيب بتعديل الجرعات الدوائية. وخصوصًا يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

- بعض مضادات الاكتئاب من فصيلة مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات مثل أميتريبتيلين، كلوميبرامين، إيميبرامين، لوبيرامين، نورترينيلين.
- الأدوية المستخدمة لعلاج التحسّس (مضادات الهيستامين) مثل سيتيريزين، باكسوفينادين وكلورفينامين.
- الأدوية لعلاج مرض باركنسون.
- المضادات الحيوية من فصيلة الماكروليدات، على سبيل المثال كلاريثروميسين، إيريثروميسين، تيليثروميسين.
- مضادات الفطريات، على سبيل المثال: كيتوكونازول، فوريكونازول، إيتراكونازول، بوساكونازول.
- أدوية ضدّ فيروس الـ HIV من فصيلة مثبّطات البروتياز مثل بوسبيريفير، ريتونافير، إندينافير، نيلفينافير، ساكوينافير.
- سيميدين (دواء لعلاج قرحة المعدة).
- ريفاميسين (لعلاج السل).
- أدوية لعلاج التشنّجات/الاختلاجات مثل كاربامازيبين وفينيتوين.
- نبتة العرن المثقوب (المسمّاة أيضًا (St. John's Wort) المستخدمة لعلاج الاكتئاب.
- كينيدين (لعلاج اضطرابات نظم القلب).
- الأدوية المضادة للكولين أو ذات المفعول المضاد للكولين.

استخدام الدواء والغذاء:

- يمكن تناول هذا الدواء بغض النظر عن مواعيد وجبات الطعام.
- يجب الامتناع عن استهلاك الجريب فروت خلال العلاج بهذا الدواء.

استخدام الدواء واستهلاك الكحول:

يُمنع شرب الكحول خلال فترة العلاج بهذا الدواء. ذلك لأنَّ شرب الكحول أثناء فترة العلاج بهذا الدواء قد يزيد من ميلك إلى النوم أو قد يزيد من خطر التعرّض لأعراض جانبية خطيرة مثل التنفس السطحيّ المصحوب بخطر انقطاع التنفس وفقدان الوعي.

الحمل والإرضاع:

- **الحمل:** ممنوع استخدام الدواء خلال فترة الحمل أو إذا كان باعتمادك أنك حامل، إلا إذا قرّر الطبيب أنّ فائدة استخدام الدواء تزيد عن الخطر المحتمل. إذا تمّ تناول الدواء خلال الحمل فقد ينشأ لدى الجنين اعتماد على الدواء، ممّا يؤدي إلى أعراض الانسحاب بعد الولادة التي قد تستدعي العلاج. قد تشمل الأعراض الآتي: التملل، فرط النشاط (فرط الحركة)، أنماط النوم غير الاعتيادية، البكاء الصاخب، الارتعاش، التقيؤ، الإسهال، عدم زيادة الوزن.
- **الولادة:** لا يُوصى باستخدام الدواء أثناء الولادة. قد يسبّب الاستخدام أثناء الولادة التثبيط التنفسيّ لدى الأطفال حديثي الولادة.
- **الإرضاع:** ممنوع استخدام الدواء خلال فترة الإرضاع لأنّ المادة الفعّالة (أوكسيكودون) تنتقل إلى حليب الأمّ وقد تؤثر في الطفل الرضيع (من شأنها أن تسبّب التثبيط التنفسيّ لديه).

قيادة السيارة واستخدام الماكينات: من شأن استخدام هذا الدواء أن يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية التي قد تخلّ بقدرتك على السياقة أو تشغيل الماكينات (على سبيل المثال، النعاس والدار). انظر البند 4 لمعينة قائمة كاملة بالأعراض الجانبية. وتكون هذه الأعراض الجانبية أشدّ عادة عند ابتداء العلاج و/أو عند زيادة الجرعة الدوائية. وفي حال شعرت بهذه الأعراض و/أو بأيّ عرض آخر قد يؤثر في السياقة، فلا تقد السيارة أو تشغل الماكينات. لا تقد السيارة إلى أن تعرف كيف يؤثر الدواء فيك. إذا كانت لديك أيّ شكوك حول ما إذا كانت القيادة آمنة بالنسبة لك خلال فترة العلاج، فاستشر طبيبك أو الصيدليّ.

3. كيف تستخدم هذا الدواء؟

يتوجّب الاستخدام دائماً وفق إرشادات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء. الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحدّدهما الطبيب فقط. تحقّق من أنّ الطبيب الذي وصف لك الدواء يناقش معك مدّة العلاج بالدواء والخطة لإيقاف العلاج وكيفية التوقّف عن تناول الدواء بشكل تدريجيّ.

الجرعة المتبعة عادة هي:

عادة ما تكون الجرعة الأولية 10 ملغ كلّ 12 ساعة. يجب تناول الدواء بانتظام (كلّ 12 ساعة، مثلاً في 8 صباحاً و8 مساءً) مثلما حدّده الطبيب المعالج. يُمنع استخدام هذا الدواء في أحيان أكثر تقارباً. وسيلائم الطبيب الجرعة الدوائية لحالتك وشدّة الألم لديك. ولا يجوز تغيير الجرعة الدوائية دون استشارة الطبيب المعالج. وإذا لم تزل تشعر بالألم خلال العلاج بهذا الدواء - فتوجّه إلى الطبيب. من الضروريّ أيضاً إبلاغ الطبيب المعالج إذا كنت تعاني من نوبات الألم الفجائية.

متلقو العلاج الذين يعانون من المشاكل في الكبد أو في الكليتين: يجب إخبار الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكليتين. فقد يصف الطبيب جرعة دوائية أقلّ استناداً إلى حالتك.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذه الأقراص مخصّصة للتناول عبر الفم فقط. يجب ابتلاع الدواء مع الماء. يمنع إبقاء القرص داخل الفم لمدّة أطول من تلك المطلوبة لبلعه. إنّ أقراص أوكسيكودون ذات آلية التحرّر البطيء. عند ابتلاع القرص بالكامل، من المفترض أن يدوم مفعول المادة الفعّالة لمدّة 12 ساعة. يجب بلع القرص كاملاً كيلا تختلّ آلية التحرّر البطيء للمادة أوكسيكودون من القرص. لا يجوز كسر، مضغ، هرس، إذابة أو شطر القرص! يمكن أن يؤدي تناول الأقراص غير الكاملة إلى امتصاص أسرع لأوكسيكودون ونشوء الأعراض الجانبية الخطيرة وتناول الجرعة الزائدة، ممّا قد يسبّب الوفاة (انظر البند "إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر").

ممنوع سحق الأقراص وحقتها لأنّ ذلك قد يسبّب أعراض جانبية خطيرة وحتىّ الوفاة. انظر أيضاً "التحذيرات الأخرى" في البند 2.

من أجل تقليل خطر الاختناق من القرص:

- لا تبتلّ أو تلحس القرص قبل وضعه في فمك.
- يجب ابتلاع كل قرص على حدة (حتىّ في الحالات التي يطلب فيها الطبيب تناول أكثر من قرص واحد لكلّ جرعة) مع كميّة كافية من الماء لضمان الابتلاع الكامل والفوريّ للقرص.

يتم تحرير المادة الفعالة تدريجياً من القرص أثناء بقائه في الجسم ومن المفترض أن يخرج الغلاف الفارغ للقرص في البراز. هذه الظاهرة لا تدعو للقلق، لأنه قد تم امتصاص المادة الفعالة بالفعل في الجسم.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل أو أي شخص آخر الدواء خطأً، فيجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء. من شأن الجرعة الدوائية المفرطة أن تجعلك تشعر بالميل الشديد إلى النوم كما أنها قد تسبب بعض الأعراض مثل: الغثيان/التقيؤ، الدوار، الهلوسة، نقص ضغط الدم، انقباض حدقة العين، انخفاض التوتر العضلي (نقص التوتر العضلي)، تباطؤ نظم القلب (نظم القلب البطيء). وقد تنشأ أيضاً الوذمة الرئوية، صعوبات التنفس (التي قد تؤدي إلى التنبيب التنفسي)، الانهيار القلبي الوعائي، مما قد يؤدي إلى فقدان الوعي/الغيبوبة وحتى الموت. وتستدعي هذه الأعراض المساعدة الطيئة الطارئة في المستشفى. من المستحسن أن تطلب الأشخاص من حولك بأن يعرفوا هذه الأعراض أيضاً كي يستطيعوا ملاحظتها إذا نشأت لديك.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا تذكرت تناول الدواء خلال 4 ساعات بعد الساعة المحددة لتناول الدواء، فتناوله على الفور. خذ الجرعة التالية في الساعة المعتادة. إذا مرت أكثر من 4 ساعات على الساعة المحددة لتناول الدواء، فاستشر الطبيب. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة عوضاً عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج بالتماشي مع توصيات الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، فيمنع التوقف عن تعاطي الدواء دون استشارة الطبيب وحتى إذا سُمح لك بالتوقف فيجب القيام بذلك بشكل تدريجي فقط.

إذا توقفت عن تناول الدواء: ممنوع التوقف عن تناول الدواء بشكل فجائي. إذا أردت التوقف عن تناول الدواء، فاستشر الطبيب أولاً ليعطيك الإرشادات حول ذلك. يوصي الطبيب عادةً بخفض الجرعة تدريجياً لتقليل خطر ظهور أعراض الانسحاب، على سبيل المثال: التملل، عدم الراحة، صعوبة النوم، العصبية، القلق، الشعور بدقات القلب (الخفقان)، زيادة ضغط الدم، الغثيان، القيء، الإسهال، الارتعاش، القشعريرة، التعرق، الدمان، سيلان الأنف، التثاؤب، آلام العضلات، توسع حدقة العين، فرط الحركة، الضعف، تقلصات في البطن، نقص الشهية، القهم العصبي، زيادة نظم القلب و/أو سرعة التنفس.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! راجع محتوى الملصق وتحقق من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطيئة إذا كنت بحاجة إليها. وإذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استخدام الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استخدام أوكسيكودونين إلى نشوء الأعراض الجانبية عند بعض المستخدمين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. ذلك لأنك قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوجه إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى فوراً إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

- **رد الفعل التحسسي أو التأقي:** من شأن أي دواء أن يسبب رد الفعل التحسسي إلا أن حدوث رد الفعل التحسسي الخطير أمر نادر. وقد تشمل أعراض رد الفعل التحسسي الخطير الأزيز المفاجئ خلال التنفس، صعوبات التنفس، انتفاخ الوجه، الجفون أو الشفتين، الطفح الجلدي و/أو الحكّة (خصوصاً في مناطق واسعة من الجسم).
- **التثبيط التنفسي:** إن العرض الجانبي الأخطر عبارة عن التنفس الأبطأ أو الأضعف من المعتاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى الميل الخطير إلى النوم وفقدان الوعي. قد يؤثر هذا العرض الجانبي في 1 من أصل 100 شخص كحد أقصى ويزداد احتمال نشوئه عند تناول أدوية معينة أخرى بشكل مترام (انظر أيضاً "التفاعلات الدوائية" في البند 2). نوصيك بأن تطلب الأشخاص من حولك (الأصدقاء، العائلة، مقدمي الرعاية) بالانتباه إلى نشوء هذه العلامات والأعراض لديك.
- **أعراض الانسحاب:** عند التوقف عن تناول الدواء، قد تشعر بأعراض الانسحاب. انظر "إذا توقفت عن تناول الدواء"، في البند 3.
- **صعوبات في ابتلاع القرص،** بما في ذلك الحالات التي يعلق فيها القرص في الحلق و/أو يسبب الاختناق.

الإدمان: كيف تتعرف على حالة الإدمان؟

قد تشمل أعراض الإدمان الآتي: الشعور بأنك تحتاج إلى تناول الدواء لمدة أطول من المدة التي أوصاك الطبيب بها و/أو تناول جرعة أعلى من الجرعة التي أوصاك الطبيب بها؛ استخدام الدواء لأسباب مختلفة عن تلك التي وصف الدواء لك لأجلها؛ الشعور السيء عند التوقف عن تناول الدواء وتحسن شعورك عند تناول الدواء مجدداً. إذا شعرت بهذه الأعراض فراجع الطبيب.

الأعراض الجانبية الأخرى:

الأعراض الجانبية الشائعة جداً (الأعراض التي تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من أصل 10):

بالإضافة إلى ذلك،

يحتوي كل قرص من أوكسيكوتين 10 على: Hydroxypropyl cellulose
يحتوي كل قرص من أوكسيكوتين 20 على: Polysorbate 80, red iron oxide (E172)
يحتوي كل قرص من أوكسيكوتين 40 على: Polysorbate 80, yellow iron oxide (E172)
يحتوي كل قرص من أوكسيكوتين 80 على:

Hydroxypropyl cellulose, indigo carmine (E132), yellow iron oxide (E172)
• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

أوكسيكوتين 10: أقراص مستديرة بيضاء اللون في شرائح تحتوي كل واحدة منها على 20 قرصًا.
أوكسيكوتين 20: أقراص مستديرة وردية اللون في شرائح تحتوي كل واحدة منها على 20 قرصًا.
أوكسيكوتين 40: أقراص مستديرة صفراء اللون في شرائح تحتوي كل واحدة منها على 20 قرصًا.
أوكسيكوتين 80: أقراص مستديرة خضراء اللون في شرائح تحتوي كل واحدة منها على 20 قرصًا.

المصنع وصاحب التسجيل: مختبرات رفا م.ض.، ص.ب. 405، أورشليم القدس 9100301

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

أوكسيكوتين 10: 1007128431

أوكسيكوتين 20: 1007028432

أوكسيكوتين 40: 1090129255

أوكسيكوتين 80: 1089829256

من باب تيسير القراءة وتسهيلها، تم صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، لكن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
تم تحرير النشرة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تبعًا لإرشادات وزارة الصحة.

للحصول على المزيد من المعلومات حول المستحضر والنسخ الأحدث للنشرات بالعربية والعربية والإنجليزية، امسحوا الرمز التالي: For further information about the medicinal product and for updated consumer leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:			
Oxycontin 10 	Oxycontin 20 	Oxycontin 40 	Oxycontin 80 
يمكن الاتصال بصاحب تسجيل المستحضر لأجل طلب الحصول على نشرة المستهلك المطبوعة باللغة الإنجليزية على عنوان البريد الإلكتروني RA@rafa.co.il أو على رقم الهاتف 02-5893939. To receive a printed patient package insert in English you may address a request to the registration owner by email at RA@rafa.co.il or by calling 02-5893939.			