

עלוצרן **לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986** **התרופה משווקת ללא מרשם רופא**

דיפירז טיפות לפה

טיפות למתן דרך הפה

הרכב

כל מ"ל (20 טיפות) מכיל:

דיפרון 500 מ"ג (Dipyrone 500 mg) סעיף 2 - מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 - מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה וסעיף 6 - מידע נוסף.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע מצטייר על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עלך ליטול את התרופה על פי ההוראות בסעיף המיומן בעלון זה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.

עלך ליטול את התרופה בצורה נכונה. הטיפות אינן מיועדות לתינוקות במשקל נמוך מ- 7 ק"ג. עלך לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או הכאבים נמשכים יותר מ- 7 ימים, למרות השימוש בתרופה. הסיכון לארגנולוציטוזיס עולה אם הטיפול נמשך מעבר ל- 7 ימים (ראה סעיף 4 - תופעות לוואי").

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים בניונים עד חזקים כגון כאבי ראש, שיניים וכאבי וסת ולהורדת חום גבוה שאינו מגיב לאמצעי טיפול אחרים.

קבוצה תרופתית: משפחת הפירזולון.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל דיפרון (מטאמזול) או לתכשירי פירזולון אחרים (כגון פרופיפנאזון, פנאזון) או לתכשירי פירזולין (כגון פנילבוטאזון, אוקסיפנטאזון), כולל גם מטופלים אשר הגיבו, לדוגמה, בריגוזות משמעותית בספירת תאי דם לבנים מסוג מסוים (ארגנולוציטוזיס) לאחר שימוש בחומרים פעילים אלה.
- אתה רגיש (אלרגי) לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - מידע נוסף).
- יש לך רגישות ידועה למשככי כאבים (תסמונת אסתמה כתוצאה מנטילת משככי כאבים או רגישות למשככי כאבים המתבטאת בפריחה/באנגיואדמה). הכוונה לתסוללים המגביים למשככי כאבים (כגון לידלז'טים, פראצטמול, דיקלופנן, איבופרופן, אינזומטנין או פרופנסן) בהתבוננות של דרכי השימה התחתונות או בתגובות רגישות יתר אחרות כגון פריחה עם גרד וחבורות, נזלת ונפיחות (פריחה), דלקת באין, אנגיואדמה).
- אתה סובל מליקוי בתפקוד מח העצם, למשל לאחר טיפול בתרופות מסוימות המשמשות לטיפול בסרטן.
- אתה סובל מהפרעות ביצור תאי דם.
- אתה סובל ממחלה תורשתית הכוללת הפרעה בייצור הצבע של תאי הדם האדומים (פורפריה נכבדת חריפה לסירוגין).

אזהרות מיוחדות המוגעות לשימוש בתרופה

בדיפירז טיפות לפה מכיל דיפריון וקשור לסיכונים נדירים אך מסכני חיים הבאים:

- כשל פתאומי בזרימת הדם. (מחלה חמורה הנגרמת עקב ירידה חדה בספירת תאי דם לבנים מסוג מסוים).

יש להפסיק ליטול דיפירז טיפות לפה ולהתייעץ עם הרופא מיד אם מופיעים הסימנים הבאים המצביעים על אפשרות לארגנולוציטוזיס:

- החמרה פתאומית במצבך הבריאותי (למשל חום, צמרמורות, כאב גרון, קושי בבליעה).

- חום שאינו חולף או חום המופיע שוב ושוב.

- שינויים בקדומים הריניים המלווים בכאב, במיוחד בפה, באף ובגרון או באברי המין או באזורי פי הטבעת. ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי".

אם אתה מפתח סימנים של ירידה בספירת תאי הדם השונים (פנציטופניה) (כגון הרגשת חולי כללית, דלקת או חום מתמשך, חבורות, דימום וחיוורון), או סימנים של ירידה בספירת הטסיות (תרומבוציטופניה) (כגון עלייה בנטייה לדם, שטפי דם זעירים בעור ובקדומים ריריים), יש להפסיק ליטול דיפירז טיפות לפה מייד ולהיוועץ ברופא ללא דיחוי (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

ייתכן כי הרופא יעקוב אחר ספירת הדם שלך באופן קבוע ויפסיק טיפול אם מתרחשים שינויים מסוימים.

אם אתה מפתח תגובה אלרגית לדיפירז טיפות לפה, אתה נמצא בסיכון גבוה לפתח תגובות חמורות למשככי כאבים אחרים.

אם אתה מפתח תגובות אלרגיות לדיפירז טיפות לפה או תגובות אחרות המתווכות על ידי המערכת החיסוית (כגון ארגנולוציטוזיס), אתה נמצא בסיכון גבוה לפתח תגובות יזומות לתכשירי פירזולון ופירזולין אחרים (חומרים דומים מבחינה כימית), כגון משככי הכאבים המכילים פנאזון, פרופיפנאזון, פנילבוטאזון ואוקסיפנטאזון. אם אתה מפתח תגובה אלרגית לתכשירי פירזולון ופירזולין אחרים או למשככי כאבים אחרים או תגובה אחרת המבוססת על ידי המערכת החיסוית אתה בסיכון גבוה לפתח תגובה דומה לדיפירז טיפות לפה.

תגובות רגישות יתר חמורות

אם אתה סובל מאחת מהתופעות המפורטות להלן, הסיכון להופעת תגובות רגישות יתר חמורות לדיפירז טיפות לפה עולה באופן משמעותי:

רגישות לתרופות לשיכוך כאבים ולתרופות אנטי-ראומטיות, המתבטאת בתסמינים כמו פריחה עם גירוד וחבורות או נפיחות, במקרה זה, אין ליטול דיפירז טיפות לפה.

למידע נוסף, קרא ראה סעיף 2 - "אין להשתמש בתרופה אם".

התקפים של קוצר נשימה הנגרמים למשל מאסתמה, במיוחד אם אתה סובל גם מפוליפיים באף או מדלקת האף והסינוסים.

פריחה כרונית (אורטיקריה).

רגישות יתר לחומרי צבע (כגון בטרנדזין) או לחומרים (כגון בנזואטים).
רגישות לאלכוהול המתבטאת בהתעטשות, עייני דמויות והסמיה חמורה בפנים, המתרחשות גם בעת צריכת כמותי אלכוהול קטנות. רגישות לאלכוהול מסוג זה עשויה להוות סימן לרגישות למשככי כאבים שלא אובחנה עד כה (ראה סעיף 2 - "אין להשתמש בתרופה אם").

במטופלים המצויים בסיכון מוגבר לתגובות רגישות יתר, השימוש בדיפירז טיפות לפה עשוי אך ורק לאחר הערכת רופא קפדנית של הסיכונים האפשריים כנגד התועלת הצפויה (ראה גם סעיף 2 - "אין להשתמש בתרופה אם").
אם נעשה שימוש בדיפירז טיפות לפה במקרים אלו, על המטופל להיות במעקב רפואי צמוד, לצד טיפול חירום המיון לשימוש מידי.
הלם אנפילקטי עלול להתרחש, במיוחד במטופלים רגישים (ראה סעיף 4 - תופעות לוואי"). נדרשת זהירות מיוחדת בחולי אסתמה או במטופלים בעלי נטייה לפתח תגובות אלרגיות.

תגובות עוריות חמורות

תגובות עוריות חמורות, הכוללות את תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס (TEN) ותסמונת התגובה התרופתית המלווה באאזינופיליה ותסמינים מערכתיים (הנקראת DRESS) דוחות לאחר טיפול עם דיפריון. אם אתה חש באחד או יותר מהתסמינים של תגובות עוריות חמורות הללו המתיארים בסעיף 4 ("תופעות לוואי"), יש להפסיק ליטול דיפירז טיפות לפה ולפנות למייד לטיפול רפואי.

אם אי פעם חווית תגובות עוריות חמורות, לעולם אין ליטול שוב טיפול עם דיפירז טיפות לפה (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").

ירידת לחץ דם

דיפירז טיפות לפה עלול לגרום לירידה בלחץ הדם (ראה סעיף 4 - תופעות לוואי").

סיכון זה עולה אם אתה:
- סובל מלחץ דם נמוך, ממחסור נזולים משמעותי (התייבשות), מזרימת דם לקויה או מטמינים ראשוניים של כשל בזרימת דם (למשל בעקבות התקף לב או פציעות חמורות).

סובל מחום גבוה.

הרופא ישקול בקפידה את הטיפול בדיפירז טיפות לפה, ינהל מעקב צמוד אחר המטופל ויקנט באמצעים מניעתיים (כגון ייצוב זרימת הדם) על מנת להפחית את הסיכון לירידת לחץ דם.

יש להשתמש בדיפירז טיפות לפה רק תחת מעקב קפדני אחר זרימת הדם כשיש צורך להימנע מירידה בלחץ הדם, למשל במקרה של:

- מחלת לב כלילית חמורה.
- היצרות החוסמת את זרימת הדם בכלי הדם המספקים דם למוח.

בעיות בתפקוד הכבד

דוחו מקרים של דלקת כבד במטופלים שנטלו דיפריון אשר פיתחו תסמינים תוך מספר ימים עד מספר חודשים לאחר תחילת הטיפול.

עלך להפסיק ליטול דיפירז טיפות לפה ולהיוועץ ברופא אם אתה מפתח תסמינים של

בעיות בתפקוד הכבד, כגון:

בחילה או הקאה, חום, עייפות, איבוד תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של העור או החלק הלבן בעיניים, גירוד, פריחה או כאב בבטן העליונה. במקרים אלו הרופא יבדוק את תפקוד הכבד.

אין ליטול דיפירז טיפות לפה אם נטלת בעבר תרופה המכילה דיפריון ופיתחת בעיות בתפקוד הכבד.

ליקוי בתפקוד הכליות או הכבד

במקרה של ליקוי בתפקוד הכליות או הכבד יש ליטול דיפירז טיפות לפה רק לאחר שהרופא ביצע הערכה קפדנית של הסיכון מול התועלת ונטק באמצעי זהירות מתאימים (ראה סעיף 4 - "חולים בעלי ליקוי בתפקוד הכליות או הכבד").

שימוש ביורים

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות במשקל נמוך מ- 5 ק"ג. ראה טבלת מינונים לפי משקל וגיל בסעיף 3.

תגובות לובן תרופתיות

אם אתה לובן, או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- ציקלופורין (תרופה לדיכוי מערכת החיסון) - הרופא יעקוב אחר רמות ציקלופורין בדמך אם ניתן בו-זמנית.
- מתורקסטאט, תרופה לטיפול במחלות סרטן ובמחלות ראומטיות - שימוש בו-זמני עלול להגביר את הסיכון לפגיעה אפשרית ביצור דם יד די-נוטרקסטאט, במיוחד במטופלים קשישיים. לפיכך, יש להימנע מטיפול זה.
- חומצה אצטילסליצילית (אספירין) - אם אתה סובל חז חומצה אצטילסליצילית במינון נמוך על מנת להגן על הלב, דיפירז טיפות לפה עלול להפחית את השפעתה על הטיפול שהם.
- בורפרויון, לטיפול בדיכאון ולהפסקת עישון - דיפירז טיפות לפה עלול לגרום לירידה ברמות של בורפרויון בדם.
- כלורפומזין, תרופה לטיפול בהפרעות נפשיות - שימוש בדיפירז טיפות לפה בו-זמנית עלול לגרום לירידה חמורה בחום גופך.

- אפאבירנז, תרופה לטיפול ב-HIV/איידס.
- מתדון, תרופה לטיפול בכאב חמור או לגמילה מהתמכרות לחומרים נרקוטיים.
- ואלפראט, תרופה לטיפול באיפלפסיה או הפרעה דז קוטבית.
- טקוליומוס, תרופה המשמשת למניעת דחיית איברים במטופלים מושתלים.
- סרטרג'ין, תרופה לטיפול בדיכאון.

שימוש בתכשירי פירזולון (קבוצת התרופות אליה משתייך דיפירז טיפות לפה) עלול לגרום לתגובות בין-תרופתיות עם תרופות מסוימות:

- תרופות למניעת קרישת דם.

- קפטופריל, תרופה לטיפול ביתר לחץ דם ובמחלות לב מסוימות.

- ליויום, תרופה לטיפול בהפרעות נפשיות.

- תרופות משתנות, כגון טריאמטרן.

- תרופות להורדת לחץ דם.

לא ידוע באיזו מידה דיפירז טיפות לפה גורם לתגובות בין-תרופתיות אלו.

השפעה על בדיקות מעבדה

דוחו לרופא שאתה נוטל דיפירז טיפות לפה לפני ביצוע בדיקות מעבדה, מפני שהחומר הפעיל, דיפריון, עלול להשפיע על תוצאות של בדיקות מסוימות (כגון: בדיקת רמות קראטינין בדם, שומנים, כולסטרול מסוג HDL או חומצה אורית). יש ליטול את התרופה רק לאחר מתן דגימת הדם עבור בדיקות אלו.

שימוש בדיפירז טיפות לפה ואלכוהול

רצוי להימנע משתיית אלכוהול מכל סוג בעת השימוש בדיפירז טיפות לפה.

שימוש בדיפירז טיפות לפה ומזון

מומלץ ליטול את הטיפות עם מים. ניתן ליטול דיפירז טיפות לפה לפני או אחרי ארוחה.

היריון והנקה

אם את בהריון או מיניקה, חושבת שאת בהריון, או מתכננת הריון, יש להיוועץ עם הרופא או הרוקח לפני נטילת תרופה זו.

הביטוי

השימוש במהלך ההריון יעשה רק לאחר התייעצות עם הרופא ולאחר שהוא ביצע הערכת תועלת-סיכון יסודית.
בשליש הלישי להריון (לאחר שבוע 28) ניתן להשתמש בדיפירז טיפות לפה רק מינון היעיל הנמוך ביותר.
לאחר שבוע 28 אין ליטול יותר משלושה גרם (120 טיפות) ביום, לא יותר מ- 3-4 ימים ברצף.

ההקנה

חומרי הפירוק של דיפריון מופרשים לחלב אם.

בתקופת ההנקה ניתן להשתמש בדיפירז טיפות לפה רק במקרים בהם אין תגובה לפראצטמול או לאיבופרופן.

נהיה ושימוש במקבנות

בטווח המינונים המומלץ לא ידוע על פגיעה ביכולת הריכוז והתגובה. עם זאת, כאמצות זהירות, לפחות במינונים גבוהים יותר, עלך לשקול את האפשרות לפגיעה ביכולת הריכוז והתגובה ולהימנע משימוש במקבנות, מנהיגה בכלי רכב ומביצוע פעילויות מסוכנות אחרות, במיוחד אם שתיית אלכוהול.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה 38 מ"ג נתרן (המרכיב העיקרי במלח בישול/שולחן) ב-1 מ"ל (20 טיפות). כמות זו שווה ל- 1.9% מהצריכה היומית ההקסימלית המומלצת של נתרן עבור מבוגר.

אָתְנוּ: התרופה מכילה 6 מ"ג אלכוהול (אתנול) ב-1 מ"ל (20 טיפות). כמות זו שווה לפחות 1- מ"ל של בירה או 1 מ"ל של יין.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ייקבע בהתאם לעוצמת הכאב או החום ובהתאם לתגובה של כל אדם לדיפירז טיפות לפה. המינון יכול להיקבע על פי גיל או משקל המטופל. יש ליטול את המינון היעיל הנמוך ביותר.

המינון המקובל בהעדד הוראה אחרת מהרופא:

- יש ליטול את המינון המתאים כפי שמופיע בטבלה מטה. יש ליטול התרופה במרווחי זמן של 6-8 שעות.

מומלץ לתת את המינון לפי משקל הילד בהתאם לטבלה, רק במקרה שלא ידוע משקל הילד - יקבע המינון על פי גיל הילד.

אין ליטול מנה יותר מ- 3 בעקבים ב- 24 שעות.

- **הטיפות אינן מיועדות לתינוקות במשקל נמוך מ- 5 ק"ג.**

מבוגרים ומתבגרים מגיל 15 שנים ומעלה (מעל משקל גוף של 53 ק"ג):

20-40 טיפות, עד 3 פעמים ביום.

תינוקות וילדים:

גיל	משקל גוף (ק"ג)	מינון (מספר טיפות)
3-11 חודשים	5-8	2-4 טיפות, עד 3 פעמים ביום
1-3 שנים	9-15	3-10 טיפות, עד 3 פעמים ביום
4-6 שנים	16-23	5-15 טיפות, עד 3 פעמים ביום
7-9 שנים	24-30	8-20 טיפות, עד 3 פעמים ביום
10-12 שנים	31-45	10-30 טיפות, עד 3 פעמים ביום
13-14 שנים	46-53	15-35 טיפות, עד 3 פעמים ביום

אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או הכאבים נמשכים יותר מ- 7 ימים, למרות השימוש בתרופה, יש לפנות לרופא.

הסיכון לארגנולוציטוזיס עולה אם הטיפול נמשך מעבר ל- 7 ימים (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").

מטופלים קשישיים. מטופלים במצב בריאותי כללי ירוד או בעלי ליקוי בתפקוד הכליתי
יש להפחית את המינון מאחר שהפרשת תוצרי הפירוק של דיפירז טיפות לפה עלולה להיות מעוכבת.

מטופלים בעלי ליקוי בתפקוד הכליות או הכבד

מאחר שקצב הפינוי המהגוף יורד כאשר קיים ליקוי בתפקוד הכליתי או הכבד, יש להימנע ממתן חוזר של מינונים גבוהים. הפחתת מינון אינה הכרחית אם השימוש הוא לתקופה קצרה בלבד. אין לסיון בשימוש ארוך טווח.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש

הטיפות מיועדות למתן דרך הפה. מומלץ ליטול את הטיפות עם מים. ניתן ליטול לפני או אחרי ארוחה.

יש לוודא שפקק הבקבוק סגור היטב לאחר השימוש.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

סימנים של מינון יתר כוללים:

בחילות, הקאות, כאב בטן, ירידה בתפקודי כליה ועד כשל כליתי, סחרחורת, מנום, איבוד הכרה, פרכוסים, ירידה חדה בלחץ הדם ועד כשל בזרימת הדם, קצב לב מהיר. במקרה של חשד למינון יתר יש ליידע את הרופא מייד על מנת לקנות באמצעים מתאימים.

הערה: כנטילת מינונים מאוד גבוהים של התרופה, הפרשת תוצר פירוק בלתי מזיק של דיפריון עלולה לגרום לשינוי בצבע השתן לאדום.

אם שכחת ליטול את התרופה, אין ליטול מנה כפולה על-מנת לפצות על המנה שנשכחה.

אין ליטול תרופות בחושוך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.

הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדיפירז טיפות לפה עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי הבאות עלולות להוביל להשלכות חמורות; יש להפסיק מייד את השימוש בדיפירז טיפות לפה ולפנות לרופא בהקדם האפשרי:

- אם אחת מתופעות הלוואי המפורטות להלן מופיעה באופן פתאומי או מחמירה במידה משמעותית, יש ליידע את הרופא באופן מידי. תופעות לוואי מסוימות (כגון תגובות רגישות יתר חמורות: תגובות עוריות חמורות כגון תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס או תסמונת DRESS; ארגנולוציטוזיס או פנציטופניה) עלולות להיות עיייתים מסכנות חיים. במקרים אלה, בשום אופן אין להמשיך ליטול דיפירז טיפות לפה ללא השגחה רפואית. הפסקת טיפול מוקדמת עשויה להיות בעלת חשיבות קריטית להחלמה.
- אם מופיעים סימנים של ארגנולוציטוזיס, פנציטופניה או תרומבוציטופניה (ראה להלן וסעיף 2), יש להפסיק את השימוש בדיפירז טיפות לפה באופן מידי. הרופא לבצע ספירת דם (כולל ספירת דם מובדלת). יש להפסיק את הטיפול עוד בטרם התקבלו התוצאות של בדיקות המעבדה.
- אם מופיעים התסמינים הבאים שעשויים להיות סימנים לפגיעה בכבד (ראה גם סעיף 2): בחילה או הקאה, חום, עייפות, איבוד תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של העור או החלק הלבן בעיניים, גירוד, פריחה או כאב בבטן העליונה. יש להפסיק ליטול דיפירז טיפות לפה ולפנות מייד לטיפול רפואי אם אתה חש באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות (ראה גם סעיף 2):
- כתמים אדמדמים שטוחים דמויי "מטרה" או עגולים על פלג הגוף העליון, לרוב עם שלפוחית מרכזית, עור מתקלף, כיבים כהים כהה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניים.
- פריחות חמורות אלו עשויות להופיע לאחר חום ותסמינים דמויי שפעת (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס).
- פריחה נרחבת, חום גבוה ובלוטות לימפה מוגדלות (תסמונת DRESS או תסמונת של רגישות יתר לתרופה).

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שאינן שיכות (עלולות להופיע ב-עד 1 מתוך 100 מטופלים):

- פריחה בצבע סגול עד אדום כהה, לעתים מלווה בשלפוחיות (תגובה עורית לתרופה במקום קבוע (fixed drug eruption)).
- ירידה חדה בלחץ הדם אשר ייתכן שנגרמת בגלל השפעה ישירה של התרופה, ואינה מלווה בסימנים אחרים של תגובת רגישות יתר. תגובה מסוג זה גרמה לירידה חמורה בלחץ הדם במקרים נדירים בלבד. הסיכון לירידה בלחץ הדם עלול לעלות במקרה של חום גבוה באופן חריג.
- תסמינים אופייניים לירידה חדה בלחץ הדם הם קצב לב מהיר, חיוורון, רעד, סחרחורת, בחילות ועיילון.

תופעות לוואי נדירות (עלולות להופיע ב-עד 1 מתוך 1,000 מטופלים):

- **תגובות רגישות יתר** (תגובות אנפילקטואידיות או אנפילקטיות).

הסימנים לתגובות קלות יותר כוללים:

תחושת צריבה בעיניים, שיעול, נזלת, התעטשות, לחץ בחזה, אודם בעור (במיוחד באזור הפנים והראש), פריחה ונפיחות בפנים; ובמקרים פחות שכיחים: בחילות ועוויתות בבטן.

תסמיני אזהרה מיוחדים כוללים צריבה, גרד ותחושת חום על פני הלשון ומתחת לשון, ובמיוחד בכפות הידיים ובכפות הרגליים.

תגובות קלות יותר מסוג זה עלולות