

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

## تادالاومد 2.5 ملغ

أقراص مطالية

التركيب:

يحتوي كل قرص على: تادالافيل 2.5 ملغ  
للإستعمال "اليومي" (tadalafil 2.5 mg)

## تادالاومد 5 ملغ

أقراص مطالية

التركيب:

يحتوي كل قرص على: تادالافيل 5 ملغ  
للإستعمال "اليومي" (tadalafil 5 mg)

## تادالاومد 10 ملغ

أقراص مطالية

التركيب:

يحتوي كل قرص على: تادالافيل 10 ملغ  
للإستعمال "حسب الحاجة" (tadalafil 10 mg)

## تادالاومد 20 ملغ

أقراص مطالية

التركيب:

يحتوي كل قرص على: تادالافيل 20 ملغ  
للإستعمال "حسب الحاجة" (tadalafil 20 mg)

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 بند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتعمق حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه لآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

تادالاومد من عيار 2.5، 10 و-20 ملغ مخصص لعلاج إضطراب إنتصاب العضو الذكري لدى الرجال.

تادالاومد بعيار 5 ملغ مخصص: لعلاج إضطراب إنتصاب العضو الذكري لدى الرجال.

لعلاج أعراض تضخم البروستات الحميد.

لعلاج الرجال الذين يعانون من إضطراب في إنتصاب العضو الذكري ومن أعراض تضخم البروستات الحميد.

الفصيلة العلاجية: من أدوية أمراض المسالك البولية، أدوية تُستخدم لعلاج مشاكل الإنتصاب.

ما هو تادالاومد يحتوي تادالاومد على المادة الفعالة تادالافيل، التي تنتمي إلى مجموعة أدوية تسمى مثبطات فوسفو دي إستراز من نوع 5 (PDE5 inhibitors).

إضطراب الإنتصاب هو حالة لا يستطيع فيها الرجل تحقيق أو الحفاظ على إنتصاب العضو الذكري بالشكل المطلوب للنشاط الجنسي. لقد أثبت أن تادالاومد يحسن بشكل ملحوظ القدرة على تحقيق عضو ذكري منتصب وصلب يلزم لنشاط جنسي.

بعد الإثارة الجنسية، يعمل تادالاومد على إرخاء الأوعية الدموية في العضو الذكري خاصتك، وبهذا يتيح تدفق الدم إليه. النتيجة الحاصلة هي تحسن في أداء الإنتصاب. لن يساعدك تادالاومد في حال لم يكن لديك إضطراب في الإنتصاب. تجدر الإشارة إلى أن تادالاومد لا يعمل في ظل غياب إثارة جنسية. عليك أنت وشريكك السعي لتحقيق إثارة جنسية، بالضبط كما كنتما ستفعلان لو أنك لم تتناول دواء لإضطراب الإنتصاب.

تضخم البروستات الحميد هو حالة يزداد فيها حجم غدة البروستات مع التقدم في العمر. الأعراض تشمل: صعوبة في بدء تدفق البول، الشعور بعدم إفراغ المثانة كلياً وال الحاجة إلى التبول أكثر في الليل أيضاً. يحسن تادالاومد تدفق الدم إلى البروستات والمثانة البولية ويرخي العضلات، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من أعراض تضخم البروستات الحميد. أثبت بأن تادالاومد يحسن أعراض البول هذه خلال 1-2 أسبوع تقريباً بعد بدء العلاج.

### 2. قبل إستعمال الدواء إذا:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للتادالافيل أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).

- كنت تتناول نترات عضوي من أي نوع كان أو من النوع الذي يطلق أكسيد النيترويك مثل نترات الأميل. هذه هي مجموعة مستحضرات ("نترات") تُستخدم لعلاج الذبحة الصدرية ("angina pectoris"). أثبت أن تادالاومد يزيد تأثير هذه المستحضرات. إذا كنت تتناول نوعاً معيناً من النترات أو إذا لم تكن واثقاً، أخبر طبيبك بذلك.

- كنت تعاني من مرض خطير في القلب أو تعرضت لنوبة قلبية خلال الأيام الـ 90 الأخيرة.

- إجتزت مؤخراً حادثاً دماغياً الذي حصل في الأشهر الستة الأخيرة.

- كنت تعاني من ضغط دم منخفض أو من ضغط دم مرتفع خارج عن السيطرة.

- عانيت ذات مرة من فقدان للرؤية نتيجة non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION)، حالة طبية تدعى "سكتة العين".

- كنت تتناول ريوسيجوات (riociguat). هذا عبارة عن دواء يستعمل لعلاج إرتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (أي ضغط دم مرتفع في الرئتين) وإرتفاع ضغط الدم الرئوي الإنفصامي الخثاري المزمن (أي ضغط دم مرتفع في الرئتين بسبب خثرات دموية). لقد أثبت أن مثبطات فوسفو دي إستراز من نوع 5 (PDE5 inhibitors)، مثل تادالاومد، تزيد من التأثير الخافض لضغط الدم لهذا الدواء. إذا كنت تتناول ريوسيجوات أو إذا لم تكن واثقاً، أخبر طبيبك بذلك.

إذا شعرت بانخفاض/فقدان الرؤية المفاجئ، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن إستعمال تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.

إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم المرتفع، توقف عن تناول تادالاومد وتوجه فوراً إلى طبيبك.</

لأنه قرر أن المقدار الدوائي الموصى به من عيار 10 ملغ ضعيف جداً بالنسبة لك. يجب تناول قرص واحد من تادالايمد، 30 دقيقة على الأقل، قبل ممارسة العلاقة الجنسية.

قد يستمر تأثير تادالايمد حتى 36 ساعة بعد تناول القرص. لا يجوز تناول تادالايمد أكثر من مرة واحدة في اليوم. يمكن تناول القرص في أي ساعة من اليوم. بما أن تأثير تادالايمد يستمر أكثر من 24 ساعة، يجب الإمتناع عن الإستعمال اليومي لهذا المستحضر. تادالايمد 2.5 - 5 ملغ - المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من عيار 5 ملغ، يتم تناوله مرة في اليوم في نفس الساعة تقريباً من اليوم. قد يلائم طبيبك المقدار الدوائي إلى 2.5 ملغ استناداً إلى إستجابتك لـ تادالايمد. لا يجوز تناول تادالايمد أكثر من مرة واحدة في اليوم.

يتبع لك تناول تادالايمد "يومي" إنتصاب العضو الذكري أثناء الإثارة الجنسية، وذلك في أي وقت تختاره خلال 24 ساعة في اليوم. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

تجدر الإشارة إلى أن تادالايمد، عندما يتم تناوله لعلاج إضطراب الإنتصاب، فإنه لا يعمل عند غياب الإثارة الجنسية. عليك وعلى شريك العمل على تحقيق إثارة جنسية، تماماً كما كنتما ستفعلان لو أنك لم تتناول دواء لإضطراب الإنتصاب.

المقدار الدوائي الإعتيادي لعلاج أعراض تضخم البروستات الحميد، عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب: قرص تادالايمد 5 ملغ مرة واحدة في اليوم. يجب تناول القرص كل يوم في نفس الساعة تقريباً.

المقدار الدوائي الإعتيادي لعلاج الرجال الذين يعانون من إضطراب في الإنتصاب وأعراض تضخم البروستات الحميد عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب: قرص تادالايمد 5 ملغ مرة في اليوم. يجب تناول القرص كل يوم في ذات الساعة تقريباً.

#### إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فعليك التوجه إلى طبيبك. من الجائز أن تعاني من أعراض جانبية كما هو مفصل في الفقرة 4. إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

#### إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، تناول الدواء حال تذكرك بذلك لكن لا يجوز لك تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن القرص المنسي. لا يجوز تناول تادالايمد أكثر من مرة واحدة في اليوم.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### ٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال هذا الدواء قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لأن تعاني أياً منها. عادة تكون هذه الأعراض الجانبية طفيفة حتى متوسطة.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من:

- رد فعل تحسسي بما في ذلك طفح جلدي (يظهر في أحياناً متباعدة).

- آلام في الصدر - لا يجوز إستعمال أدوية من نوع نترات، ويجب التوجيه فوراً لتلقي علاج طبي (ظهور في أحياناً متباude).

- إنتصاب متواصل، وربما مؤلم للعضو الذكري بعد تناول تادالايمد (يحدث في أحياناً نادرة). إذا كان لديك إنتصاب بهذا للعضو الذكري الذي يستمر لأكثر من 4 ساعات متواصلة يجب التوجيه فوراً للطبيب.

- فقدان مفاجئ للرؤيا (يظهر في أحياناً نادرة).

#### أعراض جانبية أخرى بلغ عنها:

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100: صداع، ألم في الظهر، ألم في العضلات، ألم في اليدين والرجلين، تورّد الوجه، إحتقان في الأنف وإضطرابات هضمية.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000: دوار، ألم في البطن، تقيؤات، غثيان، حرقان، تشوّش في الرؤيا، ألم في العينين، صعوبة في التنفس، دم في البول، إنتصاب متواصل للعضو الذكري، شعور بضربات في القلب، نبض سريع، ضغط دم مرتفع، ضغط دم منخفض، رعااف، صفير أو أزيز في الأذن (tinnitus)، وذمة في اليدين، الرجلين أو الكاحلين وشعور بالإرهاق.

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000: إغماء، نوبة صرع وفقدان عابر للذاكرة، إنتفاخ الجفنين، إحمرار العينين، ضعف مفاجئ في السمع أو فقدان السمع، شرى (خدمات حمراء مثيرة للحكمة على الجلد)، نزف من القضيب الذكري، دم في النطاف، وزيادة التعرق.

بلغ عن حالات نادرة لنوبة قلبية وسكتة لدى الرجال الذين يتناولون تادالايمد. عانى معظم هؤلاء الرجال من مشاكل قلبية قبل تناول الدواء.

بلغ في أوقات نادرة عن إنخفاض جزئي، مؤقت أو دائم في الرؤيا أو فقدان للرؤيا في عين واحدة أو في كلا العينين.

بلغ عن عدة أعراض جانبية نادرة لدى رجال تناولوا تادالايمد، حيث لم تظهر في التجارب السريرية.

هذه تشمل:

- الشقيقة، وذمة في الوجه، رد فعل تحسسي خطير يتجلّى بوذمة في الوجه أو في البالعوم، طفح شديد، إضطرابات في تدفق الدم إلى العينين، عدم إنتظام نبض القلب، ذبحة صدرية، وموت مفاجئ على خلفية قلبية.

حدث دوار في أحياناً متقاربة أكثر لدى رجال تجاوزوا عمر 75 سنة الذين تناولوا تادالايمد. ظهر إسهال في أوقات متقاربة أكثر لدى رجال تجاوزوا عمر 65 والذين تناولوا تادالايمد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### ٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على علبة الدواء واللوحة (بليستر).

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من الدواء. هذا يساعد الطبيب أو الصيدلي عن كيفية التخلص من الدواء. هذا يساعد في الحفاظ على البيئة.

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

- صداع، ألم في الظهر، ألم في العضلات، ألم في اليدين والرجلين، تورّد الوجه، إحتقان في الأنف وإضطرابات هضمية.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- دوار، ألم في البطن، تقيؤات، غثيان، حرقان، تشوّش في الرؤيا، ألم في العينين، صعوبة في التنفس، دم في البول، إنتصاب متواصل للعضو الذكري، شعور بضربات في القلب، نبض سريع، ضغط دم مرتفع، ضغط دم منخفض، رعااف، صفير أو أزيز في الأذن (tinnitus)، وذمة في اليدين، الرجلين أو الكاحلين وشعور بالإرهاق.

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- إغماء، نوبة صرع وفقدان عابر للذاكرة، إنتفاخ الجفنين، إحمرار العينين، ضعف مفاجئ في السمع أو فقدان السمع، شرى (خدمات حمراء مثيرة للحكمة على الجلد)، نزف من القضيب الذكري، دم في النطاف، وزيادة التعرق.

بلغ عن حالات نادرة لنوبة قلبية وسكتة لدى الرجال الذين يتناولون تادالايمد. عانى معظم هؤلاء الرجال من مشاكل قلبية قبل تناول الدواء.

بلغ في أوقات نادرة عن إنخفاض جزئي، مؤقت أو دائم في الرؤيا أو فقدان للرؤيا في عين واحدة أو في كلا العينين.

بلغ عن عدة أعراض جانبية نادرة لدى رجال تناولوا تادالايمد، حيث لم تظهر في التجارب السريرية.

هذه تشمل:

- الشقيقة، وذمة في الوجه، رد فعل تحسسي خطير يتجلّى بوذمة في الوجه أو في البالعوم، طفح شديد، إضطرابات في تدفق الدم إلى العينين، عدم إنتظام نبض القلب، ذبحة صدرية، وموت مفاجئ على خلفية قلبية.

حدث دوار في أحياناً متقاربة أكثر لدى رجال تجاوزوا عمر 75 سنة الذين تناولوا تادالايمد. ظهر إسهال في أوقات متقاربة أكثر لدى رجال تجاوزوا عمر 65 والذين تناولوا تادالايمد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, low substituted hydroxypropyl cellulose, hydroxy propyl cellulose, magnesium stearate, sodium lauryl sulphate.

Instacoat Aqua III A03G30218: HPMC 2910/hypromellose, lactose monohydrate, triacetin, talc, titanium dioxide, yellow iron oxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تادالايمد 2.5 ملغ عبارة عن قرص أصفر لوزي الشكل. طبع في جانب واحد "TAD" والجانب الثاني أملس.

تادالايمد 5 ملغ عبارة عن قرص أصفر لوزي الشكل. طبع في جانب واحد "5T" والجانب الثاني أملس.

تادالايمد 10 ملغ عبارة عن قرص أصفر لوزي الشكل. طبع في جانب واحد "10T" والجانب الثاني أملس.

تادالايمد 20 ملغ عبارة عن قرص أصفر لوزي الشكل. طبع في جانب واحد "20T" والجانب الثاني أملس.

أحجام العلب:

تادالايمد 2.5 ملغ، تادالايمد 5 ملغ: علبة كرتون تحتوي على 28 قرصاً معبأة ضمن لوحيات/بليستره. يظهر على علبة الكرتون عدد الأقراص في كل علبة.

تادالايمد 10 ملغ: تحتوي علبة الكرتون على 4 أقراص معبأة ضمن لوحيات/بليستره. يظهر على علبة الكرتون عدد الأقراص في كل علبة.

تادالايمد 20 ملغ: تحتوي علبة الكرتون على 4، 8 أقراص معبأة ضمن لوحيات/بليستره. يظهر على علبة الكرتون عدد الأقراص في كل علبة.

من الجائز لأن تتسوق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمتياز والمستورد: إينوفامد فارما م.ض.، ص.ب. 2349،بني برak 5112202.

المنتج: يومديكا لابوراتورييس برايفيت م.ض.، مومباي، الهند.

تم إعدادها في نيسان 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

تادالايمد 2.5 ملغ: 169-53-37028

تادالايمد 5 ملغ: 169-54-37029

تادالايمد 10 ملغ: 169-52-37026

تادالايمد 20 ملغ: 169-55-37030