

**עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקシリים) התשמ"ז - 1986**  
התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

**ספטל סקרב<sup>®</sup>**  
תמייסה לחיטוי  
לשימוש חיצוני

**הרכב**  
(Chlorhexidine Gluconate 4% w/v 4% w/v)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".  
**קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרפקה.  
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף הוראות השימוש בעلون זה. היועץ ברוקח אם הנר זמין למידע נוסף.

**1. למה מיועדת התרופה?**

- שטיפת ידיים אנטיספטית
- חיטוי ידיים לפני ניתוח
- חיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח

**קבוצה רפואיית:** חומרים מחתאים.

**2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתכשיר:**

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. במיוחד  
במטופלים עם היסטוריה של תגבות אלרגיות אפשריות הקשורות לכליוקסידין.
- יש להימנע מגע עם העיניים, האוזן התיכונה, המוח וקרום המוח (העור המכסה את המוח ועמוד השדרה).

**اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

- אין להשתמש בחללי הגוף (לדוגמת אף או אוזניים).
- יש להשתמש בザירות ביילדים, במיוחד אלו שנולדו לפני הזמן. ספטל סקרב עלול לגרום לכוכיות כימיות בעור.
- הסר כל בד סופג, אריג או באגד לפני שימושו או לטפל בו לפני השם. אין להשתמש בכמויות מוגזמות ואין לאפשר לתמייסה להצטבר בקפל העור או מתחת למטופל או לטפל על הסדינים או דבר אחר שנמצא בMagev ישיר עם המטופל.
- כאר שינו צורך לשיטות תחבושות על אזורים בעור שנחשפו לספטל סקרב, יש לנוקוט בザירות על מנת להבטיח שום עדפי תמייסה לא נשארו בטרם חבישת האיזור.

**תגבות בין-תרופתיות:**  
אם אתה לוקח, או אם לך תחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעוות בקשר למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

**שים לב**  
אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

**הוראות השימוש:**  
אין למלול את התמייסה.

**לשתייפת ידיים אנטיספטית:**

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
2. הוסיף 5 מ"ל של ספטל סקרב לא מהול ורוחץ את הידיים במשך דקה
3. שטוף היטב במים
4. יבש היטב את הידיים

#### לחיטוי ידיים לפני ניתוח:

1. הרטב את כפות הידיים ואת האזוריות
2. הוסיף 5 מ"ל של ספטל סקרב לא מהול ורוחץ את הידיים במשך כדקה
3. נקה את הציפורניים באמצעות מברשת
4. שטוף את הידיים במים
5. חוזר על הפעולה עם גוספת במשך 2 דקות
6. שטוף היטב במים
7. ישב היטב את הידיים

#### לחיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח:

1. שטוף את כל הגוף עם 25 מ"ל של ספטל סקרב, לפחות פעמיים, בדרך כלל פעם אחת ביום שלפני הניתוח ופעם שנייה ביום הניתוח.
2. שטוף היטב במים
3. ישב היטב את הגוף.

#### **אין לעبور על המנה המומלצת**

##### **אם בטיעות בלעת ספטל סקרב**

אם בטיעות בלעת ספטל סקרב, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התוropa איתה.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התווית והמנה **בכל פעם שהנרגן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנרגן זוקק להם.** אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתוropa, **היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תוropaה, השימוש בספטל סקרב עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשות תופעות הללו. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

לעתים נדירות קלורהקסידין עלול לגרום לריגישות יתר כולל שוק אנפילקטטי (התנפחות של הגוף או השפתיים ולחץ דם נמוך) ותגובה אלרגית (דלקת העור, גירוד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, סרפה, גירוי בעור, שלפוחיות). אם מתרכחתת אחת מהתגובהות האלה, יש להפסיק את השימוש ולפנות לקבלת טיפול רפואי מיד.

תופעות לוואי בילדים:  
כוחות כימיים (שכיחות לא ידועה).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלוון,  
**עליך להתייעץ עם הרופא.**

##### **דיווח על תופעות לוואי:**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופה".  
שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי, או  
על ידי כניסה לקישור:

#### **5. איך לאחסן את התוropa?**

מנע הרעלת תוropa זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחשך להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות  
ועל ידי כר תמן הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.  
אין להשתמש בתוropa אחריו תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון  
של אותו חודש.

**יש לאחסן מתחת ל- 25°C.**

לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 2 חודשים, אך לא יותר מתאריך התפוגה של התכשיר.

#### **6. מידע נוסף**

##### **• גוסף על המרכיבים הפעילים התוropa מכילה גם:**

Pluronic PE 6800, ammonyx M, isopropanol, D-gluconolactone, herbacol 15.393/T(B), spectracol ponceau 4R, sodium hydroxide (for pH adjustment), Purified water.

##### **• כיצד נראה התוropa ומה תוכן האריזה:**

נווזל צמיג, צלול עד מעט עכור בצבע אדום.  
כל בקבוק מכיל 500 מ"ל תמייסה.

שם היצרן:  
ויטאמיד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת.ד , 114 . בניינה.

בעל הרישום וכתובתו:  
טבע ישראל בע"מ תל אביב.

העלון נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 043.08.23618.00