

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

מוֹפִירּוֹסִין אֹ.קִי.

משחה לאף
כל גרם מכיל:

20 מ"ג מוֹפִירּוֹסִין (כָּסִידָן) (2% w/w) (2% w/w)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 – " מידע נוסף". קרא
בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על
התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה
לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

מוֹפִירּוֹסִין אֹ.קִי.
מכילה מרכיב פועל הנקרא מוֹפִירּוֹסִין סִידָן.

היא משמשת:

- כדי לקטול קבוצת חיידקים באף הנקראט 'סטפִילוֹוקוּקִים'
- קבוצה זו כוללת סטפִילוֹקוּס אַאוֹרָאִיס עמיד למתייצלי (MRSA)
- משחה זו מיועדת לשימוש באף שלך בלבד.

קבוצה רפואיית:
אנטיביוטיקה לשימוש מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) למוֹפִירּוֹסִין סִידָן, מוֹפִירּוֹסִין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בסעיף 6 "מידע נוסף").
אם אין לך כל עלייר, אל תשתמש בתרופה זו. פנה לרופא או לרוקח לפני השימוש במופירוסין א.ק.י.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
מוֹפִירּוֹסִין אֹ.קִי. עלולה לגרום לאלרגיות או לתגובה עוריות חמורות. ראה 'מצבים שיש
לשימם לב אליהם' בסעיף 4.

אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיעזץ ברופא.

פתרת (זיהום פטרית) עלולה להתפתח אם משתמשים במופירוסין אס.ק.י. במשך זמן ארוך.
אם זה קורה, ספר לרופא או לרוקח.

יש להימנע מ מגע המשחה עם העיניים.
- אם המשחה נכנסת לעיניים שלך בטעות, שטוף אותן היטב עם מים.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות אם אתה לוקח או אם לוקח לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הירין והנקה
אם את בהירין או מניקה, חשבת שייתכן שתאת בהירין או אם את מתכנתת להרhot, התיעצז עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות
לא סביר כי מופירוסין אס.ק.י. תשפיע על יכולתך הנהוג או להשתמש במכונות.

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

שימוש בתרופה זו

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל הוא פעמיים ביום.

1. שטוף ויבש את ידך.

2. הנה כמות קטנה של מופירוסין אס.ק.י., בערך בגודל של ראש גפרור, על האצבע הקטנה שלך.

3. מרחق אותה בתוך נחיר אחד.

4. חוזר על שלבים 2 - 3 עבור הנחיר השני.

5. לחץ על צידי האף שלך ביחיד כדי לפזר את המשחה בנחיר.

6. החזר את המכסה לשפופרת ושטוף את ידך.

ניתן להשתמש בקיים אוזניים במקום באצבע הקטנה למריחת המשחה, במיוחד בתינוקות או באנשים חולמים מאוד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

כמה זמן אתה צריך להשתמש במופירוסין אס.ק.י.?' השימוש

במופירוסין אס.ק.י. כל עוד הרופא מנוהה אותך. אם איןך בטוח, שאל את הרופא או הרוקח. החידקים בדרך כלל נעלים מהאף שלך בתוך 3 עד 5 ימים מתחילת הטיפול. אין להשתמש יותר מ- 10 ימים. השלב כל שארית של המשחה.

אם בלעת מופירוסין אס.ק.י.

אם בלעת מהמשחה, היועץ ברופא או ברוקח. אם בטעות בלע ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה אליו.

אם שכחת ליטול את התרופה

- אם שכחת למלוח מופירוסין אס.ק.י., מרחق אותה ברגע שאתה נזכר
- אם המנה הבאה שלך צריכה להימרה בשעה הקרובה, דלג על המנה שהוחמצה
- אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד טיפול כפי שהוא ממלץ על ידי הרופא. גם אם שיפור במצב בריאותך, אין

להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אם אתה מפסיק להשתמש במופירוסין אס.ק."י. מוקדם מדי, יתכן שלא כל החידקים נקטלו או שהם עלולים להמשיך להתרבות. שאל את הרופא או הרוקח متى להפסיק את השימוש במשחה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם שהינך נוטל תרופה**. הרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במופירוסין אס.ק."י. עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

מצביים שיש לשים לב אליהם

אלרגיות או תגובה עורית חמורה:

אליה נדירות מאוד באנשים המשמשים במופירוסין אס.ק."י .. הסימנים כוללים:

- פריחה בולטת ומגרדת
- נפיחות, לפעים של הפנים או הפה, הגורמת לקשיים בנשימה
- התמוניות או איבוד הכרה.

← יש לפנות מיד לרופא אם אתה חווה אחד מהסתמים האלה. יש להפסיק את השימוש במופירוסין אס.ק."י ..

- אם אתה מפתח תגובה עורית חמורה או אלרגיה:

- שטוף את המשחה
- הפסיק את השימוש בה
- ספר לרופא בהקדם האפשרי.

במקרים נדירים, תרופות כמו מופירוסין אס.ק."י. עלולות לגרום לדלקת של המעי הѓeo הגורמת לששלול, בדרך כלל מלאה בدم וריר, כאב בטן וחום (*colitis pseudomembranous*).

← יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם אתה חווה אחד מהסתמים האלה.

תופעות הלואאי הבאות עלולות להתרחש עם תרופה זו:

תופעות לוואי שאין שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:

- גרד, אדמומיות, תחושת שריפה, עקצוץ או צריבה באף.

תופעות לוואי נדירות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים:

- אנשים מסוימים יכולים לפתח תגובה עורית או אלרגיה חמורה. הסימנים יכולים לכלול פריחה, גרד, אדמומיות או כאב.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי, או עליידי כנישה לקישור: [www.health.gov.il/](https://sideeffects.health.gov.il/))

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 30°C.**
לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 10 ימים בטמפרטורה שאינה עולה על 30°C
ולא יותר מתאריך התפוגה של התכשיר.

- מופיירוסין אס.ק."י. הינה משחה הומוגנית בצבע לבן או כמעט לבן. אין להשתמש בה אם היא נראית שונה מהרגיל.
- אין להשיליך תרופות לביב או לפסולת הביתיית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. עצדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Paraffin, white soft, Bis-diglyceryl polyacyladipate-2,
כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:
 - מופיירוסין אס.ק."י. היא משחה הומוגנית בצבע לבן או כמעט לבן.
 - מופיירוסין אס.ק."י. מגעה בשופורת המכילה 3 גרם משחה. כל שופורת מגיעה בקרטון.

בעל הרישום:

א.ס.ק.ים אינטרנשיונל בע"מ, יגאל אלון 94, תל אביב 6789136.

צרן:

Antibiotic-Razgrad AD
68 Aprilsko Vastanie Blvd., office 201, 7200 Razgrad; Bulgaria.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 36613-3694-173.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים. הולן נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.