

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986

يُسَوَّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

**تاروفين 18 ملغ**  
**تاروفين 27 ملغ**  
**تاروفين 36 ملغ**  
**تاروفين 54 ملغ**  
أقراص بإطلاق موقوت

### المادّة الفعّالة

يحتوي كل قرص تاروفين 18 ملغ على 18 ملغ ميثيل فينيدات هيدروكلورايد  
(methylphenidate hydrochloride 18 mg)  
يحتوي كل قرص تاروفين 27 ملغ على 27 ملغ ميثيل فينيدات هيدروكلورايد  
(methylphenidate hydrochloride 27 mg)  
يحتوي كل قرص تاروفين 36 ملغ على 36 ملغ ميثيل فينيدات هيدروكلورايد  
(methylphenidate hydrochloride 36 mg)  
يحتوي كل قرص تاروفين 54 ملغ على 54 ملغ ميثيل فينيدات هيدروكلورايد  
(methylphenidate hydrochloride 54 mg)

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر - انظر الفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.  
وُصف هذا الدواء لك. لا تعطه للآخرين. قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.

### 1. لم أعد هذا الدواء؟

تاروفين مخصص لعلاج اضطراب نقص الانتباه والتركيز وفرط الحركة (ADHD) لدى الأطفال فوق عمر 6 سنوات، ولدى المراهقين والبالغين حتى سن 65 عاما.

### المجموعة العلاجية: منبه للجهاز العصبي المركزي

قد يحسّن تاروفين الانتباه، التركيز، ويقلل الاندفاعية وفرط الحركة لدى الأشخاص المصابين بـ ADHD. من المفترض أن يتم إعطاء تاروفين كجزء من خطة علاجية لـ ADHD قد تتضمن الاستشارة أو علاجات أخرى.

### 2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا كنت أنت أو ابنك:

- لديك/ حساسيّة (حساسا) للمادّة الفعّالة (ميثيل فينيدات هيدروكلورايد) أو لأي مركب من المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفصل 6 "معلومات إضافية").
- هلع جدا، متوتّر نفسيا أو مُنفعل (تعاني من انعدام الهدوء - هياج نفسي).
- تعاني من مشكلة في العينين يطلق عليها اسم الزَّرَق (ضغط زائد داخل العين).
- تعاني من نفضات (تشنجات لا إرادية) أو متلازمة توريت (Tourette's syndrome) أو إذا كان هناك تاريخ عائلي من متلازمة توريت. النفضات هي حركات أو أصوات متكررة خارجة عن السيطرة.
- ي/تتناول حاليا أو تناول/ت خلال الـ 14 يوما التي سبقت بدء العلاج بتاروفين، مستحضرا لعلاج الاكتئاب من مجموعة مثبطات انزيم الأوكسيداز أحادي الأمين (MAOI monoamine oxidase inhibitor).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء  
قبل العلاج بتاروفين، أخبر الطبيب إذا كنت أنت أو ابنك تعانيان من أو عانيتما في الماضي أو لديكما تاريخ عائلي لإحدى الحالات التالية:

- مشاكل في وظائف/ أداء القلب، حالات خلل في القلب أو ضغط دم مرتفع.
- هناك تاريخ عائلي للموت المفاجئ.
- مشاكل نفسية مثل الذهان، الهوس، الاضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب.
- تاريخ عائلي للميل للانتحار.
- نفضات أو متلازمة توريت.
- اختلاجات أو نتائج غير سليمة لفحص تخطيط كهربية الدماغ (EEG).
- مشاكل في الدورة الدموية (تدفق الدم) في أصابع اليدين والرجلين.
- مشاكل في الجهاز الهضمي - المريء، المعدة أو الأمعاء (الدقيقة أو الغليظة).
- إدمان/ تعلق أو إساءة استخدام للكحول، أدوية بوصفة طبية أو مخدرات الشارع.

تم الإبلاغ عن المشاكل التالية عند استعمال ميثيل فينيدات هيدروكلورايد وغيره من الأدوية المنبهة:

#### مشاكل تتعلق بالقلب

- الموت المفاجئ لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب أو تشوه في القلب.
- سكتة ونوبات قلبية لدى المسنين.
- ارتفاع ضغط الدم والنبض.
- عموماً، يُمنع استعمال تاروفين للأطفال، المراهقين أو البالغين الذين يعانون من تشوهات في القلب أو من مشاكل خطيرة أخرى في القلب.
- توجه للطبيب فوراً إذا أصبت أنت أو ابنك بأعراض مشاكل القلب مثل الألم في الصدر، ضيق التنفس أو الإغماء أثناء استعمال تاروفين.

#### مشاكل نفسية (ذهانية)

لدى جميع متلقي العلاج: ظهور أو تفاقم المشاكل التالية:  
مشاكل سلوكية أو تفكيرية، الاضطراب ثنائي القطب، سلوك عدواني أو عدائي.  
لدى الأطفال والمراهقين: ظهور أعراض نفسية (مثل سماع أصوات، الإيمان بأمر غير حقيقية أو الشك) أو ظهور أعراض الهوس.  
يجب التوجه للطبيب فوراً إذا شعرت أنت أو ابنك بظهور جديد أو تفاقم في الأعراض النفسية أو مشاكل أثناء استعمال تاروفين، لا سيما رؤية وسماع أمور غير حقيقية، الإيمان بأمر غير حقيقية أو الشك.

#### انتصاب متواصل ومؤلم (فساح)

تم الإبلاغ عن حصول انتصاب متواصل ومؤلم عند استعمال ميثيل فينيدات. إذا حصلت هذه الظاهرة لديك أو لدى ابنك، يجب التوجه للطبيب فوراً، في أعقاب وجود خطر لضرر غير قابل للإصلاح.

#### مشاكل في الدورة الدموية (تدفق الدم) في أصابع اليدين والرجلين (peripheral vasculopathy)

##### وبضمن ذلك ظاهرة رينو)

- قد تصبح أصابع اليدين أو الرجلين باردة ومؤلمة أو عديمة الإحساس.
- قد يتغير لون أصابع اليدين والرجلين من الباهت إلى الأزرق، إلى الأحمر.
- يجب إبلاغ الطبيب إذا لاحظتم انعدام الإحساس، الألم، تغيير لون الجلد أو الحساسية لدرجة الحرارة في أصابع الرجلين أو اليدين.
- يجب التوجه للطبيب فوراً إذا ظهرت لديك أو لدى ابنك علامات كدمات في أصابع الرجلين أو اليدين خلال فترة تناول تاروفين.

#### التعلق والإدمان

من شأن استعمال الدواء أن يؤدي إلى التعلق أو إساءة الاستخدام. يجب حفظ الدواء في مكان آمن لمنع إساءة الاستخدام. قد يؤدي بيع الدواء أو إعطائه لأشخاص آخرين لإلحاق الضرر بهم، ويشكل مخالفة للقانون.

## الأطفال والمراهقون

يُمنع استعمال تاروفين للأطفال دون سن 6 سنوات، لأنه لم تتم دراسة الدواء في هذه المجموعة العمرية.

## الفحوصات والمتابعة

سيقوم الطبيب بفحصك أو فحص ابنك لمشاكل القلب قبل بدء العلاج بتاروفين. سيقوم الطبيب بمراقبة فحوصات الدم، ضغط الدم ونظم القلب، لديك أو لدى ابنك، بصورة دائمة أثناء العلاج بتاروفين.

يجب قياس وزن وطول الأطفال الذين يتناولون تاروفين في أحيان متقاربة. قد يتم وقف العلاج بتاروفين إذا وجدت مشكلة أثناء هذه المتابعات.

## ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت أنت أو ابنك تتناول/يتناول أو تناول/تؤخرًا، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

قد يؤدي تاروفين بالدمج مع أدوية معينة إلى أعراض جانبية خطيرة. أحيانًا، تكون هناك حاجة لملاءمة جرعات الأدوية خلال فترة تناول تاروفين. سيقوم الطبيب إذا كان بالإمكان تناول تاروفين مع أدوية أخرى بصورة خاصة، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت أنت أو ابنك تتناول أحد الأدوية التالية:

- أدوية من عائلة مثبطات انزيم الأوكسيداز أحادي الأمين (MAOI). يُمنع تناول تاروفين إذا كنت أنت أو ابنك ي/تتناول حاليًا أو تناولت خلال الـ 14 يومًا التي سبقت بدء العلاج بتاروفين، مستحضرات لعلاج الاكتئاب من مجموعة مثبطات انزيم الأوكسيداز أحادي الأمين (MAOI) (انظر أيضا الفصل 2 - بند "يُمنع استعمال الدواء").
  - أدوية لعلاج الاكتئاب، مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أو مثبطات امتصاص السيروتونين.
  - أدوية علاج نوبات الصرع/ الاختلاج (مثل فينوباربيتال، فينيتوين، بريميدون).
  - الأدوية المضادة للتخثر (مثل وارفارين وغيرها).
  - أدوية لعلاج ضغط الدم.
  - أدوية لتقليل الأوعية الدموية.
  - أدوية لعلاج الزكام أو الحساسية التي تحتوي على مضادات الاحتقان.
- يجب معرفة الأدوية التي تتناولها أنت أو ابنك. يجب إعطاء الطبيب أو الصيدلي قائمة الأدوية التي تتناولها أنت أو ابنك. يُمنع البدء بتناول أدوية جديدة أثناء العلاج بتاروفين دون التحدث إلى الطبيب أولاً.

## استعمال الدواء والغذاء

يجب ابتلاع القرص كاملاً مع الماء أو مع سائل آخر. بالإمكان تناول القرص مع أو بدون طعام.

## الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً، مرضعة أو تخططين للحمل، يجب إبلاغ الطبيب، والذي سيقدر إن كنت تستطيعين تناول تاروفين.

## السياسة واستعمال الماكينات

من شأن المواد المنبهة أن تفسد بالقدرة على استعمال الماكينات الخطيرة أو قيادة السيارة. يجب التصرف بحذر، والقيام بهذه الإجراءات فقط بعد أن تكون أنت أو ابنك متأكداً من أنه لا يؤثر على القدرة على القيادة أو استعمال الماكينات الخطيرة.

## معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

الصوديوم - يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول (23 ملغ) من الصوديوم في كل قرص، أي أنه يعتبر "خالياً من الصوديوم" عملياً.

## 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

تاروفين هو قرص بإطلاق موقوت. يقوم بتحرير الدواء للجسم على امتداد اليوم. لذلك، يُمنع مضغ، سحق أو شطر القرص.

يجب ابتلاع القرص كاملاً مع الماء أو مع سائل آخر.

أخبر الطبيب إذا لم تكن أنت أو ابنك قادراً على ابتلاع القرص كاملاً. قد تكون هناك حاجة لأن يصف لك/ لابنك دواءً آخر.

بالإمكان أخذ القرص مع أو بدون طعام.

يجب تناول القرص مرة واحدة في اليوم، صباحاً.

لا يذوب قرص تاروفين بأكمله في الجسم. بعد أن يتم إطلاق كل الدواء، قد تلاحظ وجود قرص فارغ في البراز أحياناً. هذا الأمر طبيعي.

قد يوقف الطبيب العلاج بتاروفين من حين لآخر لمدة زمنية معينة لأجل فحص أعراض اضطراب نقص الانتباه والتركيز مع فرط الحركة (ADHD).

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى، من الممكن حصول أعراض جانبية نتيجة للجرعة المفرطة: تقبؤ، انعدام الهدهد، ازدياد الحركات اللاإرادية، تشنج العضلات، اختلاجات، شعور بالتلبك، هذيان (أن ترى، تشعر أو تسمع أشياء غير واقعية)، فرط التعرق، ألم في الرأس (صداع)، حرارة مرتفعة، تغييرات واضطرابات في نظم القلب، فرط ضغط الدم، انحلال الريبيدات (تحلل العضلات)، توسع الحدقات، جفاف في الفم.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، يُمنع تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي، واستشر الطبيب.

يجب المداومة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء، يجب استشارة الطبيب قبل التوقف عن استعمال الدواء.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال أقراص تاروفين أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفرع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

يجب التوجه للطبيب فوراً إذا حصلت:

- علامات الحساسية، مثل الطفح الجلدي، الحكة أو شرى على الجلد، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم، ضيق التنفس، صفير أو صعوبات في التنفس.
- أعراض مشاكل القلب، مثل الألم في الصدر، ضيق التنفس أو الإغماء. تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية أثناء استعمال ميثيل فينيدات أو منبهات أخرى: ارتفاع في ضغط الدم والنبض، سكتة ونوبات قلبية لدى البالغين، الموت المفاجئ لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب أو تشوه في القلب.
- مشاكل نفسية (ذهانية) - ظهور جديد أو تفاقم في الأعراض النفسية أو مشاكل نفسية أثناء استعمال تاروفين، لا سيما رؤية وسماع أمور غير حقيقية، الإيمان بأمور غير حقيقية أو الشك. مشاكل سلوكية أو تفكيرية، اكتئاب، الاضطراب ثنائي القطب، عدم الهدهد - (فرط حركة العضلات)، سلوك عدواني أو عدائي.
- مشاكل نفسية (ذهانية) لدى الأطفال والمراهقين: ظهور أعراض ذهانية (مثل سماع أصوات، الإيمان بأمور غير حقيقية أو الشك) أو ظهور أعراض الهوس.
- انتصاب متواصل ومؤلم (قساح). هناك حاجة للفحص الفوري لدى الطبيب بسبب الخشية من حصول ضرر غير قابل للإصلاح.

- انعدام الإحساس، الألم، تغيير لون الجلد أو الحساسية لدرجة الحرارة أو ظهور جروح (إصابات) لا تفسير لها في أصابع الرجلين أو اليدين. قد يكون الحديث عن مشاكل في تدفق الدم في أصابع اليدين والرجلين (peripheral vasculopathy) وبضمن ذلك ظاهرة رينو).
- قد يسبب تاروفين إبطاء وتيرة النمو (الطول والوزن) لدى الأطفال.
- اختلاجات، بالأساس لدى متلقي العلاج ذوي تاريخ من الاختلاجات.
- تغييرات في الرؤية أو تشويش الرؤية.
- انسداد في المريء، في المعدة، في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، لدى متلقي العلاج الذين يعانون مسبقاً من التضيّق في هذه الأعضاء.

#### أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة

- تراجع الشهية
- جفاف الفم
- اضطرابات النوم (أرق)
- دوام
- ألم البطن (مغص)
- فرط التعرّق
- ألم في الرأس (صداع)
- غثيان
- هلع
- انخفاض الوزن
- عصبية.

أعراض جانبية شائعة - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100

تقيؤ، حمى، التهاب البلعوم الأنفي (التهاب الغشاء المخاطي في الأنف والبلعوم مع سيلان الأنف القيحي)، سعال، ألم في البلعوم، نبض سريع، ضربات في القلب، دوام (فيرتيجو)، تشويش الرؤية، صعوبات في الهضم، إمساك، تلوّث (عدوى) في مجاري التنفس العلوية، تراجع الشهية، القهم العصبي (اضطراب في الأكل)، شعور بالتوتر في العضلات، رجفة، خدر (تشوش الحس)، تهدئة (سكون)، ألم في الرأس متعلق بالتوتر، حالة مزاجية مكتئبة واكتئاب، انعدام الهدوء، عدوانية، تراجع الشهوة الجنسية، الشعور بالتلبك، اصطكاك الأسنان، توتر، عدم التوازن العاطفي.

#### أعراض جانبية إضافية

تعداد كريات بيضاء منخفض (قلة الكريات البيض)، جفاف في العينين، اضطرابات في التكيف (تركيز الرؤية)، هبات الحرارة، انعدام الراحة أو ألم في البطن، إسهال، ضعف، تعب، شعور بالتوتر/العصبية، العطش، التهاب الجيوب الأنفية، ارتفاع مستوى إنزيم ناقلة أمين الألانين، لغط في القلب، تشنج العضلات، وهن، نعاس، فرط النشاط النفسي-الحركي، غضب، فرط التنبّه، تغييرات في الحالة المزاجية، تقلبات متواترة في الحالة المزاجية، نوبات هلع، اضطرابات في النوم، الميل للبكاء، كلام خارج عن السيطرة وحركات جسدية لا إرادية (توريت - نفضات)، عجز جنسي، ضيق التنفس، طفح جلدي، طفح بقعي، فرط ضغط الدم.

#### أعراض جانبية إضافية تم الإبلاغ عنها أثناء استعمال الدواء (بعد بدء التسويق)

قلة الكريات الشاملة (عدد أقل مما ينبغي لكل خلايا الدم - الحمراء، البيضاء والصفائح)، قلة الصفائح (نقص الصفائح)، فرطية قلة الصفائح الخثرية (نزيف يميّز تعداد الصفائح المنخفض جداً).  
ذبحة صدرية، نبض بطيء، اضطرابات في نظم القلب، رؤية مزدوجة، حدقات متوسعة، مشاكل في الرؤية، آلام في الصدر، حالة من الإزعاج في الصدر، تراجع تأثير الأدوية أو التجاوب مع الدواء، حرارة مرتفعة، تضرر خلايا الكبد، الفشل (القصور) الكبدي الحاد.  
ردة فعل تحسسية (فرط الحساسية) مثل الوذمة الوعائية، ردة فعل صدمة تحسسية، انتفاخ الأذن، بثور على الجلد، تقشر الجلد، الشرى (مرض جلدي)، حكة، تهيج الجلد و/أو تلوّث الجلد، طفح جلدي.  
ارتفاع مستوى إنزيم الفوسفاتاز القلوي (alkaline phosphatase) في الدم، ارتفاع مستويات البيليروبين في الدم، ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد في الدم، تعداد كريات دم بيضاء وصفائح غير طبيعي.

آلام مفاصل، آلام عضلات، تشنج عضلات، انحلال الريبيدات (تحلل العضلات). اختلاجات، خلل الحركة (حركات متكررة لاإرادية)، متلازمة السيروتونين (بالدمج مع تناول أدوية معينة)، الشعور بالتوهان (فقدان التوجّه)، حالات هذيان (بصرية أو سمعية)، هوس، فرط الكلام، تغييرات في الرغبة الجنسية، انتصاب متواصل ومؤلم (قساح)، تساقط الشعر في أماكن مختلفة من الجسم (الثعلبية)، احمرار في الجلد (حمامى)، تقلص الأوعية الدموية في أطراف أصابع اليدين والرجلين، بالعادة بعد التعرض للبرد (ظاهرة رينو).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. شروط التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25°C. يجب إغلاق القنينة جيداً.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

Polyethylene oxide, cellulose acetate, sodium chloride, Opadry 03K19229 Clear, poloxamer, povidone, succinic acid, stearic acid, colloidal silicon dioxide, Pigment Blend PB-2179 Green (black iron oxide and yellow iron oxide), phosphoric acid, Lake Blend LB-2262 Pink (Allura red AC, indigo carmine), Opacode Black S-1-17823.

The 18 mg extended-release tablets also contain Opadry 03K520061 Yellow.

The 27 mg extended-release tablets also contain Opadry 03K57528 Grey.

The 36 mg extended-release tablets also contain Opadry 03K18533 White.

The 54 mg extended-release tablets also contain Opadry 03K15646 Red.

## كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

تاروفين 18 ملغ: قرص مغلف أسطواني الشكل باللون الأصفر وعليه نقش العلامة "18".

تاروفين 27 ملغ: قرص مغلف أسطواني الشكل باللون الرمادي وعليه نقش العلامة "27".

تاروفين 36 ملغ: قرص مغلف أسطواني الشكل باللون الأبيض وعليه نقش العلامة "36".

تاروفين 54 ملغ: قرص مغلف أسطواني الشكل باللون البني-الأحمر وعليه نقش العلامة "54".

تحتوي كل عبوة على 30 قرصاً أو 100 قرص.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: تارو إنترناشيونال للصناعات الدوائية م.ض.، شارع هكيتور 14، خليج حيفا، 2624761.

## اسم المنتج وعنوانه:

Sun Pharmaceutical Industries, Inc., 2 Independence Way, Princeton, NJ  
08540 USA

تم تحريرها في تموز 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة:

تاروفين 18 ملغ - 172-99-36850-99

تاروفين 27 ملغ - 173-01-36851-99

تاروفين 36 ملغ - 173-02-36852-99

تاروفين 54 ملغ - 173-03-36853-99

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.