

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד

לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה, צורתה וחוזקה

Canidryl 20mg Tablets for
Dogs Veterinary

קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי

Canidryl 100mg Tablets for
Dogs Veterinary

קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי

2. חומר פעיל

כל טבליה לשימוש פומי בטעם בשר צלוי מכילה:

קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 20 mg

קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 100 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 13 "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה

התרופה מיועדת לכלבים, להפחתת דלקת וכאב הנגרמים כתוצאה מבעיות שריר-שלד וכתוצאה ממחלת מפרקים ניוונית (Degenerative Joint Disease).

טיפול בכאב אחרי ניתוח כהמשך לשיכוך כאבים שניתן בהזרקה.

קבוצה תרפויטית: נוגדי דלקות שאינם סטרואידלים (NSAIDs)

4. התוויות נגד

אין לתת את התרופה במקרה של רגישות יתר למרכיב הפעיל או לאחד מהחומרים הלא פעילים.

אין לתת את התרופה לחתולים. שימוש בטעות בחתולים יכול לגרום להם להיכנס למצב מסכן חיים.

אין לעבור על המינון המומלץ.

אין לתת את התרופה לכלבים עם מחלות לב, כבד או כליות כאשר קיימת אפשרות להופעת דימומים או כיבים במערכת העיכול, או אם קיימת עדות ללקות בהרכב הדם.

אין לתת את התרופה לגורים מתחת לגיל 4 חודשים.

אין להשתמש בכלבות הרות או מניקות.

5. תופעות לוואי:

תופעות בלתי רצויות הקשורות ל-NSAIDs, כמו הקאות, צואה רכה/שלשול, דם סמוי בצואה, אובדן תאבון

ותשישות דווחו. תופעות לוואי אלו מופיעות בדרך כלל בשבוע הראשון לטיפול וברוב המקרים חולפות

ונעלמות עם הפסקת הטיפול. אולם במקרים נדירים מאוד הן עלולות להיות חמורות או קטלניות.

אם תופעות לוואי מתרחשות, יש להפסיק שימוש בתרופה ולפנות לייעוץ וטרינרי.

כמו בתרופות אחרות מקבוצת ה-NSAIDs קיים סיכון להתפתחות של תופעות לוואי נדירות של הכליות או אידיאלינגרטיית של הכבד.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה כלבים

7. מינון ואופן המתן

מינון מומלץ:

עד 4 מ"ג קרפרופן לק"ג משקל גוף ליום.

מינון התחלתי של 4 מ"ג קרפרופן לק"ג ליום, פעם ביום או מחולק לשתי מנות שוות.

בהתאם לתגובה הקלינית, ניתן להקטין את המינון לאחר 7 ימים ל-2 מ"ג קרפרופן לק"ג משקל גוף ליום כמנה בודדת.

קנידריל 20, מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: ניתן לחצות את הטבליות לחצאים.

קנידריל 100, מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: ניתן לחלק את הטבליות לרבעים או לחצאים.

8. אופן השימוש בתכשיר

משך מתן התרופה תלוי בתגובה לטיפול.

למתן דרך הפה בלבד.

אין לעבור את המינון המומלץ.

9. זמן המתנה

לא רלוונטי

10. אזהרות

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחייית המטרה

מתן התרופה לכלבים מבוגרים עשוי להיות כרוך בסיכונים נוספים. אם לא ניתן להימנע משימוש בתרופה, ייתכן

שכלבים אלו יזדקקו למינון נמוך יותר ומעקב רפואי קפדני.

יש להימנע מלתת את התרופה לכלבים הסובלים מהתייבשות, היפווולמיה או לחץ דם נמוך מכיוון שקיים סיכון

אפשרי של רעילות מוגברת לכליות.

תרופות מקבוצת ה-NSAIDs עשויות לגרום לעיכוב של פאגוציטוזה. לכן לצורך טיפול במצבים דלקתיים הקשורים

לזיהום חיידקי יש להוסיף גם טיפול אנטיביוטיקטריאלי מתאים.

הטבליות הלעיסות מכילות חומרי טעם. על מנת להימנע מנטילת התרופה בשוגג על ידי בעל החיים, יש לשמור

את הטבליות הרחק מטווח השגה של בעלי חיים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

במקרה של בליעת טבלייה בשוגג ע"י אדם, יש לפנות לקבלת ייעוץ רפואי ולהראות לרופא את עלון התרופה. יש

לרחוץ ידיים אחרי מגע עם התרופה.

היריון והנקה של בעל החיים המטופל

מחקרים בחיות מעבדה (עכברושים וארנבים) הראו עדות כי לתרופה רעילות לעובר במינון הקרוב למינון תרופתי.

בטיחות התכשיר לא הוכחה בעת הריון או הנקה.
אין להשתמש בכלבות הרות או מניקות.
אין להשתמש בכלבות בתקופת הייחום.

תגובות עם תרופות אחרות:

קרפרופן נקשרת בחוזקה לחלבוני הפלסמה ומתחרה עם תרופות אחרות הנקשרות גם הן בחוזקה לחלבוני הפלסמה, שיכולות להגביר את האפקט הרעיל בהתאמה. אין להשתמש בקנידריל יחד עם או במרווח של פחות מ-24 שעות מתרופות אחרות מקבוצת NSAIDs. אין להשתמש בקנידריל יחד עם גלוקוקורטיקואידים.

יש להימנע ממתן יחד עם תרופות נוספות שיש להן פוטנציאל נפרוטוקסי (רעילות כלליות).

אין לתת קנידריל יחד עם נוגדי קרישה.

מינון יתר

לא נצפו סימני רעילות כאשר כלבים קיבלו תרופה זו במינון של עד 6 מ"ג/ק"ג פעמיים ביום למשך 8 ימים (פי 3 מהמינון המרבי המומלץ, שהוא 4 מ"ג/ק"ג/יום) ו-6 מ"ג/ק"ג פעם ביום למשך 7 ימים נוספים (פי 1.5 מהמינון המירבי המומלץ, שהוא 4 מ"ג/ק"ג/יום).

לא קיימת תרופת נגד לטיפול במינון יתר של קרפרופן. יש לתת טיפול תומך כללי, כמו במקרים של מינון יתר של NSAIDs.

תופעות לוואי חמורות עלולות להתרחש בנטילת כמויות גדולות. אם אתה חושד שכלבך צרך כמות טבליות מעבר למינון המומלץ, צור קשר עם הווטרינר.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי התווית והקרטון (exp. Date). תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל 25 C°.
- יש לשמור במקום יבש בתוך האריזה המקורית.
- יש להגן מאור.
- קנידריל 20, מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: יש להשליך מיד טבליה חצויה שלא נעשה בה שימוש.
- קנידריל 100, מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: יש להחזיר טבליות מחולקות לבליסטר ולהשתמש בהן בתוך 72 שעות.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל תכשיר וטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר וטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, grilled meat flavor.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
קנידריל 20, מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: טבליה עגולה בצבע לבן-שמנת, עם קצוות משופעים, עם סימון של קו חצויה בצד אחד.

קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי : טבליה עגולה בצבע לבן-שמנת, עם סימון קו חצייה בצורת צלב
בצד אחד
כל אריזה מכילה 100 טבליות במגשיות (בליסטרים).

בעל הרישום ויבואן:

אי.אל. מדי-מרקט בע"מ, רחוב הקטיפ 3, פארק תעשיות עמק חפר, 3877701.

שם היצרן:

CHANELLE Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co, Galway, IRELAND

נערך באוגוסט 2023.

מס' רישום התרופה התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:

קנידריל 20 מ"ג: 160-20-35099

קנידריל 100 מ"ג: 153-51-33972

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, ההנחיות מיועדות לבני שני המינים.