

זולדקס® אל.אי.

שתל להזרקה תת עורית במאזק מוכן מראש

הרכב

כל מזק מכיל:

גוסרلين (אצטט) 10.8 mg 10.8 מ"ג goserelin (as acetate) 10.8 mg

למרכיבים בלתי פעילים أنا ראה סעיף 6 – מידע נוספת.

קרא בעיון את העلون עד סוףו לפני השימוש בתרופה.
שמור את העلون אולי תצטרך אותו בשנית.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלות. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

אם אתה חש באחת מתופעות הלוואי, או אם הנך חש בתופעת לוואי שאינה מוחכרת כאן,
אנא פנה לרופא שלך מיד.

התרופה אינה מיועדת לילדים ולנשים.

1. لما מיועדת התרופה?

טיפול בסרטן הערמוני.

קבוצה טיפולית

זולדקס אל.אי. מכילה תרופה בשם גוסרلين. התרופה משתייכת לקבוצת תרופות שהן
אנלוגים של הורמון LHRH.

זולדקס אל.אי. הנה תרופה לטיפול בסרטן הערמוני. התרופה מקטינה את ההפרשה של
טסטוסטרון (הורמון) שגורם מייצר. זולדקס אל.אי. הנה צורת מתן ארווכת טוח של התרופה
זולדקס וניתנת פעם ב- 12 שבועות.

2. לפני השימוש בתרופה

X אין לשימוש בתרופה זו אם:

הינך רגיש לגוסרلين או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
(ראה סעיף 6).

לא לשימוש על-ידי נשים.
אין לתת תרופה זו לילדים.

אל תשמש בתרופה אם הסעיפים מעלה תקפים לגביך. אם אין לך בטוח אתה דבר
עם הרופא או הרוקח או האחות לפני השימוש בזכודקס אל.אי.

אם הנר הולך לבית חולים, أنا ידע את ה忠ות הרפואי שהנر מקבל זולדקס אל.אי.

לפני הטיפול בזולדקס ספר לרופא או לרוקח או לאחות אם:

- הנר סובל מלחץ דם גבוה.
 - אם יש לך בעיה לבבית כלשהי או בעיה כלשהי בכלי הדם, כולל בעיות בקצב הלב (אריתמיה), או אם הנר מקבל תרופות למצבים אלו. הסיכון לעלייה בהפרעות קצב עלול להתגבר עם נטילת זולדקס.
 - הנר סובל או סבל בעבר מעבויות במהלך שנן או בעיות גב.
 - הנר סובל מסוכרת.
 - הנר סובל ממחלה אשר פוגעת בחזק העצמות.
- במיוחד אם אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול, הנר מעשן, יש לך היסטוריה משפחתית של לדול העצם - אוטואופורוזיס (מצב המשפיע על חזק העצמות שלך) או הנר נוטל תרופות נגד פרוכוסים (תרופות לאפילפסיה או פרוכוסים) או קורטיקוסטרואידים (ステロイડים).

היו דיוחים על דיכאון אצל מטופלים שלוקחים זולדקס, שיכול להיות חמוץ. أنا תידע את הרופא אם הנר מקבל זולדקס ומתפתח מצב רוח דיכאוני.

תרופות מסווג זה עלולות לגרום לאייבוד של סיין מהעצמות (הידללות עצמות).

ילדים

זולדקס אל.אי. אינו מיועד לטיפול ילדים.

אם אתה לוקח תרופות אחרות

אם הנר נוטל תרופה נוספת, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, عليك לדוחה לרופא המטפל לרוקח או לאחות כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובה בין-תרופתיות.
זולדקס אל.אי. עלול להפריע לפעלותן של תרופות מסוימות המיעודות לטיפול בהפרעות קצב הלב (כגון קוינידין, פרוקאנינאמיד, אמיודארון וסוטול), או זולדקס עלול להגביר את הסיכון לעבירות בקצב הלב כאשר נילקה יחד עם תרופות אחרות שיכولات לגרום לאי סדרות בקצב הלב (כגון מתאדוון - לשימוש להקלת כאבים וכחלה טיפול בהתקניות, מוקסיפילוקסצין - אנטיביוטיקה, תרופות אנטיפיסיקוטיות המשמשות לטיפול במחלות נש חמורות).

נהיגה ושימוש במכונאות

זולדקס בדרך כלל אין השפעה על יכולת הנהיגה הרכב או יכולת השימוש במכשירים ומכונות.

3. כיצד השתמש בתרופה?

- שתל הזולדקס אל.אי. יזרק תת עורית בבטן כל 12 שבועות. זה יעשה על-ידי הרופא או האחות.
- חשוב להמשיך להשתמש בזולדקס גם אם הנר מרגיש טוב.
- המשך לקבל את הטיפול עד אשר הרופא שלך מחייב שהגיע הזמן להפסיק.

- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא אחת ל- 12 שבועות תינתן על-ידי הרופא או האחות.
- יש לשמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא עליין לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
- אין לעبور על המנה המומלצת.
- תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות.
- יש לשמש בתרופה זו בזמןנים קצרים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.
- אם עברו יותר מ- 12 שבועות מאז הזריקה האחרונות צור קשר עם הרופא או האחות בכדי להזכיר את ההזרקה הבאה ככל הניתן.

4. **תופעות לוואי**

- כמו בכל תרופה, השימוש בזולדקס אל.אי. עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואוי. ייתכן ולא תסבול מכך מהן.
- **תופעות אלרגיות נדירות** (יכול להתבטא בתגובה עורית כגון פריחה, גרד, סרפת, יכול לגרום לנפיחות בפנים, שפטים או לשון, או חלקי גוף אחרים וכן יכול לגרום لكוצר נשימה, צפופים וקשי נשימה). במידה וישנן תופעות אלרגיות **יש לפנות לרופא מיד**.
 - חבלה במקום ההזרקה (כולל נזק לכלי דם בבטן) דווחו לאחר הזרקת זולדקס אל.אי. במקרים מאוד נדירים הדבר גורם לדימום חמור. **פנה לרופא מיד** אם אתה חש אחד מהתסמינים הבאים:
 - כאבי בטן
 - התנפחות הבطن
 - קוצר נשימה
 - סחרחות
 - לחץ דם נמוך ו/או שינויים במצב ההכרה

תופעות לוואי נוספות:

- תופעות לוואי המתרכשות לעיתים 매우 קרובות (יכול לקרות ליותר מטופל 1 מתוך 10):**
- גלי חום והזהע לעיתים תופעות לוואי אלו יכולות להימשך לזמן מסוים (ייתכן חוזדים) לאחר הפסקת זולדקס
 - ירידה בתשוכה המינית ואין אוננות
 - לעיתים במקום ההזרקה עלולה להופיע חבורה קלה, כאב, דימום, אדמומיות, נפיחות
- תופעות לוואי המתרכשות לעיתים קרובות (יכול לקרות עד מטופל 1 מתוך 10):**
- בעיות במثان או כאביגב תחתון, באם זה קורה **יש לפנות לרופא**
 - כאבי עצמות בתחילת הטיפול, באם זה קורה **יש לפנות לרופא**
 - בתחילת הטיפול תחנן החמרה זמנית בתסמיני הסרטן
 - עלידה בציפות העצם
 - עלידה ברמות הסוכרבדם
 - נימול באכובות הידיים או הרגליים
 - פריחה בעור
 - נשירת שיער
 - עלידה במשקל
 - כאבי פרקים

- ירידה בתפקוד הלבבי או התקף לב
- שינויים בלחץ הדם
- נפיחות ורגשות של השדים
- שינויים במצב רוח, כולל דיכאון

תופעות לוואי המתרחשות לעיתים נדירים מאד (יכול לקרות עד מטופל 1 מתוך 10,000):

- בעיות פסיכיאטריות הנקראות הפרעות פסיכוטיות שיכולות לבוא לידי ביטוי בהתקפות היזות (ראיה), שמיעה או תחשוה של דברים אשר אינם קיימים), הפרעה במחשבות ושינויים באישיות יכולות לקרות לעיתים נדירים מאד.
- התקפות גידול בבלוטת יותרת המוח או באם קיים גידול בבלוטת יותרת המוח, זולדקס אל.אי. עלול לגרום לגידול לדם או לקרוס. תופעה זו מאוד נדירה. גידולים בבלוטת יותרת המוח גורמים לכabi ראש קשים, בחילה, הקאה, איבוד הראייה ואיבוד הכרה.

תופעות לוואי בשכיחות לא ידועה

- שינויים בדם
- בעיות בכבד כולל צחבת (צחבת העור)
- קריש דם בריאות שגורם לכאבים בחזה או קוצר נשימה
- תחליך דלקתי בריאות. התסמינים יכולים להיות דומים לדלקת ריאות (Pneumonia)
- (תסמינים כגון קוצר נשימה או שיעול)
- שינויים ב- ECG (הארכת מקטע QT)
- פגיעה בזכרון

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חממירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעلون, عليك להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעללה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לראיותם ולהישג ידם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנع הרעללה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך הת滂גה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך הת滂גה מתייחס ליום האخرון של אותו חדש.
- יש לשמור תרופה זו לא מעל 25°C, באיזה המקורית.
- יש להשתמש מיד לאחרפתיחה שקית האלומיניום.
- אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

הרכב: נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם

Lactide/glycolide 95/5 copolymer (low and high molecular weight)

כיצד נראית התטרופה ומה תוכן הארץ?
הארזה מכילה מזרק אחד ובומנה אחת, המזרק נמצא בתחום שקיית אלומיניום סגורה.
המזרק הינו בעל מגנון בטיחות וככלל מתקן ושרול לחדרת התטרופה.

מספר רישום התטרופה: 105 61 28735 00

יצרן:

אסטרהוזנית אנגליה בע"מ,
מקלسفילד, אנגליה.

בעל הרישום וכתובתו:

אסטרהוזנית (ישראל) בע"מ,
רחוב עתיר ידע 1, כפר סבא 4464301.

נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.