



كساريلتو 15 ملغ

كساريلتو 20 ملغ

أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

ريفاروكسابان 15 ملغ (Rivaroxaban 15 mg)

ريفاروكسابان 20 ملغ (Rivaroxaban 20 mg)

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر كساريلتو بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة التي يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ كساريلتو والتصرف وفقها.

يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة والنشرة لقراءتهما بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بد لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

كساريلتو مخصص لعلاج الحالات التالية:

• منع الخثرات الدموية في الدماغ (سكتة) وفي الأوعية الدموية الأخرى في الجسم، لدى مرضى كبار يعانون من نظم قلب غير منتظم المسمى الرجفان الأذيني غير الصمامي، ومن عامل خطورة واحد أو أكثر من العوامل التالية: قصور القلب، فرط ضغط الدم، العمر (75 أو أكثر)، سكري، سكتة أو نوبة إقفارية عابرة في الماضي.

• الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (جلطة الأوردة العميقة) وفي الأوعية الدموية للرتتين (إنصمام رئوي) ولمنع تكرار ظهور خثرات دموية في الأوعية الدموية في الرجلين و/أو في الرتتين.

الفصيلة العلاجية: ينتمي كساريلتو إلى فصيلة أدوية تسمى مضادات التخثر ويعمل عن طريق تقليل قابلية تفكك خثرات دموية وذلك بواسطة حصر العامل الذي يساهم في مسيرة التخثر (عامل 10a).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) لـ ريفاروكسابان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لقائمة المركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".
- كنت تعاني من نزف متزايد.
- وُجد لديك مرض أو حالة في عضو بالجسم يزيدان من خطورة حدوث نزف جدي (مثل: قرحة في المعدة، رض أو نزف في الدماغ، إجترت مؤخراً عملية جراحية في الدماغ أو في العينين).
- كنت تتناول أدوية لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبيكسابان أو هيبارين)، عدا حالات الإنتقال من مضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تُعطى هيبارين عن طريق قنطر وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحاً.
- كنت تعاني من مرض كبد الذي يؤدي إلى زيادة الخطورة لحدوث نزف.
- كنت حاملاً أو مرضعة.

لا تتناول كساريلتو وإحك لطبيبك إذا كانت إحدى الحالات الموصوفة أعلاه تنطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول كساريلتو.

إستعمال كساريلتو يتطلب الحذر الخاص. قبل العلاج بـ كساريلتو، إحك للطبيب:

- إذا كنت معرضاً لخطورة عالية لحصول نزف الأمر الذي يمكن أن يحدث في إحدى الحالات التالية: مرض كلوي متطور لأن الأداء الوظيفي للكلى قد يؤثر على كمية الدواء التي تعمل في جسمك (أنظر الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء؟" بخصوص الجرعة الدوائية الموصى بها في حالة المرض الكلوي).
- كنت تتناول أدوية أخرى لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبيكسابان أو هيبارين)، عندما تنتقل من مضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تُعطى هيبارين عن طريق قنطر وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحاً (أنظر الفقرة 2 "إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى...").
- كنت تعاني من أنزفة.
- ضغط دم مرتفع جداً غير متوازن بواسطة علاج دوائي.
- مرض في المعدة أو في الأمعاء الذي قد يسبب نزف، مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب المريء الناتج، مثلاً، عن مرض الإرتداد المريئي - المعدي (مرض ترتفع فيه الحموضة من المعدة إلى المريء) أو أورام تتوضع في المعدة أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.
- مشاكل في الأوعية الدموية لشبكة العين (retinopathy).
- مرض رئوي تتوسع فيه القصبات الهوائية وتمتلئ بإفرازات قيحية (bronchiectasis) أو نزف رئوي سابق.

• إذا وُجد لديك صمام قلب إصطناعي.

• إذا علمت أنك تعاني من مرض بإسم متلازمة أصداد الشحوم الفوسفورية (إضطراب في جهاز المناعة حيث يسبب زيادة خطورة حدوث خثرات دموية)، إحك لطبيبك وهو سيقدر إذا كانت هناك حاجة لتغيير العلاج.

• إذا حدّد الطبيب بأن ضغط دمك غير مستقر أو مخطط لك علاج جراحي أو علاج آخر لإزالة الخثرة الدموية من الرتتين.

إحك للطبيب قبل تناول الدواء، في حال كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك. سوف يقرر الطبيب فيما إذا كان يتوجب علاجك بـ كساريلتو وإذا كنت تحتاج لمتابعة حثيثة.

إذا كان الطبيب يظن أنك معرض لخطورة زائدة لتطويع قرحة في المعدة أو في الأمعاء، فمن الجائز أن يعطيك أيضاً علاجاً لمنعها.

إذا حُطط لك إجراء عملية جراحية أو إجراء إختراقي

• من المهم جداً تناول كساريلتو قبل وبعد العملية الجراحية أو الإجراء الإختراقي، بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.

• إذا كان هناك تدخل للقنطر أو لحقنة داخل العمود الفقري (مثلاً لتخدير فوق الجافية أو تخدير شوكي أو لتسكين الألم) في عمليات الجراحية:

• من المهم جداً تناول كساريلتو قبل وبعد الحقنة أو إزالة القنطر، بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.

• راجع الطبيب المعالج فوراً إذا كنت تعاني من خدر أو من ضعف في الرجلين أو من مشاكل في الأمعاء أو في المثانة البولية بعد زوال مفعول المخدر، لأن ذلك يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للأطفال وللمراهقين دون عمر 18 سنة. لا تتوفر معلومات كافية حول الإستعمال لدى الأطفال والمراهقين.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية معينة مضادة للتلوثات الفطرية (مثل: فلوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، يوساكونازول)، عدا تلك المخصصة فقط للدهن على الجلد.
- أقراص تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشينج - حالة ينتج فيها الجسم فائض من الكورتيزول.

• أدوية معينة لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل: كلاريثروميسين، إيريثروميسين).

• أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج تلوثات فيروس الإيدز (HIV) (مثل: ريتونافير).

• أدوية أخرى مضادة للتخثر (مثل: إنوكساپارين، كلوبيدوجريل أو مضادات فيتامين K مثل وارفارين وأسيفنوكومارول).

• أدوية مضادة للإلتهاب ومسكنة للألم (مثل: نابروكسين أو حمض أسيتيل ساليسيليك [أسبيرين]).

• درونيدارون، دواء لعلاج النبض غير المنتظم.

• أدوية معينة لعلاج الإكتئاب (مثبطات إنتقائية لإعادة إمتصاص السيروتونين [SSRIs] أو مثبطات لإعادة إمتصاص السيروتونين ونورإيبينفرين [SNRIs]).

إحك للطبيب قبل تناول الدواء في حال كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك. هذه الأدوية قد تؤدي إلى زيادة تأثير كساريلتو. سوف يقرر طبيبك فيما إذا كان يتوجب علاجك بـ كساريلتو وفيما إذا كانت هناك حاجة لخضوعك لمراقبة طبية حثيثة.

كذلك، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

• أدوية معينة لعلاج الصرع (epilepsy) (مثل: فينيتوين، كاربامازيبين، فينوباربيتال).

• المستحضر النباتي لعلاج الإكتئاب سانت. جونس وورت (هيبيريكوم).

• ريفامبيسين (مضاد حيوي).

إحك للطبيب قبل تناول الدواء في حال كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك. هذه الأدوية قد تسبب إنخفاضاً في تأثير كساريلتو. سوف يقرر طبيبك فيما إذا كان يتوجب علاجك بـ كساريلتو وفيما إذا كانت هناك حاجة لخضوعك لمراقبة طبية حثيثة.

إستعمال الدواء والطعام

من الواجب تناول الدواء مع الطعام والبلع مع الماء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا تتناولي كساريلتو إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

إذا كان هناك احتمالاً بأن تصبحي حاملاً، عليك إستعمال وسيلة منع حمل موثوقة بها أثناء تناول كساريلتو. إذا أصبحت حاملاً أثناء فترة تناول الدواء، توجهي فوراً للطبيب، الذي سيقدر بخصوص إستمرار العلاج.

السياقة وإستعمال الماكينات

قد يسبب كساريلتو دوار (عرض جانبي شائع) أو إغماء (عرض جانبي غير شائع) (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية"). لا يجوز السياقة، ركوب الدراجة، إستعمال المعدات أو تشغيل الماكينات أثناء إستعمال كساريلتو في حال كنت تتأثر من هذه الأعراض.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لكتون وصيديوم.

إذا قيل لك من قبل الطبيب أنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل أن تبدأ بتناول كساريلتو.

يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليومول صوديوم (23 ملغ) في كل قرص وبالتالي يعتبر "خال من الصوديوم" بجوهره.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيصال مع الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

• الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحدان من قبل الطبيب فقط.

• لمنع الخثرات الدموية في الدماغ (سكتة) وفي الأوعية الدموية الأخرى في الجسم فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي قرص واحد من عيار 20 ملغ مرة في اليوم.

من الجائز أن يتم خفض الجرعة الدوائية إلى قرص واحد من عيار 15 ملغ مرة في اليوم، في حال كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى.

إذا توجب عليك إجتناب إجراء علاج إنسداد في الأوعية الدموية في القلب (إجراء يسمى: التدخل التاجي عن طريق الجلد - PCI) مع إدخال دعامة، تتوفر معلومات محدودة عن خفض الجرعة الدوائية إلى قرص واحد من كساريلتو 15 ملغ مرة واحدة في اليوم بالإضافة لدواء مثبط للصفيحات الدموية، مثل: كلوبيدوجريل.

• لعلاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين وفي الأوعية الدموية للرتتين ولمنع تكرار ظهور خثرات دموية فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي قرص واحد من عيار 15 ملغ مرتين في اليوم لمدة الأسابيع الثلاثة الأولى، وفي سياق العلاج قرص واحد من عيار 20 ملغ مرة في اليوم. بعد إتمام 6 أشهر على الأقل من العلاج، من الجائز أن يقرر الطبيب مواصلة العلاج بقرص واحد في اليوم من كساريلتو 10 ملغ.

في حال كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى وتتناول كساريلتو 20 ملغ مرة واحدة في اليوم، فمن الجائز أن يقرر الطبيب خفض الجرعة الدوائية بعد 3 أسابيع، إلى قرص واحد من عيار 15 ملغ مرة في اليوم، وذلك في حال أن الخطورة لحدوث نزف أكبر من الخطورة لتشكيل خثرة دموية أخرى.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

مدة العلاج

يجب تناول كساريلتو كل يوم إلى أن يوصيك الطبيب بالتوقف.

سوف يقرر الطبيب بخصوص مدة العلاج بالدواء.

طريقة التناول

من الواجب تناول الدواء مع الطعام ويوصى ببلع القرص مع الماء. إذا كنت تستصعب بلع القرص بأكله، تكلم مع طبيبك حول طرق أخرى لتناول كساريلتو.

بالإمكان سحق القرص وخلطه مع الماء أو مهروس التفاح، مباشرة قبل تناوله.

يجب تناول الطعام فوراً بعد تناول الدواء المسحوق.

إذا دعت الحاجة، سيقوم طبيبك بإعطائك كساريلتو المسحوق عن طريق أنبوب تغذية للمعدة.

لا تتوفر معلومات بخصوص الشطر/المضغ.

إن تناول الدواء في نفس الوقت من كل يوم، يساعدك على تذكر تناوله.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

عليك التوجه فوراً للطبيب المعالج. إن تناول كساريلتو أكثر من اللازم يزيد الخطورة لحدوث نزف. إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب

- في الجرعة الدوائية ذات قرص واحد من كساريلتو 15 ملغ أو كساريلتو 20 ملغ مرة في اليوم، يجب تناول جرعة دوائية حال تذكرك لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعة دوائية مضاعفة أو جرعتي دواء في نفس اليوم؛ يجب تناول الجرعة الدوائية القادمة في اليوم التالي وفي السياق مرة في اليوم كالمعتاد وإستشارة الطبيب.
- في الجرعة الدوائية ذات قرص واحد من عيار 15 ملغ مرتين في اليوم يجب تناول جرعة دوائية حال تذكرك. لا يجوز تناول أكثر من قرصين من عيار 15 ملغ في يوم واحد. بالإمكان تناول قرصين من عيار 15 ملغ معاً للحصول على جرعة دوائية قدرها 30 ملغ ليوم واحد. في اليوم التالي يجب الإستمرار بتناول قرص واحد من عيار 15 ملغ مرتين في اليوم.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب نظراً لأن كساريلتو يعالج ويمنع حدوث حالات خطيرة.

إذا توقفت عن تناول الدواء فإنك تضر بالقدرة العلاجية والوقائية للدواء.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كساريلتو قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهم من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. مثل الأدوية المشابهة الأخرى لتقليل تشكل الخثرات الدموية، فإن كساريلتو قد يسبب حدوث نزف الذي قد يشكل خطراً على الحياة. النزف الشديد قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم (صدمة). في بعض الحالات قد يكون النزف مستتراً.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض الجانبية التالية:

علامات لنزف:

- نزف دماغي أو داخل الجمجمة (الأعراض يمكن أن تشمل صداع، ضعف في جانب واحد، تقيؤ، إختلاج، إنخفاض مستوى الوعي وتصلب الرقبة. هذه حالة طبية طارئة خطيرة، يجب البحث عن علاج طبي فوري!).
- نزف متواصل أو متزايد.
- ضعف غير عادي، إرهاق، شحوب، دوام، صداع، إنتفاخ مجهول السبب، ضيق تنفس، ألم في الصدر أو نبضة صدرية (angina pectoris).
- سوف يقرر طبيبك فيما إذا يتطلب الأمر متابعة حثيئة أو يتطلب تغيير في العلاج.

علامات لردود فعل جلدية خطيرة:

- طفح شديد منتشر على الجلد، حويصلات أو جروح في النسيج المخاطي، مثلًا في الفم أو في العينين (Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis).
- رد فعل للدواء الذي يؤدي إلى حدوث طفح، سخونة، إلتهاب الأعضاء الداخلية، شذوذ في الدم وحدوث مرض جهازى (متلازمة DRESS). إن وتيرة هذه الأعراض الجانبية هي نادرة جداً (أدنى مستعمل 1 من بين 10,000 مستعمل).

علامات لردود فعل تحسسية خطيرة:

- إنتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة؛ صعوبات في البلع؛ شرى وصعوبات في التنفس؛ هبوط مفاجئ لضغط الدم. إن تواتر ردود الفعل التحسسية الخطيرة هو نادر جداً (ردود فعل إستهدافية، بما في ذلك صدمة إستهدافية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10,000) وغير شائعة (وذمة وعائية وذمة تحسسية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100).

أعراض جانبية إضافية

- أعراض جانبية شائعة (Common) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10):
 - إنخفاض في خلايا الدم الحمراء الذي قد يؤدي إلى شحوب، ضعف أو إلى ضيق في التنفس
 - نزف في المعدة أو في الأمعاء، نزف في الأعضاء التناسلية والبولية (يشمل دم في البول ونزف طمثي متزايد)، رعاف، نزف في اللثة
 - نزف إلى داخل العين (يشمل نزف من بياض العين)
 - نزف إلى داخل نسيج أو تجويف في الجسم (نزف دموي داخلي موضعي، رض)
 - سعال دموي
 - نزف من الجلد أو تحت الجلد
 - نزف بعد عملية جراحية
 - تسرب دم أو سائل من جرح العملية الجراحية
 - إنتفاخ في الأطراف
 - ألم في الأطراف
 - خلل في وظيفة الكلى (يمكن الكشف عنه بواسطة الفحوص التي تُجرى من قِبل الطبيب)
 - سخونة
 - ألم في البطن، صعوبات في الهضم، غثيان أو تقيؤ، إمساك، إسهال
 - ضغط دم منخفض (أعراض ذلك يمكن أن تكون دوام أو إغماء عندما تنتقل إلى وضعية الوقوف)
 - إنخفاض عام في القوة والحيوية (ضعف، إرهاق)، صداع، دوام
 - طفح، حكة في الجلد
 - فحوص الدم يمكن أن تشير إلى إرتفاع في إنزيمات كبدية معينة

أعراض جانبية غير شائعة (Uncommon) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100):

- نزف داخل الدماغ أو داخل الجمجمة (أنظر آتفاً، علامات لنزف)
- نزف إلى داخل مفصل الذي يسبب ألم وإنتفاخ
- قلة الصفائح الدموية (عدد منخفض للصفائح الدموية، حيث أنها خلايا التي تساعد على تخثر الدم)
- ردود فعل تحسسية، تشمل ردود فعل تحسسية في الجلد
- خلل في الأداء الوظيفي للكبد (يمكن الكشف عنه من خلال الفحوص التي يجريها الطبيب)
- يمكن أن تشير فحوص الدم إلى حدوث زيادة في البيليروبين، في إنزيمات معينة للبنكرياس أو الكبد أو في عدد الصفائح الدموية
- إغماء
- شعور عام غير جيد
- نبض متسارع
- جفاف في الفم
- شرى (urticaria)

أعراض جانبية نادرة (Rare) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 1,000):

- نزف إلى داخل العضل
- ركود صفراوي (قلة تدفق الصفراء)، إلتهاب الكبد (hepatitis) بما في ذلك تضرر خلايا الكبد (إلتهاب الكبد الذي يشمل حصول ضرر في الكبد)
- إصفرار الجلد والعينين (يرقان)
- إنتفاخ موضعي
- نزف دموي داخلي موضعي (ورم دموي) في مفرج الرجلين نتيجة إختلاط لإجراء قلبي يُدخل فيه قنطرة إلى شريان في الرجل

أعراض جانبية نادرة جداً (Very rare) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 10,000):

- تراكم الحمضات، نوع من خلايا الدم المحببة البيضاء التي تؤدي إلى إلتهاب في الرتتين (إلتهاب الرتتين اليوزيني).

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (لا يمكن تقييم الشيوع من المعلومات المتوفرة):

- فشل كلوي بعد نزف شديد
- ضغط زائد في عضلات الرجلين أو الذراعين بعد نزف، الذي يسبب ألم، إنتفاخ، تغيرات حسية، خدر أو شلل (متلازمة الحثَر بعد حدوث نزف)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز إلقاء الأدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال بعد. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:
 - Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hypromellose 5 cP, hypromellose 15 cP, magnesium stearate, sodium laurylsulfate, macrogol 3350, titanium dioxide, ferric oxide red.
- يحتوي كل قرص من كساريلتو 15 ملغ على 25.4 ملغ لكتوز مونوهيدرات. يحتوي كل قرص من كساريلتو 20 ملغ على 22.9 ملغ لكتوز مونوهيدرات.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟
 - كساريلتو 15 ملغ: أقراص مطلية، مستديرة، بلون أحمر، محدبة من كلا الجانبين ومُعلمة "BAYER" على جانب واحد و- "15" مع مثلث على الجانب الثاني.
 - كساريلتو 20 ملغ: أقراص مطلية، مستديرة، بلون بني - أحمر، محدبة من كلا الجانبين ومُعلمة "BAYER" على جانب واحد و- "20" مع مثلث على الجانب الثاني.
- الأرقام متوفرة ضمن لويحات (بليستر) بعلب ذات 7، 14، 28، 42، 98 و 100 قرص.
- من الجائز ألا تُسوّق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز وعنوانه: باير إسرائيل م.ض، شارع هاحاراش 36، هود هشارون 4527702.
- إسم المنتج وعنوانه: باير آي.جي، ليفركوزن، ألمانيا أو باير Healthcare Manufacturing S.r.l، ميلانو، إيطاليا.
- تم إعدادها في آذار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- أرقام سجل الأدوية في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
 - كساريلتو 15 ملغ: 147 44 33576 01، 147 44 33576 00
 - كساريلتو 20 ملغ: 147 44 33576 03، 147 44 33576 02
 - كساريلتو 20 ملغ: 147 45 33579 01، 147 45 33579 00
 - كساريلتو 20 ملغ: 147 45 33579 04، 147 45 33579 02
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.