

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

پارامول أف وشيوعول للعلاج في النهار، حبوبلات

كل حبيولة تحتوي على:

پاراسيتامول (Paracetamol) 325 ملغ،

جوايفينسين 200 ملغ (Guafenesin)

پسودويفيدرين هيدروكلوريد

ديكستروميثوروفان هيدروبروميد

25 (Pseudoephedrine hydrobromide) ملغ

10 (Dextromethan hydrobromide) ملغ.

المواد غير الفعالة والمهيبة للحساسية في الدواء - انظر للبلند 6 معلومات إضافية* وللبلند 2 "معلومات مهمة حول قسم من مركبات الدواء".

هذه النشرة بأكملها يضمن قبل استخدام الدواء. تحتوي أي نسخة أخرى من معلومات موزعة عن الدواء. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى فاستأجر الصيدلي.

يعطى هذا الدواء دون الحاجة لوصفة طبية وهو مخصص للبالغين والأطفال فوق جبل 12 سنة. يجب عليك تناول الدواء وفقا لتعليمات الواردة في البلاند 3 "كيفية استخدام الدواء" في هذه النشرة. استمر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

يجب التوجه لطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام. إذا تفاقم أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام بعد الرغم من استخدام الدواء أو في أي حالة تظهر فيها أعراض جديدة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

هذا الدواء مخصص لتخفيف أعراض الرشح، السعال واحتقان الأنف المرافقة بسخونة والألم للعلاج في النهار.

الفصلية العلاجية:

پاراسيتامول - مسكن للآلام وخافض للسخونة.

جوايفينسين - طارد للبلغم.

پسودويفيدرين - مخفف لاحتقان الأنف.

ديكستروميثوروفان - كابيت للسعال.

2. قبل استخدام الدواء

لا تستخدم الدواء إذا:

- كنت حساسا (أرجح) للمكونات النشطة (پاراسيتامول، جوايفينسين، پسودويفيدرين، دكستروميثوروفان أو مضادات أخرى للاحتقان أو لأي من المكونات الأخرى التي تحتوي عليها هذا الدواء (انظر للبلند 6))
- كنت تتعاطى بانتظام أي يادوية من فصيلة مضطبات مومونامين (مضطبات MAOs) (لعلاج الاكتئاب) أو يادوية مضطبات مومونامين أوكسيداز عكوسة (RIMAs) أو خلال 14 يوما من وقف العلاج بها.
- إذا كنت تتناول أيوية من فصيلة مضطبات المونامين المتصانص السيروتونين الانتيائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين الماضيين.
- إذا كنت تتناول أو تتناول خلال الأسبوعين الماضيين أيوية مضادة للاكتئاب أو أيوية نفسية، أيوية للحالات العاطفية أو أيوية لمرض الأبرية نفسية.
- كنت تعالج في نفس الوقت بمضادات أخرى للاحتقان، أيوية إضافية للسعال والبرد.
- كنت تتناول أيوية من فصيلة مضطبات مومونامين (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين الماضيين.
- إذا كنت تتناول أو تتناول خلال الأسبوعين الماضيين أيوية مضادة للاكتئاب أو أيوية نفسية، أيوية للحالات العاطفية أو أيوية لمرض الأبرية نفسية.
- كنت تعالج في نفس الوقت بمضادات أخرى للاحتقان، أيوية إضافية للسعال والبرد.
- كنت تتناول أيوية من فصيلة مضطبات مومونامين (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين الماضيين.
- إذا كنت تتناول أو تتناول خلال الأسبوعين الماضيين أيوية مضادة للاكتئاب أو أيوية نفسية، أيوية للحالات العاطفية أو أيوية لمرض الأبرية نفسية.

- كان لديك مرض السكري.
- كنت طفلا عمرك أقل من 12 عاما.
- كنت تتعاطى في نفس الوقت بمضطبات أخرى تحتوي على پاراسيتامول (إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الدواء الذي تتناوله يحتوي على پاراسيتامول، فاستشر الطبيب أو الصيدلي).
- كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (الثيرويد).
- كنت تعاني من ارتفاع الضغط داخل العين (جلوكوما).
- كنت تعاني من مرض كلوي حاد.
- كنت تعاني من ورم الكلى أو ورم نادر في الغدة الكظرية.
- يؤثر على ضغط الدم وتيرة القلب).
- كنت تتناول أيوية تحفز أو تثبط الشهية أو أيوية لعلاج الربو (أيوية محاكية الودي).

تحذيرات خاصة بشأن استخدام الدواء

إذا كنت قد طورت في الماضي أعراضا جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز تناول مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، لكي لا تسبب ثانية أعراضا جلدية شديدة.

يجتوي المتضرر على الباراسيتامول، والذي قد يسبب تلف كبد عندهما:

- يعطى بجرعة أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة.
- يتم استهلاك مشروبات كحولية أثناء العلاج.
- يتم تناول أيوية أخرى تؤثر على عمل الكبد.
- لا يجوز استخدام هذا الدواء في أوقات متقاربة دون استشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول أيوية أخرى خافضة للحرارة ولتسكين الألم أو أيوية للآرلاج دون استشارة طبيب أو صيدلي لمنع جرعة مفرطة أو التسبب من الباراسيتامول.
- لا يجوز تناول أيوية أخرى من فصيلة الباراسيتامول / أو غيرها من المستحضرات التي تحتوي على پاراسيتامول.
- يجب تناول جرعة عالية (ضمن الحد الموصى به) من هذا الدواء أثناء الصوم.

إذا كنت حساسا لأي طعام أو دواء، يجب عليك إبلاغ طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

قد يؤدي تناول هذا الدواء بشكل دائم لفترة طويلة من الزمن إلى الإدمان. تناول هذا الدواء كما هو موصوف في هذه النشرة.

قبل العلاج بپارامول أف وشيوعول للعلاج في النهار، أخبر طبيبك إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- مرض أو ضعف في الأذاه الوظيفي للقلب و/أو الأوعية الدموية (مثل: مرض الشرايين التاجية - انسداد الشرايين أو الأوردة)
- مرض أو ضعف في جهاز التنفس، مثل: الربو أو إذا كنت تعاني من نوبة ربو، سعال مستمر لفترة طويلة، سعال مصحوب بحمى، طفح جلدي أو صداع مستمر
- مرض كبد أو ضعف في الأذاه الوظيفي للكبد
- ضعف في الأذاه الوظيفي للكلى.
- مشاكل في التبول أو تصدح اليوروستاتا (تسبب إدرار البول بوتيرة عالية)
- ضعف في الأذاه الوظيفي للغدة الدرقية (الثيرويد)
- ضعف في الأذاه الوظيفي للريوستاتا
- إذا كنت مدمنًا على المواد الأفيونية (إسهال).
- الموصوفة أو العقاقير المحظورة
- عانيت مؤخرا من أعراض الفطام من الكحول أو المخدرات
- مثل: اضطراب عاطفي، أو قلق، تعرق أو ارتجافات

يرقان

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تتناول مؤخرا أيوية أخرى، بما في ذلك أيوية لا تستلزم وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر طبيبك أو الصيدلي بذلك. يجب اخبار الطبيب أو الصيدلي بشكل خاص إذا كنت تتناول دواء من المجموعات التالية أو إذا أنتقلت للتو للعلاج بالأدوية التالية:

- أيوية مضادة للتكولين (لعلاج التشنجات والتقلصات مثل الربو).
- أيوية من فصيلة مضطبات إعادة المتصانص السيروتونين الاختيارية

[SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين الماضيين (انظر للبلند 2،* لا يجوز استخدام الدواء إذا)

- أيوية مضادة لتخثر الدم وخاصة وارفارين.
- أيوية مضادة للاكتئاب (بما في ذلك مضطبات MAO -RIMAs، انظر للبلند 2،* لا تستخدم الدواء إذا) أو إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين الماضيين
- مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات
- أيوية للاكتئاب، أمراض نفسية، لحالات عاطفية أو لمرض الكلى
- الكلى والكلى إذا كنت قد تناولتها في الأسبوعين الماضيين (انظر للبلند 2،* لا يجوز استخدام الدواء إذا)
- كوليكاييد - دواء مضاد للاكتئاب
- أيوية لخفض ضغط الدم مثل: غوانيثيدين، ميثيلدوبا، حاصرات الخلايا العصبية الأدرينالية
- حاصرات ضغط الدم مثل: غوانيثيدين، ديبيروكوين، تريفلينول ومينالدين أو غيرها من الأيوية الخاصة لضغط الدم (مثل: حاصرات بيتا - انظر للبلند 2،* لا تستخدم الدواء إذا، حاصرات ألفا أو موسعات الأوعية الدموية) وأيوية القلب (مثل ميثادون، كيندين).
- المستحضرات التي تخفف نشاط الزيميات في الكبد (مثل: فينيوتين للاحتلاجات) (باريتورات)
- أيوية مضادة للاحتلاجات (لعلاج الصرع) مثل: فينيوتين، كاربامازيبين
- ميثوكولوراميد أو دومبيريدون (لعلاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي)
- كلوكرامفينكول أو جوايفينسين (مضادات حيوية)
- برونسبيد (لعلاج الربو)
- كوليستيرامين (لخفض مستوى الدهون في الدم)
- مستحضرات مضادة للتهاليل غير ستيرويدية
- أقراص منع الحمل
- جليكوزيدات القلب (الأدوية المستخدمة في اضطرابات وتيرة القلب أو فشل القلب مثل جيجوكسين)
- قنودات الأروغ (Ergot alkaloids) - لعلاج الصداع النصفي مثل ارغوتمان أو ميثيرجيد
- أوكسيتوسين (دواء يعطى أثناء الولادة لتقليص الرحم)
- تريبريتين لعلاج التهابات العنق
- سيناكسبتين لعلاج فرط نشاط ثانوي للغدة الدرقية
- ميثادون لعلاج الألم الشديد

يجب اعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ فلوكوكسيلين (مضاد حيوي) عقب إختبار وخيم لعدم السلامة في الدم والوسايل (High anion gap metabolic acidosis) الذي يتطلب علاج عاجل وقد يحدث للأشخاص في حالات تضرر كلوي وخيم، إبتان الدم (وضع تتواجد فيه البكتيريا وسومها في الدم وتؤدي لتضرر الأعضاء)، سوء تغذية، إدمان كحول مزمن، وفي حالات يتم فيها استعمال الجرعة اليومية القصوى من پاراسيتامول.

إذا كنت تتناول سوية مع پارامول أف وشيوعول للعلاج في النهار، أخبر طبيبك إذا كنت تتناول في حال

حتى إذا كان شعورك جيدا. فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب الخطر لتلف شديد للكبد. يمكن أن تكون الأعراض الجانبية: غثيان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية، الألم في البطن، تورم، زيادة التعرق، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن وقد لا يعكس شدة الضرر للكبد. تشنجات عضلية، تقيؤ نفسي، ارتباك، تعالي، مساس بمستوى البظطة (الوعى) وتيرة سريعة وغير إرادية للعينين، مشاكل في القلب (وتيرة سريعة للقلب)، مشاكل في التنفس، اضطراب عظمي خاص مصحوب ببولوسة، مشاكل في الأفعال الزائد.

إذا نسيبت تناول الدواء، قد الجرعة التالية حسب الحاجة، بشرطه أنه تم تناول الجرعة الأخيرة قبل 4 ساعات على الأقل من تناول الجرعة الحالية. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصلى والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء، ضع النظرات إذا كنت في حاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استخدام الدواء، وأي دواء آخر يتم إعطائك له.

الاستخدام لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص للأطفال فوق جبل 12 سنة، انظر للبلند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج بأي أعراض جانبية وأي دواء آخر يتم إعطائك له.

السيفالة واستخدام الآلات

قد يجعلك الدواء تشمر بالتعب والدوار، ولذلك قد يؤثر الدواء على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات أو الآلات.

لا يجوز السيفالة أو تشغيل الات حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك.

بالنسبة للأطفال، فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة أو اللعب بالقرب من الشارع وما إلى ذلك.

معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء

يحتوي هذا الدواء على Ponceau 4R aluminum lake (E124)، والذي قد يسبب ردود فعل تحسسية، يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليون من الصوديوم (23 ملغ) لكل حبيولة، أي أنه أقل من الصوديوم.

3. كيفية استخدام الدواء؟

يجب عليك أن تفحص عن الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. ما لم يامر الطبيب بخلاف ذلك، فإن الجرعة المتبعة عادة هي:

للبالغين والأطفال فوق جبل 12 سنة: 1-2 حبيولات، كل 4-6 ساعات، حتى 4 مرات في اليوم.

المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا: يجب استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الدواء، لأنهم قد يكونون حساسين لمستحضرات من هذا النوع.

عن استخدام المعتاد لپارامول أف وشيوعول للعلاج في الليل، لا يجوز تجاوز جرعة يومية إجمالية من 8 حبيولات (أنه استخدام المعتاد لپارامول أف وشيوعول للعلاج في الليل، يجب استبدال جرعة

پارامول أف وشيوعول للعلاج في النهار بجرعة پارامول أف وشيوعول للعلاج في الليل، وعدم تناولها كإضافة للجرعة القصوى الموصى بها أعلاه.

پارامول أف وشيوعول للعلاج في النهار) انظر 4 ساعات على الأقل بين تناول جرعة واحدة والتي تليها.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقم أعراض المرض أو لم تظهر أعراض جديدة.

طريقة ابتلاع الحبيولة

يجب ابتلاع الحبيولة مع الماء. يسمح بشرط الحبيولة. لا توجد معلومات بخصوص مضغ أو سحق الحبيولة.

إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع مطلق من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه على الفور إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

حتى إذا كان شعورك جيدا. فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب الخطر لتلف شديد للكبد. يمكن أن تكون الأعراض الجانبية: غثيان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية، الألم في البطن، تورم، زيادة التعرق، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن وقد لا يعكس شدة الضرر للكبد. تشنجات عضلية، تقيؤ نفسي، ارتباك، تعالي، مساس بمستوى البظطة (الوعى) وتيرة سريعة وغير إرادية للعينين، مشاكل في القلب (وتيرة سريعة للقلب)، مشاكل في التنفس، اضطراب عظمي خاص مصحوب ببولوسة، مشاكل في الأفعال الزائد.

إذا نسيبت تناول الدواء، قد الجرعة التالية حسب الحاجة، بشرطه أنه تم تناول الجرعة الأخيرة قبل 4 ساعات على الأقل من تناول الجرعة الحالية. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصلى والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء، ضع النظرات إذا كنت في حاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استخدام الدواء، وأي دواء آخر يتم إعطائك له.

الاستخدام لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص للأطفال فوق جبل 12 سنة، انظر للبلند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج بأي أعراض جانبية وأي دواء آخر يتم إعطائك له.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يسبب استخدام پارامول أف وشيوعول للعلاج في النهار أعراضا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرح من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

أعراض جانبية شديدة

يجب التوقف عن استخدام الدواء والتوجه للطبيب فوراً عند ظهور ما يلي:

• ردود فعل تحسسية وخيمة التي تشمل طفح جلدي

• مثل الشرى (التي قد تكون مصحوبة بتورم والتهان، والحد) وحكة، تورم الوجه، الشفتين، الفم، اللسان، اللسان، تورم الأطراف، وتيرة سريعة للقلب

• التي قد تسبب صعوبات في التنفس أو البهل، تورم الأطراف، وتيرة سريعة للقلب

• قد يسبب البراسيتامول، في حالات نادرة، ظهور أمراض جلدية وخيمة يمكن أن تكون علامتها: احمرار، طفح جلدي، بقع، تلف واسع للجلد. قد تظهر أعراض جانبية جلدية وخيمة حتى لو كنت قد تناولت في الماضي مستحضرات تحتوي على العنصر الفعال براسيتامول دون أي مشكلة في حالة حدوث أعراض جانبية للجلد، تتوقف عن العلاج وتوجه للطبيب على الفور.

• عدم راحة في البطن

• دوار، تعالي، ارتباك

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "دعونا نعمل على تحسين لوزا" على موقع وزارة الصحة (www.health.gov.au).

لترجع إلى "معلومات إضافية" في هذا القسم من هذا الموقع الإلكتروني للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

https://sideeffects.health.gov.au

5. كيفية تخزين الدواء؟

يجب التسليم، يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومحار زربتهم. وبذلك تمنع التسليم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ الفسوخ) التي تظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين: يجب التخزين تحت درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

• لا يجوز تناول الأدوية لمياه الصرف الصحي أو لسلة النفايات المنزلية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. هذه التدابير سوف تساعد في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي أيضا على:

Croscarmellose sodium, talc, povidone, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), methylcellulose, silica colloidal anhydrous, macrogol 400, brilliant blue FCF aluminum lake (E133), ponceau 4R aluminum lake (E124), quinoline yellow aluminum lake (E104), carnauba wax

حبيولة بولون أزرق مع خط شطر على كلا الجانبين. أحجام حبيوات المعتددة: 10، 20، 30، 50 حبيولة. قد لا يتم تسويق جميع أحجام الحبيوات.

تم التقيح في نيسان 2023 وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

زرع تسجل الدواء في سجل الحكومي في وزارة الصحة: 00-30769-00-127

التبسيط وتسهيل القراءة. تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. على الرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: كدمل ج.رض، شارع كدمل 1، 306000، إسرائيل

Paramol AF & Shiul Day Care PIL PB0723-03