

## עלון לצריך לפי תקנות הרווחים (תקנירים) התשמ"ז – 1986

התרופה משוקת ללא מרשם רפואי

### **סטרונאצ AQ טרסיס לאף תרחיף**

#### **חומר פעיל**

טריאמצינולון אצטונייד W/w 0.055% (triamcinolone acetonide 0.055% w/w) כל לחיצה משחררת 55 מיקרוגרם טריамצינולון אצטונייד.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון לעalon זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוספת. עליך לפנות לרופא אם תסמנני המחלתה (סימפטומים) מחקרים או אינם משתפרים תוך 14 ימים. תרופה זו מיועדת لمבוגרים וילדים מעל גיל שנתיים. השימוש ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 על פי מרשם רפואי.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

טיפול בתסמינים של נזלת אלרגית עונתית ורב שנתית במבוגרים וילדים מעל גיל שנתיים. קבוצה רפואיית: קורטיקוסטרואיד למtan מקומי באף.

- תסמינים של אלרגיה המופיעים באף כוללים התעתשות, גרד, אף סתום, גודש באף או נזלת. הם יכולים להיגרם מ:
- פרואה של בעלי חיים או קדחת אבק הבית. סוג זה של אלרגיה יכול להתחש בכל זמן במהלך השנה ונקרו נזלת אלרגית רב שנתית.
  - אבקנים. סוג זה של אלרגיה, כמו קדחת השחת, יכול להיגרם על ידי אבקנים שונים בעונות השונות של השנה ונקרו נזלת אלרגית עונתית.

תרופה זו פועלת רק אם נלקחת על בסיס קבוע ויتكن שלא תעוזר לתסמינים באופן מיידי. היא עוזרת לחלק מהאנשים ביום הראשון לטיפול, ולאחר מכן יתכן שיידרש שלושה עד ארבעה ימים להרגשת ההקללה.

#### **2. לפני שימוש בתרופה**

##### **אין להשתמש בתרופה אם:**

אתה רגיש (אלרגי) לטריאמצינולון אצטונייד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6). תסמינים (סימפטומים) של תגובה אלרגית לסטרונאצ AQ טרסיס לאף כוללים פריחה, גרד, כאבים בבליעה או בנשימה, נפיחות בשפתים, בפנים, בלוע או בלשון.

#### **اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

##### **לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:**

- יש לך זיהום לא מתופל כלשהו באף או בלוע. אם אתה נדבק בזיהום פטריטי במהלך השימוש בסטרונאצ AQ טרסיס לאף, הפסיק את השימוש בתרסיס עד להשלמת הטיפול בזיהום.
  - עברת לאחרונה ניתוח באף או סבלת מפציעה או מכיב באף.
  - עברת לשימוש בסטרונאצ AQ טרסיס לאף לאחר שימוש בזריקות או טבליות שמכילות סטרואידים.
  - אי פעם סבלת מגלאוקומה או קטרקט.
- פנה לרופא אם אתה חווית טשטוש בראייה או הפרעות ראייה אחרות.

#### **השפעות סיסמטיות**

כאשר קורטיקוסטרואידים, לרבות טריאמצינולון אצטונייד, ניתלים במשך תקופה ממושכת או במינונים גבוהים לאורך תקופת ארכואה, יתכנו תופעות לוואי בעקבות ספיגה של התרופה בגוף (למשל, הייצור התקין של הורמוניים סטרואידיים יכול להיות מושפע). הסיכוי שתופעות לוואי אלו יקרו עם קורטיקוסטרואידים הנלקחים

בתרסיס לאף נמור בהשוויה לנטיית קורטיקוסטרואידים דרך הפה (לדוגמה טבליות). פנה לרופא אם אתה חווית תופעת לוואי כלשהי. ראה גם פרק 4 "טופעות לוואי".

#### **ניתוחים או תקופות לחוזות**

יתכן שהרופא ימליץ לך על מינון גבוה מהרגיל של תרופה זו בהתאם לשיקולים רפואיים. אם העלו לך את המינון, ספר לרופא אם אתה עומד לעבור ניתוח או מריגש לא טוב. זאת מכיוון שמינון גבוה מהתרופה הזה עלול לגרום ביכולת של הגוף לרפא אותך או להתמודד עם לחץ. אם זה קורה, הרופא עשוי להחליט שאתה זקוק לטיפול נוסף בתרופה אחרת.

#### **ילדים ומטופרים**

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים. השימוש ילדים ומטופרים מתחת לגיל 18 על פי מרשם רפואי.

#### **אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות**

אם אתה לוקחת, אם לקחת לאחרונה או אתה מתכוון לקחת תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם וטנספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

טרופות מסוימות עלולות להשיבר את ההשפעה של סטרונאצ AQ תרסיס לאף, והרופא עשוי לבקש שתתאייה במקבב הדוק אם אתה נוטל תרופות אלו (כולל תרופות מסוימות ל-HIV: ריטונאביר (zidovudine) וכוביסיטאט (cobicistat)).

#### **הירין והנקה**

אם את בהירין או מניקה, חשבת שאת עשויה להיות בהירין או מתכנתת הירין עליך להתייעץ עם הרופא או הרוקח טרם נטילת התרופה.

#### **היגיה ושימוש במכונות**

לא ידוע על השפעות שיש לסטרונאצ AQ תרסיס לאף על ניגזה או שימוש במכונות.

#### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

סטרונאצ AQ תרסיס לאף מכיל בנזלקוניום כלורי בכמות של 15 מ"ג בכל לחיצה. בנזלקוניום כלורי עלול לגרום לגירוי או נפיחות בთוך האף, במיוחד בשימוש ממושך.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא או הרוקח. התיעץ עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון או לאופן הטיפול בתרופה. תרופה זו פועלת רק אם משתמשים בה באופן סדרי. יתכן שייעברו 3-4 ימים עד שתתרגש הקלה בתסמיינים. לשימוש באף בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

#### **מטופרים מגיל 18:**

- 2 לחיצות בכל נחיר תוך כדי שאיפה עדינה, פעם ביום.
- לאחר שיש שיפור בתסמיינים של אלרגיה, להוריד את המינון לחיצת 1 בכל נחיר פעם ביום.
- אם התסמיינים לא נעלמים תוך 14 ימים, פנה לרופא או לרוקח.
- אין להשתמש בתרופה כל يوم במשך יותר מ-3 חודשים מבייל להתייעץ עם הרופא.

#### **ילדים מגיל שנתיים עד גיל 18: על פי מרשם רפואי**

- מתן התרופה יהיה בהשגתת מבוגר.

אין להשתמש בסטרונאצ AQ תרסיס לאף מעל 3 חודשים ילדים מתחת לגיל 12.

אין לתת לילדים ומטופרים מתחת לגיל 18 ללא הוראת רפואי.

אין לעبور על המנה המומלצת.

#### **כיצד להשתמש בתרסיס**

לפני השימוש בתרסיס לאף, קנח את האף בעדינות כדי לנוקות את הנחיריים.

## 1. הכנת הבקבוק


- הסר את המכסה הסגול על ידי משיכה למעלה



- נער את הבקבוק בעדינותות לפני השימוש

## 2. אם אתה משתמש בתרסיס בפהם ראשונה

- אחז און הבקבוק בצורה אנכית
- אחז און הבקבוק כר שקצתה המרסס ממך ולהאה
- מלא את המשאבה עם התרסיס על ידי לחיצה של קצתה המרסס כלפי מטה. זה נקרא אתחול
- לחץ ושחרר 5 פעמים
- עשה זאת עד ליצירת תרסיס אחד
- התרסיס עכשו מוכן לשימוש.



## 3. שימוש בתרסיס

- סגור נחיר אחד עם האצבע
- אחז און הבקבוק בצורה אנכית והכנס את קצתה המרסס לנחיר השני עמוק ככל האפשר, כל עוד נוח
- לר
- שאף פנימה דרך האף כשהפה סגור
- בזמן שאתה עושים את זה, לחץ על המרסס כדי לשחרר ריסוס אחד



## 4. לאחר מכן, נשוף החוצה דרך הפה

- בדoor על שלבים 3 ו-4 אם אתה צריך לרסס שוב באותו נחיר או בנחיר השני.

## 6. לאחר שימוש בתרסיס

- כדי לשמר על קצה המרסס נקי, נקה אותו בעדינות עם ממחטה נייר (טישו) נקי או מטפחת לאחר כל שימוש.
- החזר המכסה מעל קצה המרסס

**אם התקשיר לא היה בשימוש לעללה משכועים:**

- יש לבצע אתחול מחדש כדי למלא את קצה המרסס
- כאשר אתה מבצע זאת, אחוז את הבקבוק כך שקצה המרסס מפרק ולהלאה
- לאთחול, 100 פעם אחת באוויר לפני השימוש
- תמיד נער את הבקבוק בעדינות לפני השימוש



### ניקוי התרסיס

- אם המרסס אינו פועל, יתכן שקצתו חסום. **לעולם** אל תנסה לפתח את החסימה או להרחב את הנקב שבקצתה המרסס באמצעות סיכה או חפץ חד אחר, משומש שהדבר יגרום את מנגנון המרסס.

יש לנוקות את התרסיס לפחות לפחות פעמי שבוע. אפשר לנוקות אותו לעיתים קרובות יותר אם קצתו נסגרם.

### הוראות לניקוי התרסיס:



- הסר את המכסה
- משור החוצה בעדינות את קצה המרסס בלבד
- השרה את המכסה ואת קצה המרסס במים חמימים לכמה דקות



- שטוף מתחת זרם מי ברז קרימ
- נער את כל עופדי המים
- הנה לחלקם להתייבש באוויר



- החזר את קצה המרסס למקוםו
- אתחול את המרסס עד לייצור תרסיס אחד
- השתמש כרגיל

**אם השתמש בטיעות במינון גבוהה יותר**  
חשיבות ליטול תרופה בהתאם למינון המצוין על תווית רוקח או בהתאם להמלצת רופא. עליך להקפיד על המינון שהומלץ לך; מינון נמוך יותר או גבוהה יותר עלול להחמיר את התסמים.

הסבירות שמיינון יותר יגרום לביעיות היא נמוכה, עם זאת אם תיטול דרך הפה תכולה של בקבוק שלם אתה עלול לחוש אי-נוחות בבטן או במעי. פנה לרופא אם השתמש ביוטר סטרונאז AQ תרסיס לאף מהה שאותה צריכה.

**אם שכחת להשתמש בתרסיס**  
אם שכחת להשתמש בתרסיס זה בזמן הדרש, השתמש מיד כשאתה נזכר. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

**אם אתה מפסיק להשתמש בתרופה**  
אם אתה מפסיק את השימוש בתרופה, התסמים עלולים לחזור תוך כמה ימים.  
אם מופיעות תופעות לוואי כלשהן (תסמיני גמילה) לאחר הפסקה פתואמית לאחר שימוש ממושך, צור קשר עם הרופא. ראה פרק 4 "תופעות לוואי" למידע נוספת.

**אין ליטול תרופות בחושר!** בדוק את התווית ומהנה בכל פעם שאתה גוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.  
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

#### 4. **תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בסטרונאז AQ תרסיס לאף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמעשימים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

**הפסק את הטיפול בסטרונאז AQ תרסיס לאף ופנה מיד לרופא או לבית חולים אם:**  
אתה סובל מתגובה אלרגית לסטרונאז AQ תרסיס לאף. סימנים (שכיחות לא ידועה) עלולים לכלול פריחה, גרד, קשיים בבליעה או בנשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בלוע או בלשון.

תופעות לוואי שכיחות - תופעות שימושיות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:

- נזלת, כאב ראש, כאב גרון /או שיעול
- דימום מהאף
- דלקת/גירוי בדרכי הנשימה (דלקת סمفונות)
- צרבת או הפרעות בעיכול
- תסמים דמווי-שפעת (חום, כאבי שרירים, חולשה /או עייפות)
- בעיות בשיניים

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- גירוי ויובש בתוך האף
- גודש או סתיימה בסינוסים
- התעטשות
- שינויים בטעם וריח
- בחילה
- בעיות שינה, סחרחות, עייפות
- קוצר נשימה
- ירידת ברמת הקורטיזול בדם (ערך מעבדה)
- עכירות בעדשת העין (קטראקט), עליה בלחץ תוך עיני (גלאוקומה)
- טשטוש ראייה
- הפסקה פתואמית של קורטיקוסטרואידים לאחר שימוש ממושך עלולה להוביל לתסמיני גמילה כמו כאבי מפרקים, כאבי שרירים, רעד, ירידת במשקל, חרדה, אף דולף ודימום מהאף. עם זאת תסמים
- אליהם נדרים מאוד בהקשר של תרסיס קורטיקוסטרואיד לאף בהשוואה לקורטיקוסטרואידים הניטלים דרך הפה (למשל טבליות).

סטרונאז AQ תרסיס לאף עלול לגרום לנזק בחלק האמצעי שבתוכה האף (במחיצת האף) לאנשים מסוימים. שוחח עם הרופא או הרוקח על דאגותיך בנושא.

## **תופעות לוואי נספנות בילדים**

אם הילד שלך משתמש בתרופה זו, היא עלולה להפריע לקצב גידילתו. הרופא יצטרך לבדוק את גובהו באופן שגרתי ולהודיע את המיןון במידת הצורך. בנוסף, הרופא עשוי לשקל להפנות את הילד למומחה לילדים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואאי חממירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעלן, עלייך להתייעץ עם הרופא.

## **דיווח תופעות לוואי:**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעת לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת, יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא. אין להשתמש בתרופה אחרת תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**תנאי אחסון:** אין לאחסן מעל ל- 25°C.

לאחר הפתיחה הראשונה יש להשתמש בסטרונאז AQ תרסיס לאף תוך חודשים. אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולות הביתיות. התיעץ עם הרוקח כיצד יש להיפטר מתרופות שאין בשימוש עוד. עצדים אלו יסייעו לשמירה על הסביבה.

## **6. מידע נוסף**

### **נסוף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**

Glucose anhydrous, microcrystalline cellulose and carboxymethylcellulose sodium, disodium edetate, benzalkonium chloride, polysorbate 80, purified water, hydrochloric acid and sodium hydroxide (for pH adjustment).

### **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה**

תרחיף לריסוס באף. התרסיס מגע בבקבוק פלסטי לבן עם משאבה ועם מסס בקצת הבקבוק. על הבקבוק ישנו מכסה השומר על ניקיון המרסס ומונע ריסוס בשוגג. הבקבוק מכיל 120 מנות מדומות.

**שם בעל הרישום והיבואן וכתובתו:** פרמשלום בע"מ, רח' המלאכה 21, ראש העין 4809157.

מספר הרישום בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-28059-12-069.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.