

بطاقة معلومات
حول الأمان
للمتعالج

ريمسيما
120
ملغ/مل
تحت الجلد
إنفليكسيماب
(Infliximab)

أظهر هذه البطاقة
لكل طبيب
يشارك بعلاجك.

تحتوي بطاقة المعلومات
حول الأمان للمتعالج على
معلومات هامة حول الأمان،
عليك معرفتها
قبل بدء العلاج
بـ ريمسيما 120 ملغ/مل
تحت الجلد، وخلالها.

متعالج: _____

طبيب: _____

رقم الهاتف: _____

من المهم أن تكتب أنت وطبيبك
الإسم التجاري للدواء الذي
تلقاه وكذلك رقم التشغيل
للمقدار الدوائي.

اسم المستحضر:

رقم التشغيل: _____

تاريخ بدء العلاج بـ ريمسيما
120 ملغ/مل تحت الجلد:

تواريخ تلقي الدواء في الدورة
الحالية: _____

عندما تبدأ ببطاقة جديدة،
الرجاء إحتفظ هذه البطاقة لفترة
أربعة شهور إضافية، لقراءتها
بتمعن إذا دعت الحاجة.

إقرأ بتمعن "نشرة المستهلك"
لـ ريمسيما 120 ملغ/مل
تحت الجلد قبل أن تبدأ
بإستعمال هذا الدواء.

ريمسيما 120 ملغ/مل تحت
الجلد عبارة عن مستحضر
مشابه حيوي، لمعلومات إضافية
عن المستحضرات المشابهة حيويًا
يجب تصفح موقع وزارة
الصحة:

[https://www.health.gov.il/
UnitsOffice/HD/MTI/Drug
s/Registration/Pages/Bio
similar.aspx](https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/Bio-similar.aspx)

أطلب من طبيبك أن يوثق أدناه
نوع وتاريخ الفحص
(الفحوص) الأخير (الأخيرة)
للكشف عن السل الذي/التي
أجري/ت لك:

فحص: _____ / _____

تاريخ: _____ / _____

نتيجة: _____ / _____

قائمة تحسسات (آلرجيا)
معروفة:

قائمة أدوية إضافية تتناولها:

تلوّثات

قبل إستعمال ريمسيما

● إحك لطبيبك إذا كنت تعاني من أي تلوّث.

● من المهم جداً أن تحك لطبيبك إذا أصبت ذات مرة بمرض السل، أو إذا كنت على تماس قريب مع شخص مريض بالسل أو أصيب في الماضي بالسل. سيفحصك الطبيب للتأكد فيما إذا كنت مصاباً بالسل. أطلب من طبيبك أن يوثق على بطاقتك نوع وتاريخ الفحص (الفحوص) الأخير (الأخيرة) للكشف عن السل الذي/ التي أجري/ت لك.

● إحك لطبيبك إذا كنت مريضاً بالتهاب الكبد (هيباتيتيس) من نوع B أو إذا كنت على علم أو إذا كنت تشك بأنك حامل للفيروس المسبب لهذا المرض.

خلال العلاج ب ريمسيما

● بلغ الطبيب حالاً إذا كنت تعاني من علامات تلوّث. هذه العلامات تشمل سخونة، إرهاق، سعال (متواصل)، ضيق تنفس، إنخفاض الوزن، تعرق ليلي، إسهال، جروح، مشاكل في الأسنان، الشعور بحرقّة أثناء التبول أو علامات تشبه الإنفلوإنزا.

مشاكل في القلب

قبل إستعمال ريمسيما

● إحك للطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أياً كانت، مثل قصور القلب.

خلال العلاج ب ريمسيما

● بلغ طبيبك حالاً إذا كنت تلاحظ أعراض لمشكلة في القلب. هذه الأعراض تشمل ضيق في التنفس، إنتفاخ الرجلين أو تغيرات بنظم القلب.

الحمل واللقاحات

إذا تلقيت هذا الدواء خلال الحمل، فمن المهم إبلاغ الطاقم الطبي عن ذلك قبل أن يتلقى رضيعك أي لقاح. لا يجوز إعطاء "لقاح حي" لرضيعك خلال الـ 6 أشهر الأولى بعد الولادة. لا يجوز إعطاء رضيعك لقاح BCG (المخصص لمنع مرض السل)، خلال الـ 12 شهراً الأولى بعد الولادة.

من فضلك إحرص على إحضار قائمة بجميع الأدوية الإضافية التي تتناولها في كل زيارة لسدى أخصائي في المجال الطبي. احتفظ بهذه البطاقة معك لمدة أربعة أشهر بعد تلقيك آخر مقدار دوائي من ريمسيما. في حالة الحمل، احتفظي بالبطاقة لمدة 12 شهراً على الأقل بعد الولادة.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

إضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداجيس بواسطة العنوان التالي:

Padagis.co.il

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه البطاقة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.