

## כרטיסים מידע בטיחותי למטופל

# רמסימה 120 מ"ג/מ"ל תת-עוררי איןפליקסימאב (Infliximab)

**כרטיסים המידע הבטיחותי  
למטופל מכיל מידע  
בטיחותי חשוב שאתה  
צריך לדעת לפני תחילת  
הטיפול ברמסימה  
120 מ"ג/מ"ל תת-עוררי,  
ובמהלכו.**

מטופל: \_\_\_\_\_

רופא: \_\_\_\_\_

מספר טלפון: \_\_\_\_\_

חשוב שאתה והרופא שלך  
תרשימו את השם המסתורי של  
התרופة שאתה מקבל ואת  
מספר האצווה של המנה.  
שם התכשיר: \_\_\_\_\_

מספר אצווה: \_\_\_\_\_

**הציג את הCARTEIS זהה  
לכל רופא שמעורב  
בטיפול בך.**

## ziehominim

### לפני השימוש ברמסימה

- ספר לרופא שלך אם אתה סובל מזמן כלשהו.

- חשוב מאוד שתספר לרופא שלך אם אי פעם חלית בשחפת, או אם הייתה ברגע הקרוב עם מישחו שחולה קרוב עם שחלתו שכלה בשחפת בעבר. הרופא יבודק אותך כדי לראות אם יש לך שחפת. בקש מהרופא שלך שיתעד על היכרטיים שלך את סוג ותאריך הבדיקה(ות) האחרונה(ות) לגילוי שחפת שבוצעה/ו.

- ספר לרופא שלך אם אתה חולה בדלקת כבד (הפטיטיס) מסוג B או אם ידוע לך או אם אתה חדש שאתה נשא של הנגיף הגורם למחלת החאת.

## הריון וחיסונים

במהלך הטיפול עם רמסימה אם קיבלת תרופה זו במהלך ההריון, חשוב לידע עלך את ה策ות הרפואי לפני טיפולך. קוצר 'חיסון חי' לטינוקר במהלך 6 החודשים הראשונים לאחר הלידה. אין לתמוך לטינוקר חיסון BCG (המיועד למניעת שחפת), במהלך 12 החודשים הראשונים לאחר הלידה.

בבקשה הקפד להביא רשיימה של כל התרופות הננספות שהינן נוטל לכל ביקור אצל איש מקצוע בתחום הרופאה.

שמור את היכרטיים זהה איתך לפחות ארבעה חודשים אחרי שקיבלת את המנה האחרונה של רמסימה.

במקרה של הריון, שמרי את היכרטיים לפחות 12 חודשים לפחות לאחרות לאחר הלידה.

במהלך הטיפול עם רמסימה • דוח מיד לרופא אם אתה סובל מסימני זיהום. הסימנים האלה כוללים חום, עייפות, שיעול (מתמשר), קוצר נשימה, ירידה במשקל, הזעות לילה, שלשול, פצעים, בעיות בשיניים, תחרות צירבה בזמן מתן שתן או סימנים דמיי שפעת.

## בעיות לב

לפני השימוש ברמסימה • ספר לרופא אם אתה סובל מעבויות לב כלשהן, כגון אי ספיקת לב.

במהלך הטיפול עם רמסימה • דוח מיד לרופא שלך אם אתה מבחן בתסמינים של בעיה בלב. התסמינים האלה כוללים קוצר נשימה, התנפחות של הרגליים או שינוי בקצב הלב.