

בלנרפ

אבקה להכנת תמיסה מרוכזת לתמיסה לעירוי

BLENREP PT V5C 40593



כל מנה (קבוקון) מכילה:
בלנטמאב מפודוטין (belantamab mafodotin) 100 מ"ג

בנוסף לעלון, לתשיר בלנרפ קיימים מדריכים למטופל אשר יתנו לך על ידי הרופא. מדריכים אלה מכילים מידע בטיחותי חשוב שעליך לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול עם בלנרפ ולפעול על פיו. יש לעיין במדריכים אלה ובעלון לצרכן בטום תחילת השימוש בתרופה. יש לשמור את המדריכים לעיון נוסף במידת הצורך.

לרשימת החומרים הבטלי פעילים והאלרגיים בתכשיר, ראה סעיף 2 – מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו **בטרם תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.

תרופה זו נרשמה בעורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצעם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

בלנרפ מותווה לטיפול במבוגרים עם מיאלומה נפוצה חזרת או עמידה, אשר קיבלו לפחות ארבעה טיפולים קודמים, כולל נוגדן חד שבטי נוגד CD38, מעכב פרוטאזום ואימונומודולטור. **קבוצה תרופוטיית:** תרופות אנטי-נאופלסטיות, נוגדנים חד שבטיים, נוגדן מוצמד לתרופה. בלנרפ מגיל החומר הפעיל בבלנטמאב מפודוטין, נוגדן חד שבטי המחובר לחומר אנטי-סרטני אשר יכול להרוג את תאי המיאלומה הנפוצה. הנוגדן החד שבטי הינו חלבון שנועד למצוא את תאי סרטן המיאלומה הנפוצה בגופך ולהיקשר אליהם. ברצו שנקשר אל התאים הסרטניים, החומר האנטי-סרטני משתחרר והורג את תאי הסרטן.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בבלנרפ אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לבלנטמאב מפודוטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
- ספר לרופא אם אתה חושב שמצב זה חל עליך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

בעיות עיניים

בלנרפ עשויה לגרום ליושב בעיניים, לטשטוש ראייה או לבעיות עיניים אחרות. עליך לעבור בדיקת עיניים על ידי רופא עיניים לפני תחילת הטיפול ובמהלך שלוש המנות הבאות של בלנרפ. הרופא עשוי לבקש בדיקות עיניים נוספות במהלך הטיפול עם בלנרפ. גם אם הראייה שלך נראית תקינה, חשוב כי תעבור בדיקת עיניים במהלך הטיפול עם בלנרפ, מאחר שחלק מהשינויים עלולים להתרחש ללא תסמינים וייתכן שיחגלו רק בבדיקת עיניים.

–**אל תשתמש בעדשות מגע** במהלך הטיפול. הרופא יבקש ממך להשתמש בטיפות עיניים הנקראות *דמעות מלאכותיות ללא חומר משמר* לפחות 4 פעמים ביום במהלך הטיפול על מנת להרטיב ולסכן את עיניך. יש להשתמש בהן בהתאם להנחיות.

אם אתה מבחין בשינויים בראייה, הרופא עשוי להפסיק זמנית את הטיפול בבלנרפ או להתאים את המינון, או לבקש ממך לראות רופא עיניים. הרופא עשוי להחליט להפסיק את הטיפול בבלנרפ.

–**פנה לרופא אם יש לך טשטוש ראייה או בעיות עיניים** אחרות.

חברות ודימומים חריגים

בלנרפ יכול להוריד את מספר תאי הדם הנקראים טסיות, אשר עוזרים לדם להיקשר.

תסמינים של ספירה נמוכה של טסיות (טרומבוציטופניה) כוללים:

- חבורות חריגות מתחת לעור
- דימום ממושך יותר מהרגיל לאחר בדיקה
- דימום יבקש או מהחניכיים אם דימום רציני יותר
- הרופא יבקש ממך לבצע בדיקת דם לפני תחילת הטיפול, ובאופן קבוע במהלך הטיפול בבלנרפ, כדי לבדוק כי רמת הטסיות שלך תקינה.
- ספר לרופא** אם אתה מפתח דימומים או חבורות חריגים, או כל תסמין אחר המדאיג אותך.

תגובות לטרופות לעירוי

בלנרפ ניתן בסטרופ (עירוי) לוריד. חלק מהאנשים המקבלים עירוי מפתחים **תגובות הקשורות לעירוי**.

–ראה "תגובות הקשורות לעירוי" בסעיף 4.

אם הייתה לך בעבר תגובה לעירוי של בלנרפ או לכל תרופה אחרת:

–**ספר לרופא או לאחות** לפני שאתה מקבל עירוי נוסף.

בעיות ריאות (דלקת ריאות)

דלקת ריאות ומסכת חיים של הריאות התרחשה אצל חלק מהאנשים שקיבלו בלנרפ.

תסמינים אפשריים של דלקת ריאות כוללים:

- קוצר נשימה
- קאב בחזה
- הופעה חדשה או החמרה של שיעול
- הרופא עשוי להחליט להשהות או להפסיק את הטיפול בבלנרפ במידה יש לך תסמינים אלה.

–**ספר לרופא** אם אתה מפתח בעיות ריאות או תסמינים כלהם הקשורים לנשימה שמדאיגים אותך.

ילדים ומתבגרים

התרופה איננה מיועדת לשימוש בילדים או במתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון, פוריות והנקה

היריון ופוריות

אם את בהריון או מניקה, חושבת שיתכן שאת בהריון או אם את מתכננת הרות:

–**התייעץ עם הרופא** לפני שאת מקבלת תרופה זו.

אם את אישה שעלולה להיכנס להריון:

- הרופא יבקש ממך לבצע בדיקת הריון לפני שאת מתחילה טיפול עם בלנרפ.
- עליך להשתמש **באמצעי מניעה** יעיל במהלך הטיפול ובמשך 4 חודשים לאחר המנה האחרונה של בלנרפ.
- לנשים המטופלות בתרופה זו המעונינות להביא ילדים לעולם, מומלץ לפנות ליעוץ פוריות ולשקול אפשרות להקפיא ביציות/עוברים לפני תחילת הטיפול.

אם אתה גבר שעלול להביא ילד לעולם:

- עליך להשתמש **באמצעי מניעה** יעיל במהלך הטיפול ובמשך 6 חודשים לאחר המנה האחרונה של בלנרפ.
- לגברים המטופלים בתרופה זו מומלץ להקפיא ולאחסן דגימות זרע לפני תחילת הטיפול.

הנקה

אם להניק במהלך הטיפול ובמשך 3 חודשים לאחר קבלת המנה האחרונה של בלנרפ.

לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם. דברי עם הרופא בנוגע לכך.

נהיגה ושימוש במכוונות

בלנרפ עשוי לגרום לבעיות בראייה העולות להשפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונות.

–**אל תנהג או תפעיל מכוונות** אלא אם כן אתה בטוח כי הראייה שלך לא נפגעה. דבר עם הרופא אם אינך בטוח.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

בלנרפ מכיל נתרן

התכשיר מכיל פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) ל-100 מ"ג מנה, לכן ניתן לומר כי הוא למעשה נטול נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. הרופא יקבע את המינון המדויק של בלנרפ. המינון מחושב על פי משקל הגוף שלך.

המינון המקובל הוא בדרך כלל 2.5 מ"ג בלנרפ לקילוגרם משקל גוף. הוא ניתן על ידי רופא או אחות בטפטון לוריד (עירוי תוך ורידי) כל שלושה שבועות.

אין לעבור על הנהג המומלצת.

לפני העירוי, עליך לשים טיפות עיניים לסיכון והרטבה (דמעות מלאכותיות ללא חומרים משמרים). עליך להמשיך להשתמש בטיפות העיניים לפחות 4 פעמים ביום בזמן שאתה מקבל טיפול בבלנרפ.

אם קיבלת מינון גבוה מדי של בלנרפ התרופה ניתנת על ידי רופא או אחות. במקרה הלא סביר שיינתן לך יותר מדי (מנת יתר), הרופא יבדוק אותך לתופעות הלוואי.

אם מפספסים מנה של בלנרפ

חשוב כי תגיע לכל התורים, על מנת להבטיח כי הטיפול עם ספספת תור, קבע תור נוסף בהקדם האפשרי.

–**צור קשר עם הרופא** או בית החולים בהקדם האפשרי על מנת לקבוע תור חדש.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבלנרפ עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ללא תסבול מאף אחת מהן.

תגובות הקשורות לעירוי

מספר אנשים יכולים לחוות תגובות דמויות אלרגיה כאשר הם מקבלים עירוי.

אלה מתפתחות לרוב בתוך מספר דקות או שעות, אך עשויות להתפתח עד 24 שעות לאחר הטיפול.

התסמינים כוללים:

- הסמקה
- צמרמורת
- חום
- קשיי נשימה
- קצב לב מהיר
- ירידה בלחץ הדם

–**פנה לעזרה רפואית באופן מיידי** אם אתה חושב שיש לך תגובה.

תופעות לוואי אחרות

ספר לרופא או לאחות אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד: אלה עלולות להופיע **ביותר מ-1 מכל 10 אנשים**

- בעיות עיניים, כולל הפרעה בקרנית העין (קרטופתיה), טשטוש ראייה ויושב בעיניים

–**קרא את המידע** תחת "בעיות עיניים" בסעיף 2 בעלון זה.

- ספירה נמוכה של תאי דם הנקראים טסיות אשר עוזרים לקרשים הדם (טרומבוציטופניה), הגורמת לחבורות ודימומים חריגים

–**קרא את המידע** תחת "חבורות ודימומים חריגים" בסעיף 2 בעלון זה.

- זיהום בריאות (דלקת ריאות – פניאמוניה) חום
- ספירה נמוכה של תאי דם אדומים, הנושאים חמצן בדם (אנמיה), הגורמת לחולשה ולעייפות
- ספירה נמוכה של תאי דם לבנים בדם (לימפופניה, לוקופניה, נויטרופניה)
- רמות חריגות בדם של אנזימים המעידים על בעיות בכבד (אספרטאט אמינוטרנספראז, גמא גלוטמילטרנספראז)
- בחילה
- תחושת עייפות
- שלשול.

תופעות לוואי שכיחות: אלה עלולות להופיע **בעד 1 מכל 10 אנשים**

- 2 התקררות או תסמינים דמויי התקררות, כגון שיעול, נזלת או כאב גרון
- הקאה
- רמות חריגות של קראטין פוספוקינאז
- רגישות לאור (פוטופוביה)
- גירוי בעיניים

שחן הנראה מוקצף או מבעבע המעיד על רמה גבוהה של חלבון בשחן (אלבומינוריה).

תופעות לוואי לא שכיחות: אלה עלולות להופיע **בעד 1 מכל 100 אנשים**

- פצעים בעיניים, ייתכן שיחד עם זיהום (דלקת כיבית וזיהומית בקרנית).

תופעות לוואי ששכיחות אינה ידועה (שכיחותן טרם נקבעה): לא ניתן להעריך את השכיחות מהמידע הקיים

- דלקת ריאות (פנאמוניה)
- ירידה ברגישות של קרנית העין (היפותזיה של הקרנית).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופות" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן במקרר (בין 2°C ל-8°C).

אין להשליך תרופות בליבוי או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד לרוקח תרופות שאינן בשימוש. צעדים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם: Trehalose dihydrate, trisodium citrate dihydrate, citric acid, polysorbate 80, disodium edetate dihydrate.

ראה גם סעיף 2 בעלון – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
- בלנרפ הינו אבקה לבנה עד צהובה בבקבוקון זכוכית עם פקק גומי ומכסה פלסטיק הניתן להסרה. כל אריית קרטון מכילה בבקבוקון אחד.

- בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה.
- יצרן: גלקסוסמיתקליין מניזפוטריאג S.p.A, פארמה, איטליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 168-62-36882
- לשם הפספוט ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך ביוני 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות. סימני המסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.

©2023 קבוצת החברות של GSK או הזכייין שלה.

The following information is intended for healthcare professionals only:

Step-by-step instructions for use and handling, reconstitution, and administration

The name of the administered product should be clearly recorded. It is recommended to record the batch number as well.

Preparation of solution for infusion

BLENREP is a cytotoxic anticancer medicinal product. Proper handling procedures should be followed. Use aseptic technique for the reconstitution and dilution of the dosing solution.

The recommended dose of BLENREP is 2.5 mg/kg administered as an intravenous infusion once every 3 weeks.

Calculate the dose (mg), total volume (mL) of solution required and the number of vials needed based on the patient's actual body weight (kg).

Reconstitution

1. Remove the vial(s) of BLENREP from the refrigerator and allow to stand for approximately 10 minutes to reach room temperature.

2. Reconstitute each vial with 2 mL of water for injections to obtain a concentration of 50 mg/mL. Gently swirl the vial to aid dissolution. Do not shake.

3. Visually inspect the reconstituted solution for particulate matter and discoloration. The reconstituted solution should be a clear to opalescent, colourless to yellow to brown liquid. Discard the reconstituted vial if extraneous particulate matter other than translucent to white proteinaceous particles is observed.

Dilution Instructions for Intravenous Use

1. Withdraw the necessary volume for the calculated dose from each vial.

2. Add the necessary amount of BLENREP to the infusion bag containing 250 mL of sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) solution for injection. Mix the diluted solution by gentle inversion. The final concentration of the diluted solution should be between 0.2 mg/mL to 2 mg/mL. DO NOT SHAKE.

3. Discard any unused reconstituted solution of BLENREP left in the vial.

If the diluted solution is not used immediately, it may be stored in a refrigerator (2°C to 8°C) for up to 24 hours prior to administration. If refrigerated, allow the diluted solution to equilibrate to room temperature prior to administration. The diluted solution may be kept at room temperature (20°C to 25°C) for a maximum of 6 hours (including infusion time).

Administration Instructions

1. Administer the diluted solution by intravenous infusion over a minimum of 30 minutes using an infusion set made of polyvinyl chloride or polyolefin.

2. Filtration of the diluted solution is not required. However, if the diluted solution is filtered, polyethersulfone (PES) based filter is recommended.

Disposal

Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

BLENREP PT V5C 40593