

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

اسم المستحضر وشكله

دكتارين™ جل للفم

المادة الفعالة وتركيبها:

ميكونازول 20 ملغ/غرام

Miconazole 20 mg/g

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر - انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء غير مخصص للرضع دون عمر 6 أشهر أو للرضع الذين لم يتطور لديهم منعكس البلع بشكل كافٍ بسبب خطورة الإختناق.

عليك إستعماله بشكل صحيح. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمت أو لم تتحسن علامات المرض (الأعراض).

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج ومنع فطر الفم وجهاز الهضم العلوي (الحنجرة، المريء، المعدة، الأمعاء).

الفصيلة العلاجية: مضاد فطري، من مشتقات الإيميدازول.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أيلرجي) لـ ميكونازول، لأدوية مشابهة مضادة للفطريات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لقائمة المركبات الإضافية، انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

- كنت تعاني من أي مرض في الكبد.

- لدى الرضع دون عمر 6 أشهر أو لدى الرضع الذين لم يتطور لديهم منعكس البلع بشكل كافٍ بسبب خطورة الإختناق.

- كنت تتناول إحدى الأدوية التالية:

- تيرفينادين، أستيميزول وميزولاستين (أدوية لحمى العلف والحساسية).

- سيزاپرید (دواء لعلاج مشاكل هضمية معينة).

- أدوية لخفض الكوليسترول مثل سيمفاستاتين ولوفالستاتين.

- ميدازولام (الذي يؤخذ عن طريق الفم) وتريازولام (أدوية لعلاج القلق وإضطرابات النوم).

- پيموزيد وسيرتنيدول (أدوية لعلاج الإضطرابات الذهانية).

- كينيدين ودوفيتيليد (أدوية لعلاج مشاكل نظم القلب).

- أدوية معينة لعلاج الشقيقة مثل قلويات الإرچوت.

لا تستعمل الدواء إذا إنطبق عليك واحد مما ذكر أعلاه. إذا لم تكن واثقاً، راجع الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

في حال سد الجل الممر في الحنجرة، فقد يسبب ذلك الإختناق للرضع والأطفال.

دكتارين جل للفم هو عبارة عن مادة لزجة، الأمر الذي يسمح له بالبقاء في الفم لأطول وقت ممكن.

هام: عليك التأكد من أن الجل لا يسد حنجرة الطفل، الأمر الذي قد يسبب إختناق الطفل. من أجل ذلك يجب إتباع وسائل الحذر المفصلة:

- يجب وضع الجل في الجزء الأمامي من الفم ولا يجوز أبداً وضعه في الجزء الخلفي للحنجرة.
- قسم المقدار الدوائي المطلوب إلى أجزاء صغيرة. لا يجوز أبداً وضع كامل المقدار الدوائي في فم الطفل دفعة واحدة.
- إدهن/ي الجل على المناطق المصابة في الفم (بقع بيضاء) بواسطة إصبع نظيفة ووفقاً لتعليمات الطبيب.
- إذا كنت مرضعة، لا تضعي أبداً الجل على حلمة الثدي لعلاج رضيعك.

فحوص الدم

إذا كنت تتناول أدوية لتمبيح الدم (أدوية مضادة للتخثر) أو فينيتوئين (دواء للصرع)، قد يرغب الطبيب بفحص نسب الأدوية في دمك بواسطة فحص دم.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

لا يجوز إستعمال دكتارين جل للفم سوية مع الأدوية التالية:

- أدوية ضد حمى العلف أو الحساسية - تيرفينادين، أستيميزول وميزولاستين.
- سيزابيريد، دواء مخصص لعلاج مشاكل هضمية معينة.
- أدوية لخفض الكوليسترول مثل سيمفاستاتين ولوفاستاتين.
- ميدازولام (يؤخذ عن طريق الفم) وتريازولام، أدوية لعلاج القلق وإضطرابات النوم.
- بيموزيد وسيرتندول، أدوية لعلاج الإضطرابات الذهانية.
- أدوية تعالج مشاكل نظم القلب، كيندين ودوفيتيليد.
- أدوية معينة لعلاج الشقيقة مثل قلويات الإرچوت.

لا تبدأ العلاج بـ دكتارين جل للفم وعليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تتناول إحدى الأدوية المدونة أعلاه.

بالاشتراك مع أدوية معينة قد تكون هناك حاجة لمتابعة أو تغيير المقدار الدوائي لـ دكتارين جل للفم أو للدواء الإضافي، قل للطبيب قبل التناول أو إذا كنت حالياً تتناول إحدى الأدوية التالية:

- أدوية ضد تخثر الدم مثل وارفارين.
- أدوية لعلاج فيروس الإيدز، مثل مثبطات الإنزيم پروتيار (HIV protease inhibitors) مثل ساكوبينافير.

- أدوية معينة لعلاج السرطان مثل بوسولفان، دوسيتاكسيل ومجموعة أدوية المعروفة بـ "القليادات الفينكا".
 - أدوية التي تعمل على القلب والأوعية الدموية المسمة حاجبات قنوات الكالسيوم مثل ديهيدروبيريدينات وفيراباميل.
 - سيكلوسپورین، تاکرولیموس وسیرولیموس التي تعطى عادة بعد زرع الأعضاء.
 - فینیتوئین وکاربامازپین لعلاج الصرع.
 - آفینتانيل للألم.
 - أدوية مهدئة معينة لعلاج القلق أو صعوبات النوم مثل بوسپيرون، أليپرازولام، بروتیزولام أو میدازولام بالإعطاء داخل الوريد.
 - ریفابوتین للسل.
 - میتیل پریدنیزولون، دواء يعطى عن طريق الفم وبالحقن لعلاج الإلتهابات.
 - ایبیاستین، دواء لعلاج الحساسية (الأیرجیا).
 - ریبوکسیستین، دواء لعلاج الإكتئاب.
 - أدوية تعطى عن طريق الفم لعلاج السكري مثل سولفونیل اوریا مثل کلورپروپامید وچلینکلامید.
 - سیلادینافیل، دواء لعلاج العجز الجنسي لدى الرجال.
 - ترمیمیتریکسات، دواء يستعمل لعلاج نوع معين من التهاب الرئتين.
 - سیلوستازول أو دیسوپیرامید، أدوية تعمل على القلب والأوعية الدموية.
- قل للطبيب قبل التناول أو إذا كنت حالياً تتناول إحدى الأدوية أعلاه. الأمر الذي يمكن أن يغير العلاج.
لا يجوز بدء العلاج بدواء جديد بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي مقدماً.

الحمل والإرضاع

- إذا كنت في فترة الحمل أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملاً، يجب إبلاغ الطبيب الذي يقرر فيما إذا كان مسموح لك إستعمال الدواء.
- إذا كنت مرضعة يجب إبلاغ الطبيب الذي يقرر فيما إذا كان مسموح لك إستعمال الدواء. إذا كنت مرضعة، لا يجوز أبداً أن تضعى الجل على حلمة الثدي لمعالجة رضيعك.

السياقة وإستعمال الماكنات

من غير المحمّل أن يؤثر دكتارين جل للفم على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي دكتارين جل للفم على 0.00785 غرام كحول (إيثانول) في كل 1 غرام، الذي يساوي بالقيمة 0.00785 ملغ/ملغ (0.785%w/w). الكمية في 1 غرام تساوي بقيمتها أقل من 1 ملليلتر أو 1 ملليلتر نبيذ. هذه الكمية الصغيرة من الكحول في هذا الدواء لن يكون لها تأثيرات ملحوظة.
 - طعم برقال وطعم كاكاو
- يحتوي هذا الدواء على طعم البرقال (يحتوي: citral, citronellol, linalool, geraniol, d-limonene) وطعم الكاكاو (يحتوي: benzyl alcohol, benzyl benzoate) اللذان قد يسببان ردود فعل تحسسية.

يحتوي هذا المستحضر الطبي على 0.000000017 ملغ بنزيل بنزوات في كل مقدار دوائي أقصى منفرد لشخص بالغ (10 مل جل للفم). قد يؤدي بنزيل بنزوات إلى تهيج موضعي طفيف.

- **كحول بنزيلي**

يحتوي هذا الدواء على 0.000000285 ملغ كحول بنزيلي في كل مقدار دوائي أقصى منفرد لشخص بالغ (10 مل جل للفم). قد يؤدي الكحول البنزيلي إلى ردود فعل تحسسية.

يرتبط الكحول البنزيلي بخطورة حدوث أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك مشاكل في التنفس (تسمى "متلازمة الدهاث") لدى الأطفال الصغار.

إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة، يجب إستشارة طبيبك أو الصيدلي. لأن، كميات كبيرة من الكحول البنزيلي يمكن أن تترافق في جسمك وقد تؤدي إلى أعراض جانبية (يسمى "حماض إستقلابي").

إذا وجد لديك مرض كلوي، يجب إستشارة طبيبك أو الصيدلي. ذلك، لأن كميات كبيرة من الكحول البنزيلي يمكن أن تترافق في جسمك وقد تؤدي إلى أعراض جانبية (يسمى "حماض إستقلابي").
قد يؤدي الكحول البنزيلي إلى تهيج موضعي طفيف.

- يحتوي دكتارين جل للفم على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) لكل مقدار دوائي، أي أنه فعلياً "حالٍ من الصوديوم".

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

- لفتح الأنفية يجب تحرير الغطاء بتدويره ووخر الجزء الذي يسد الأنفية، بواسطة الواخز الموجود في أعلى الغطاء.

- للإستعمال عن طريق الفم فقط.

- لا يجوز بلع الجل فوراً، بل يجب إبقاؤه في الفم لأطول فترة زمنية ممكنة وبذلك نسمح للدواء بالبقاء على تماس مع الفم لوقت مطول، من ثم البلع.

- إذا كان التلوث في الفم فقط، ضع الجل على المنطقة الملوثة بواسطة إصبع نظيف.

- إذا وجدت لديك أسنان إصطناعية قم بإخراجها في الليل وتغريشها بواسطة دكتارين جل للفم. الأمر الذي يمنع تلوثها هي أيضاً.

- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

- يجب إستعمال الدواء بعد وجبة الطعام.

- إذا كنت تعطي الجل لطفل أو رضيع فوق عمر 6 أشهر، تأكد من عدم وجود خطورة إختناق عن طريق تقسيم المقدار الدوائي المطلوب لأجزاء صغيرة - لا يجوز مطلقاً وضع كامل المقدار الدوائي دفعة واحدة في فم الطفل.
يجب وضع الجل في الجزء الأمامي من الفم. لا يجوز أبداً وضع الجل في الجزء الخلفي من الحنجرة.

مقدار الدواء يتعلق بنوع الفطر وبمكانه.

المقدار الدوائي الإعتيادي لعلاج فطر الفم والحنجرة:

الأطفال فوق عمر السنين والكبار: ½ ملعقة قياس صغيرة (2.5 مل) من الجل، 4 مرات في اليوم، بعد وجبات الطعام.
الأطفال بعمر 6 أشهر حتى عمر سنين: ¼ ملعقة قياس صغيرة (1.25 مل) من الجل، 4 مرات في اليوم، بعد الوجبات.
يجب تقسيم المقدار الدوائي المطلوب إلى أجزاء صغيرة، ووضعها على المنطقة المصابة بواسطة إصبع نظيف.

المقدار الدوائي لعلاج فطر المعدة والأمعاء يحدد من قبل الطبيب فقط.

يجب مواصلة العلاج أسبوعاً على الأقل بعد زوال الأعراض السريرية. الأمر الذي يمنع عودة الأعراض.
يجب مراجعة الطبيب في حال إستمرار الأعراض.
لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

هذا الدواء غير مخصص للرضع دون عمر 6 أشهر أو لدى الرضع الذين لم يتطور لديهم منعكس البلع بشكل كافٍ بسبب خطورة الإختناق.

يجب الحرص على قياس المقدار الدوائي بملعقة قياس صغيرة أو بكأس صغيرة خاصة، قطرة والخ.
يجب الإمتناع عن ملامسة الدواء للعينين.

تناول مقدار دوائي مفرط قد يسبب تقيؤات وإسهال.
إذا تناولت أنت أو تناول طفلك بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر، توجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً. تناول المقدار الدوائي التالي في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال دكتارين جل لل Flem قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

توقف عن إستعمال دكتارين جل لل Flem وتوجه إلى الطبيب فوراً إذا لاحظت واحد مما يلي. من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي:
- إنتفاخ مفاجئ للوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة؛ صعوبة في البلع؛ شرى (urticaria) ومشاكل في التنفس (وذمة وعائية، رد فعل إستهدافي)؛ تهيج شديد، إحمرار الجلد أو حويصلات على سطح الجلد. قد تكون هذه علامات لرد فعل تحسسي شديد.

- مشاكل خطيرة في الجلد التي تشمل تقرش و/أو طفح مع ثبور صغيرة متقطعة (يتراافق بسخونة) أو حويصلات على الجلد، الفم، العينين والأعضاء التناسلية (toxic epidermal necrolysis or Stevens-Johnson Syndrome).

- دوار، طفح منتشر، صفير أو صعوبات في التنفس.

- إذا كنت تتناول أدوية ممیعة للدم (مضادات التخثر)، مثل وارفارين: أنزفة أو كدمات غير متوقعة، رعاف، سعال دموي،

دم في البول، براز أسود كالزفت أو تقيؤ على شكل حبيبات القهوة.

راجع الطبيب إذا لاحظت العرض الجانبي التالي حيث أن شيوعه غير معروف:

طفح مع بثور متقيحة (acute generalised exanthematous pustulosis)

أعراض جانبية شائعة:

جفاف الفم، غثيان، تقيؤ، إنزعاج في الفم، إرتداد محتوى المعدة إلى المريء، طعم غريب للمستحضر في الفم

أعراض جانبية غير شائعة:

فقدان المذاق أو شعور شاذ في المذاق

أعراض جانبية التي تظهر في أوقات نادرة:

إختناق

إسهال

التهاب الكبد (hepatitis)

آلام في الفم

تغير لون اللسان

طفح يترافق بحوصلات/بثور مليئة بالقيح (acute generalised exanthematous pustulosis)

إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية تلك، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك التوجه فوراً إلى الطبيب أو الصيدلي.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر

للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين الجل في علبته الأصلية.

يجب التخزين دون 30 درجة مئوية.

لا يجوز إستعمال المستحضر بما يتجاوز 3 أشهر من فتحه لأول مرة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Glycerol, purified water, pregelatinized potato starch, ethanol 96%, polysorbate 20, sodium

saccharin, cocoa flavor, orange flavor.

يحتوي المستحضر على:

Sodium saccharin 1.00mg/g

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة -

دكتارين جل للفم متوفّر بأنبوبة تحتوي على 40 غرام جل أبيض متGANس، خالٍ من السكر، بطعم البرتقال. مرفقة لعلبة المستحضر ملعقة بلاستيكية صغيرة ذات 5 مل، وفيها علامة خط الـ 2.5 مل.

صاحب الإمتياز وعنوانه: جيبي - سي هيلث كير م.ض.، كيبوتس شفافيم 6099000، إسرائيل

إسم المنتج وعنوانه: يانسن فارماسيتيكا N.V، بيرز، بلجيكا

تم إعدادها في حزيران 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 20857-08-038

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.