

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية (مستحضرات)-1986
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط.

أجيستن أقراص للمص

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص للمص على كلوتريمازول 10 ملغ (Clotrimazole 10 mg)

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضرات - انظر لفقرة 6 في النشرة وفي البند 2 "معلومات مهمة حول قسم من مكونات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة للدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك لا تعطيه للآخرين، وهو قد يضرهم حتى لو بدا أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر 3 سنوات. عليك أن تستخدم المستحضر وفقاً لتعليمات في بند الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

عليك مراجعة الطبيب في حال تفاقم علامات المرض (الأعراض) بعد 7 أيام.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

للعلاج الموضعي بثقولات داء المبيضات التي تم تشخيصها في جوف الفم والبلعوم. كعلاج وقائي للتقليل من شيع حالات داء المبيضات في جوف الفم والبلعوم (oropharyngeal candidiasis) لدى معالجين لديهم خلل في وظيفة جهاز المناعة سببه علاج كيميائي. علاج بالإشعاعات. علاج سنترونيدي ببيضاض الدم، أورام صلبة (solid tumors) وزراعة كلية.

الفصلية العلاجية: مضاد للإلتهاب للعلاج الموضعي في الفم.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة كلوتريمازول أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

• أجيستن أقراص للمص غير مخصصة لعلاج ثلوث فطري جهازى.
• لا يجوز استعمال هذا الدواء لفترة طويلة دون استشارة طبيب.

• يمكن أن يؤثر الدواء على نتائج فحوص وظائف الكبد.

قبل العلاج بأجيستن أقراص للمص أخبر الطبيب إذا

• كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.

• كنت بفترة حمل أو رضاعة.

الفحوص والمتابعة

يوصى بإجراء فحوص دورية لوظائف الكبد، خاصة لدى المرضى الذين يعانون حالياً من مرض في الكبد.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أحك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على سكر في كل قرص للمص يوجد 888 ملغ دكستروز الذي يمكن أن يضر بالأسنان.

إذا قال لك الطبيب أنه يوجد لديك عدم تحلل لسكريات معينة،

استشر الطبيب قبل تناول الدواء.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك الاستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة وكيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لعلاج ثلوث حالي بدء المبييضات: قرص واحد للمص خمس مرات في اليوم لمدة أسبوعين.

كعلاج وقائي لدى مرضى يعانون من تثبيط لجهاز المناعة: قرص واحد للمص ثلاث مرات في اليوم خلال فترة العلاج الكيميائي أو إلى أن ينخفض مستوى السيترونيديت إلى مقدار دوائي يومي ثابت. لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

القرص مخصص للمص- أتركه لينوب ببطء في الفم لمدة 30-15 دقيقة تقريباً - لا يجوز البلع.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصيات الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا تتناول الأدوية بالعمى! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال أجيستن أقراص للمص قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية من الجازز ألا تعاني أيًا منها.

بالإضافة للتأثيرات المرغوبة للدواء قد تظهر خلال فترة استعماله أعراض جانبية مثل: غثيان، تغير، الشعور بإزعاج في الفم، حكة.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

يمكن أن يؤثر الدواء على نتائج فحوص وظائف الكبد (انظر تحذيرات خاصة في البند 2).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو

عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق التصفح للرابط

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة إلى ذلك، بالإمكان التبليغ لشركة باداجيس على العنوان التالي: Padagis.co.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
• لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
• بعد الفتح لأول مرة بالإمكان استعمال المستحضر حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المسجل على ظهر العبوة، لكن ليس بعد انقضاء هذا التاريخ.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Dextrose, microcrystalline cellulose, povidone, magnesium stearate.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة: فنية تحتوي على 70 قرص للمص دائري ومسطح الشكل بلون أبيض حتى أوف وايت (off-white) مطبوع عليها "pad 0107" بجانب واحد.

• صاحب الامتياز والمستورد: وكالات باداجيس إسرائيل م.ض، شارع ركيفت 1، شوهام، 6085000.

• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومية في وزارة الصحة: 15913-34540

تم تحريرها في أيار 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.
• من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

02.05.2023