

עלון לצרכן לפי תקנות הרקחים (תכשירים) התשמ"א – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אקטיק®**200 מיקרוגרם אקטיק**®**400 מיקרוגרם אקטיק**®**600 מיקרוגרם אקטיק**®**800 מיקרוגרם אקטיק**®**1200 מיקרוגרם אקטיק**®**1600 מיקרוגרם אקטיק**®

טבליות דחוסות על מקל למתן דרך ריריות חלל הפה

הרכב: כל טבליה דחוסה על מקל מכילה:

אקטיק 200 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 200 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 200 mcg)
אקטיק 400 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 400 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 400 mcg)
אקטיק 600 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 600 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 600 mcg)
אקטיק 800 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 800 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 800 mcg)
אקטיק 1200 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 1200 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 1200 mcg)
אקטיק 1600 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 1600 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 1600 mcg)

לימדה על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגיינים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש יך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו שגמה לטיפול בעורבך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

בנוסף לעלון, להכשיר אקטיק קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליו לדעת, לפני התחלת הטיפול ובעת המהלך בטרם באקטיק לפעול על פי. יש לעיין בכרטיס המידע הבטיחותי למטופל ולספק לצרכן טבליות מחוללות משימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

תרופות ממשפחת האופיואידים עלולות לגרום להתמכרות, בעיקר בשימוש ממושך, והינן גובלות וסופגניאל לשימוש לרעה ולדאוי למינון יתר. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית או לעילום למוות. זרע הינן מריח את שם התרופה, המינון הנחשב לוקח, תדירות המתן, משך הטיפול, תופעות הלוואי והסיכונים הפוטנציאליים. מידע נוסף אודות הסיכון לתלות והתמכרות ניתן למצוא בקישור: <p>https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf</p>

נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת הבנזודיאזינים, תרופות אחרות המדכאות מערכת עצבים מרכזית (כולל סמים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושת ישנוניות מעוקה, קשי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ומוות.

1. למה מיועדת התרופה?

אקטיק נועד לטיפול בכאב מתפרץ בחולי סרטן מבוגרים ומתבגרים מגיל 16 ומעלה שכבר נטלים תרופות אופיואידיות אחרות לשיכון כאבים מתמשכים, ושגופם התרגל לטיפול (סבליות לאופיואידים).

קבוצה תרפיטית

משני כרכים מקבוצת האופיואידים (נרקוטיקה).

כאב מתפרץ הוא כאב פתאומי נוסף, המתרחש בתאום, על אף נטילת התרופות הרגילות שלך לשיכון כאבים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

• איןך משתמש באופן קבוע בתרופה האופיואידית שנרשמה עבורך (כגון קודאין, פנטניל, הידרומורפון, מורפין, אוקסיקודון, פתידין), כל יום לפי לוח זמנים קבוע, במשך שבוע לפחות, לשיכון כאבים מתמשכים. אם אינך משתמש בתרופת אלו **אין ליטול אקטיק**, מאחר והדבר עלול להגדיל את הסיכון לכך שהנשימה תהיה איטית ו/או שטחית באופן מסוכן, או אפילו לגרום להפסקת הנשימה.
• אתה גרש (אלרגי) לפנטניל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).

• אתה נוטל מעכב מונואמיין אוקסידאז (MAOIs) (תרופות לטיפול בדיכאון חמור) או נטלת אותם בשבועיים האחרונים (סודים סעיף 2 תחת "לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם"):
• אתה נוטל תרופה המכילה סודיום אוקסיבאט (sodium oxybate).
• אתה סובל במעיות נשימה חמורות או במעיות ריאה חמורות העלות בחסימה ריאתית.
• אתה סובל מכאב קצר טווח (כגון כאב הנובע מפציעות, ניתוח, כאבי ראש או מירגרות), שאינו כאב מתפרץ.
• אתה שותמם אקטיק אם אחד מהמצבים המפורטים לעיל רלוונטי עבורך. אם אינך בטוח, היוועץ ברופא שלך או ברוקח לפני שימוש בתרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

במהלך הטיפול באקטיק יש להמשיך להשתמש בתרופה האופיואידית לשיכון הכאבים המתמשכים הנובעים מהסרטן. שימוש חוזר באקטיק עלול לגרום לכך שהתכשיר יהיה פחות יעיל (אתה מתרגל אליו) או לגרום לך להיות תלוי בו. הרופא שלך יעקוב אחר הסימנים למצבים אלו.

לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם:

• עדיין אינך מאוזן עם תרופה אופיואידית אחרת לכאבים מתמשכים (מסביב לשעון) של מחלת הסרטן.

• אתה חולה במחלה המשפיעה על הנשימה שלך (כגון אסטמה, צפוצפים או קוצר נשימה).
• אתה סובל מחבלת ראש או מאובדן הכרה כלשהו.
• יש לך בעיות בלב, במיוחד קצב לב איטי.
• יש לך בעיות כבדב או בכליות – הן ישיפיעו על אופן פירוק התרופה בגופך.
• יש לך לחץ דם נמוך כתוצאה מכמות נמוכה של נוזלים במחזור הדם.
• יש לך סוכרת.

• אתה מעל גיל 65 – ייתכן שתצטרך מינון נמוך יותר. כל העלות מינון תיבחן בהזריות רבה על ידי הרופא שלך.
• אתה נוטל תרופה ממשפחת הבנזודיאזינים (ראה סעיף 2 תחת "תגובות בין תרופתיות"). שימוש בבנזודיאזינים עלול להגביר את הסיכון להופעת תופעות לוואי חמורות כולל מוות.
• אתה משתמש בתרופות נוגדות דיכאון או תרופות אנטי פסיכיות (מעכבי ספיגה חוזרת סלקטיביים של סרטונין [SSRIs], מעכבי ספיגה חוזרת של סרטונין ונוראפינפרין [SNRIs], מעכב מונואמיין אוקסידאז [MAOIs]; ראה סעיף 2 תחת "אין להשתמש בתרופה אם" ותחת "תגובות בין תרופתיות"). שימוש בתרופות אלו יחד עם אקטיק **כול להוביל למצב שעלול להיות מסכן חיים הנקרא "תסמונת סרטונין"** (ראה סעיף 2 תחת "תגובות בין תרופתיות").
• השתמשמ לרעה או התמכרת לאופיואידים או תרופות אחרות, לאלכוהול או סמים לא חוקיים.
• פיתחת בעבר, במהלך שימוש בשימוש באופיואידים, אי פסיקת יותרת הכליה (מצב בו בלוטות יותרת הכליה אינן מייצרות מספיק הורמונים) או חוסר בהרומני מין (חוסר באנדורגונים) (ראה סעיף 2 תחת "תופעות לוואי חמורות").
• אתה צורך אלכוהול; אנא ראה סעיף "שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול".

הרופא שלך יצטרך לבדוק אותך לעיתים קרובות יותר אם:

• אתה או מישהו ממשפחתך השתמש לרעה או התמכר לאלכוהול, לתרופות מרשם או לסמים לא חוקיים ("התמכרות").
• אתה מעשן.
• יש לך או היו לך בעבר בעיות במצב הרוח שלך (דכאון, חרדה או הפרעת אשיות) או שטופלת בעבר על-ידי פסיכיאטר במחלות נפש אחרות.

במהלך הטיפול באקטיק היוועץ ברופא אם:

• אתה חווה כאב או רגישות מוגברת לכאב (היפראלגיה) אשר אינו מגיב למינון גבוה יותר של התרופה כפי שנרשם על ידי הרופא שלך.
• יש לך סימנים של עששת. אקטיק מכלי כ- 2 גרם סוכר; שימוש בתוך עלול להגביר את הסיכון לעששת שעלולה להיות חמורה. חשוב לטפל היטב בשיניים במהלך הטיפול באקטיק.
• אתה חווה שילוב של התסמינים הבאים: בחילה, הקאה, חוסר תיאבון, עייפות, חולשה, סחרחורת ולחץ דם נמוך. הופעת תסמינים אלו יחד עלולה להעיד על מצב שעלול להיות מסכן חיים הנקרא כשל יותרת הכליה – במצב זה בלוטות יותרת הכליה אינן מייצרות מספיק הורמונים.
• אקטיק עלול לגרום להפרעות נשימה הקשורות לשינה כגון קושי לנשום בזמן השינה (אפנאה-זום נשימה) לרומח חמצן נמוכות בדם (היפוקסמיה). התסמינים יכולים לכלול הפסקות נשימה בזמן השינה, התעוררות לילית כתוצאה מקוצר נשימה, קושי בשימור לשינה או ישנוניות יתר במהלך היום. אם אתה או אדם אחר מבין בתסמינים אלו, פנה אל הרופא שלך. ייתכן שהרופא שלך ישקול להפחית את מינון התרופה.
• שימוש חוזר ונשנה של אקטיק עלול לגרום לתלות ולשימוש לרעה בתרופה דבר שעלול להוביל ללקיחת מנת יתר מסכנת חיים. אם אתה חושש שפתחת תלות באקטיק, חשוב מאד שתתייעץ עם הרופא שלך.

פנה לעזרה רפואית מיידת אם:

• אתה חווה תסמינים כגון קושי בנשימה או סחרחורת, נפיחות של הלשון, השפתיים או הגרון במהלך השימוש באקטיק. אלו עלולים להיות תסמינים מוקדמים לתגובות אלרגיות חמורות (אנפילקטיס/ריגישות יתר, ראה סעיף 2 תחת "תופעות לוואי חמורות").

ילדים ומתבגרים

אקטיק אינו מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

תגובות בין תרופתיות

אל תשתמש בתרופה וספר לרופא או לרוקח אם:

• אתה נוטל תכשירי פנטניל אחרים שנרשמו לך בעבר לכאב מתפרץ. אם אתה עדיין מחזיק בחלק מתכשירי פנטניל אלה בבית עליך להיוועץ ברוקח לגבי אופן השמדתם.
• אתה נוטל תרופות מקבוצת מעכבי מונואמיין אוקסידאז (MAOIs) (תרופות לדיכאון חמור) או נטלת אותם בשבועיים האחרונים (ראה סעיף 2 תחת "אין להשתמש בתרופה אם" ותחת "לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם").
• **אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:
• תרופות הרגעה כמו בנזודיאזינים או תרופות דומות – שימוש בו זמני עם אקטיק מעלה את הסיכון לשינוניות, קשיים בנשימה (דיכוי נשימה), תרדמת ועלול להיות מסכן חיים. לכן רק אם אפשריות טיפול אחרות אינן אפשריות, שימוש משולב ילקח בחשבון.
• אם הרופא שלך יחליט על טיפול משולב, המינון ומשך הטיפול יוגבלו על ידו.
• ספר לרופא על כל תרופות הרגעה שאתה נוטל (לדוגמא כדורי שינה, תרופות לטיפול בחרדה, תרופות מסוימות לטיפול בתגובות אלרגיות (אנטי-היסטמינים) או תרופות הרגעה אחרות), יש למלא את הרואות הרופא בקפידה. מומלץ שתסביר להכריים ולקרובים שלך איך לזהות את הסימנים והתסמינים שתוארו לעיל. צור קשר עם הרופא שלך כאשר אתה חווה תסמינים כאלה.
• תרופות מסוימות להרפיית שרירים לדוגמא בלוקפון, דיאזפאם (ראה גם "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

• תרופות העלולות להשפיע על פירוק אקטיק בגופך, כגון ריטובניר או תרופות אחרות המסייעות לטיפול בחיזום HIV, תרופות אחרות המכונות [SSRIs], מעכבי ספיגה חוזרת של סרטונין, איטראקונזול, או פלורמינז (משמשות לטיפול בחיזוםים פטרייתיים), טרולינדומיצין, קליתרומיצין, או אריטרומיצין (תרופות לזיהומים חיידקיים) ותרופות המכונות "משפעלי CYP3A4" כגון ריפמפיצין או ריפאבונין (תרופות לזיהומים חיידקיים), קרבזמפין, פנטבריסטאל או פניטאון (תרופות המשמשות לטיפול בכרכוסים).
• אוגם מסוימים של משככי כאבים חזקים הנקראים אגוניסטים חלקיים/אנטגוניסטים כגון בורנורפיין, לבופרון ופנטאסוין (תרופות לטיפול בכאב). אתה עלול לחוות תסמונת גמילה (בחילה, הקאה, שלשול, חרדה, צמרמורת, רעד והזעה) במהלך השימוש בתרופות אלו.
• משככי כאבים מסוימים המיועדים לשיכון כאב עצבי (גפנטין ופרגבלין).
• תכשירים רפואיים הסרטוניגריים המשמשים לטיפול בדיכאון (תרופות נוגדות דיכאון כגון: מעכבי ספיגה חוזרת סלקטיביים של סרטונין [SSRIs], מעכבי ספיגה חוזרת של סרטונין ונוראפינפרין [SNRIs] או תרופות אנטי פסיכיות). שימוש בתרופות אלו יחד עם אקטיק יכול להוביל למצב שעלול להיות מסכן חיים הנקרא "תסמונת סרטונין" (ראה סעיף 2 תחת "לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם" ו"אין להשתמש בתרופה אם"), התסמינים של תסמונת סרטונין יכולים לכלול שינויים במצב נפשי (כגון אי-שקט, הזיות ותרדמת) והשפעת אחרות כגון חום גוף מעל 38°C, עלייה בקצב הלב, לחץ דם אל יציב, התעצמות רפלקסים, קשיון שרירים, חוסר קואורדינציה ו/או תופעות במערכת העיכול (כגון בחילה, הקאה, שלשול). הרופא ישקול האם אקטיק מתאים עבורך.

אם אתה לוקח את ניתוח הדורש הרדמה מלאה היוועץ ברופא.

שימוש בתרופה ומזון ושתיה

ניתן ליטול אקטיק לפני או אחרי ארוחות, אבל אין להשתמש במהלך הארוחות.

• ניתן לשתות מעט מים לפני נטילת אקטיק על מנת להרטיב את הפה, אבל אין לשתות או לאכול דבר בזמן השימוש באקטיק.

• אין לשתות מיץ אשכוליות במהלך השימוש באקטיק מאחר והדבר עלול להשפיע על פירוק התרופה בגוף.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול במהלך השימוש באקטיק. הדבר עלול להגביר את השכיחות לתופעות לוואי חמורות כולל מוות.

היריון והנקה

אם את בהריון או מיניקה, חושבת שיתכן בהריון או מתכננת היריון, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

היריון

אין להשתמש בתרופה במהלך ההריון אלא בהוראת הרופא שלך. אם נעשה שימוש ממושך באקטיק במהלך ההיריון, קיים סיכון להופעת תסמיני גמילה אצל הילוד שעלולים להיות מסכני חיים אם לא יזוהו ויטופלו על ידי הרופא (ראי סעיף 4 תחת "תופעות לוואי ששיכותנן אינה ידועה").

אין להשתמש באקטיק במהלך הלידה מאחר ופנטניל עלול לגרום לקשיי נשימה ביילוד.

הנקה

פנטניל יכול להיות מופרש בחלב אם ועלול לגרום לתופעות לוואי בתינוק יונק. אין להשתמש באקטיק אם את מיניקה. אל תתחילי בהנקה עד לפחות 5 ימים מהמנה האחרונה של אקטיק.

נהיגה ושימוש במכוונת

התרופה עלולה להשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש בכלים או במכוונת. היוועץ ברופא האם בטוח עבורך לנהוג או להשתמש בכלים או במכוונת במשך השעות הראשונות לאחר שימוש באקטיק. אין לנהוג או להפעיל מכוונת אם אתה מרגיש ישנוני או מסוחרר, יש לך שטטשו ראייה או ראייה כפולה או אם יש לך קושי להתרכז.

חשוב שתדע כיצד אתה מגיב לאקטיק לפני נהיגה או שימוש בכלים או במכוונת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

• אקטיק מכיל סוכרוז. אם הרופא שלך אמר לך שיש לך אי סבילות לסוגים מסוימים של סוכר, היוועץ ברופא לפני השימוש באקטיק. אקטיק עלול להזיק לשיניים.
• אקטיק מכיל גלוקוז. כל טבליה מכילה כ- 1.89 גרם גלוקוז. אם יש לך סוכרת, עליך לקחת זאת בחשבון. אם הרופא שלך אמר לך שיש לך אי ביולות לסוגים מסוימים של סוכר, היוועץ ברופא לפני השימוש באקטיק. אקטיק עלול להזיק לשיניים.
• תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

כאשר תתחיל לראשונה להשתמש באקטיק, הרופא יקבע יחד אתך את המינון המתאים לשיכון הכאב המתפרץ.

חשוב מאוד שתשתמש באקטיק בדיוק כפי שהרופא הורה לך.

• אין לשנות את המינונים של אקטיק או של תרופות אחרות לכאב על דעת עצמך. שינוי במינון חיב להירשם ולהיבדק על ידי הרופא.

• אם אינך בטוח לגבי המינון המתאים או אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש בתרופה עליך לפנות לרופא.

כיצד התרופה נוספת בגופך

כאשר אתה ממקם את הטבליה בפוך:

• הטבליה מתמוססת והחומר הפעיל משתחרר. התהליך אורך כ- 15 דקות.

• החומר הפעיל נספג דרך רריות חלל הפה אל תוך מחזור הדם.

שימוש בתרופה באופן זה מאפשר ספיגה מהירה, כלומר התרופה תשכך את הכאב המתפרץ במהירות.

במהלך התאמת המינון

במהלך השימוש באקטיק אתה אמור להתחיל להרגיש הקלה מסוימת באופן מהיר. עם זאת, במהלך התאמת המינון ששולט בכאב מתפרץ, ייתכן של תחושה הקלה מספקת בכאב 30 דקות לאחר תחילת השימוש ביחידת אקטיק אחת (15 דקות נמוים יחידת אקטיק בפוך). במקרה זה, ייתכן שהרופא יאפשר לך להשתמש ביחידת אקטיק שנייה באותו החוזק עבור אותו אירוע של כאב מתפרץ. אין להשתמש ביחידה שנייה אלא בהוראת הרופא בלבד. בשום אופן אין להשתמש ביותר משתי יחידות לטיפול באירוע בודד של כאב מתפרץ. במהלך התאמת המינון, ייתכן שתצטרך להחזיק ביתרן יותר מחוזק אחד של אקטיק. עם זאת, יש לשמור דך יחידות כחזק בחזק שהינן צריך, על מנת למנוע אפשרות של בלבול או מינון יתר. היוועץ ברוקח כיצד להשליך את היחידות שאינך זקוק להן.

בכמה יחידות יש להשתמש

לאחר שנמצא המינון המתאים יחד עם הרופא שלך, השתמש ביחידה אחת עבור אירוע של כאב מתפרץ. פנה לרופא אם המינון של אקטיק שקבע עבורך אינו משכך את הכאב המתפרץ במשך מספר אירועים רצופים של כאב מתפרץ. הרופא יחליט אם יש צורך לשנות את המינון. עליך לספר מייד לרופא אם אתה משתמש באקטיק יותר מ- 4 פעמים ביום, כיוון שיתכן שיש צורך בשינוי משטר הטיפול שלך. ייתכן שהרופא ישנה את הטיפול בכאב המתמשך שלך. כאשר החשב המתמשך נמצא תחת שליטה, הרופא ישקול שינוי במינון של אקטיק. אם הרופא שלך חושש שפיתחת רגישות מוגברת לכאב קשקשורה לאקטיק (היפראלגיה), ייתכן שהוא ישקול הפחתה במינון של אקטיק (ראה סעיף 2 תחת "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"). להשגת הקלה מיטבית, ספר לרופא על הכאב שלך וכיצד אקטיק משפיע עליך. על מנת לשנות את המינון במידת הצורך.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

פתיחת האריזה – כל יחידה של אקטיק אטומה באריזת מגנשית (בליטר) נפרדת. פתח את אריזת המגנשית כאשר אתה מוכן להשתמש באקטיק, אל תפתח אותה מראש:

• מקם את המספריים קרוב לקצה של יחידת האקטיק וחותרן את קצה המגנשית בהתאם לסימון שמופיע על גביה.



- משוך את תכסה המגנשית המודפס עד להפרדה מלאה שלו מהמגנשית.
- הוצא את יחידת אקטיק אמרית המגנשית והכנס אותה מייד לפה.

שימוש ביחידת אקטיק

- הנח את הטבליה בין הלחי לחניכיים.
- תוך שימוש במקל, סובב את הטבליה בחלל פוך, במיוחד לאורך הלחי. סובב את המקל לעיתים קרובות.



סיים את הטבליה תוך 15 דקות להשגת הקלה המירבית. אם תסיים מהר מדי – תבלע יותר מהתרופה ותשיג פחות תועלת מקלה בכאב המתפרץ.



אין לנגוס או ללעוס את הטבליה, על מנת למנוע רמות נמוכות יותר בדם של התרופה ופחות הקלה בכאב לעומת שימוש בהתאם להוראות.

אם מסיבה כלשהי אינך מסיים את כל הטבליה בכל פעם שיש לך כאב מתפרץ, ספר לרופא שלך על כך.

מה יחידות השימוש באקטיק?

אל תשתמש ביותר מ- 4 יחידות אקטיק ביום, לאחר מציאת המינון ששולט בעיולת בכאב שלך. אם אתה חושש שיתכן שתצטרך להשתמש ביותר מ-4 יחידות אקטיק ביום, ספר לרופא מייד.

כמה יחידות אקטיק יש ליטול?

אין להשתמש ביותר משתי יחידות לטיפול בכל אירוע בודד של כאב מתפרץ.

אם נטלת בטעות מנת יתר

• תופעות הלוואי השכיחות ביותר כתוצאה משימוש יתר: תחושת ישנוניות, בחילה או סחרחורת. אם אתה מחליח לחוש מסוחרר, בחילה או ישנוני מאוד לפני התמוססות מלאה של הטבליה, עליך להוציאה מהפה ולהזעיק עזרה.

• תופעת לוואי חמורה של אקטיק הינה נשימה איטית ו/או שטחית. היא עלולה להופיע במידה והמינון של אקטיק גבוה מדי או אם נטלת כמות גדולה מדי של אקטיק. במקרים חמורים, נטילת מינון גבוה עלולה לגרום לתרדמת (קומה). אם אתה מרגיש מאוד מסוחרר, ישנוני מאוד או נמש נשימות שטחיות או איטיות, עליך לפנות לעזרה רפואית באופן מייד.

אם בטעות ילד או מבוגר נטל אקטיק

אם אתה חושש שמישהו השתמש בטעות באקטיק, הזעק עזרה רפואית מייד. יש להשתדל להשאיר את האדם ערני (באמצעות קריאה בשמו ועל ידי תליית היד או הכתף שלו) עד העלת עזרה רפואית.

אם שכתה ליטול את התרופה

אם אתה עדיין סובל מהכאב המתפרץ, אתה יכול להשתמש באקטיק בהתאם להנחיות הרופא שלך. אם הכאב המתפרץ נפסק, אל תשתמש באקטיק עד לאירוע הבא. יש להתמיד בטיפול כפי שהמומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

עליך להפסיק את השימוש באקטיק כאשר אינך סובל עוד מכאב מתפרץ. עם זאת, אתה צריב להמשיך לקחת את התרופה האופיואידית הקבועה שלך לשיכון כאבים על מנת לטפל בכאב הסרטני המתמשך, כפי שהרופא שלך הנחה אותך. עם הפסקת השימוש באקטיק, ייתכן שתחווה תסמיני גמילה הדומים לתופעות הלוואי האפשריות של אקטיק. אם אתה חווה תסמיני גמילה או אם אתה מודאג בנוגע להקלת הכאב שלך, פנה לרופא שלך. הרופא יעריך אם אתה צריך תרופה להפחתת או העלמת תסמיני הגמילה.

אין ליטול תרופות בחושך! ברוך הוותית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקטיק עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם ייתבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
תופעות לוואי חמורות
• תופעות הלוואי החמורות ביותר: נשימה שטחית, לחץ דם נמוך ושוק (הלם).
עליך או על המטפל שלך להוציא את יחידת האקטיק מהפה שלך, ליצור קשר עם הרופא ולקרוא מייד לעזרה רפואית דחופה. אם אתה חש באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות – ייתכן שתצטרך טיפול רפואי דחוף:
• אתה נעשה מאוד ישנוני או חווה נשימה איטית ו/או שטחית.
• קשיי נשימה או סחרחורת, נפיחות של השפתיים, הלשון או הגרון העל