

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986**

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ريپالید 0.5 ملغ

ريپالید 1 ملغ

ريپالید 2 ملغ

أقراص

يحتوي كل قرص من ريباليد 0.5 ملغ على 0.5 ملغ ريباجلينيد (Repaglinide).

يحتوي كل قرص من ريباليد 1 ملغ على 1 ملغ ريباجلينيد (Repaglinide).

يحتوي كل قرص من ريباليد 2 ملغ على 2 ملغ ريباجلينيد (Repaglinide).

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية: انظر الفقرة 6 من النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص للمرأهقين دون عمر 18 سنة وللبار فوق عمر 75 سنة.

1) لأى غرض مخصص الدواء؟

1. ريباليد مخصص لعلاج السكري من النوع 2 لدى الكبار الذين لا يتم التحكم في نسب السكر المرتفعة لديهم بشكل كافٍ بواسطة الحمية الغذائية، إنقاص الوزن والنشاط البدني.

2. ريباليد مخصص لعلاج السكري من النوع 2 لدى الكبار، بالإشتراك مع ميتفورمين، لدى المتعالجين الذين لا يتم التحكم في السكري لديهم بشكل كافٍ بواسطة ميتفورمين وحده.

يجب البدء بالعلاج كمكمل للحمية الغذائية والنشاط البدني لخفض نسبة الجلوكوز في الدم بالنسبة لوجبات الطعام.

ريباليد هو دواء لعلاج السكري من النوع 2 يعطى فموياً، الذي يحتوي على ريباجلينيد الذي يساعد البنكرياس على إنتاج المزيد من الإنسولين وبذلك يخفض نسبة السكر (الجلوكوز) في الدم. السكري من النوع 2 هو عبارة عن مرض لا يفرز فيه البنكرياس ما يكفي من الإنسولين من أجل تنظيم نسبة السكر في الدم أو عندما لا يستجيب الجسم بشكل سليم للإنسولين الذي ينتجه.

أظهر ريباليد نجاعة في خفض نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يساعد على منع الإختلالات الناجمة عن السكري لديك.

الفصيلة العلاجية: أدوية لعلاج السكري من فصيلة الميچليتينيدات.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال ريباليد إذا:

• كنت حساساً (أيلرجي) للمادة الفعالة ريباجلينيد أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 من هذه النشرة).

• داء السكري الذي تعاني منه هو سكري من النوع 1 (السكري المتعلق بالإنسولين).

• كنت تعاني من ارتفاع نسب الحموضة في الدم (حماض سكري - حمامض خلوني).

• كنت تعاني من مرض كبدي خطير.

• كنت ت تعالج بـ چمفيريوزيل (دواء يستعمل لخفض نسب الشحوم المرتفعة في الدم).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ ريباليد، إحكٌ للطبيب:

إذا كنت تعاني من مشاكل في الأداء الوظيفي للכבד. لا يوصى بإستعمال ريباليد لدى المرضى الذين يعانون من مرض كبدي معتدل. لا يجوز إستعمال ريباليد في حال وجود مرض كبدي خطير.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الأداء الوظيفي للكلية. يجب إستعمال ريباليد بحذر.

إذا كنت مقبلاً على إجراء عملية جراحية جدية أو إذا عانيت في الآونة الأخيرة من مرض شديد أو من تلوث. في تلك الحالات قد يختل التوازن السكري.

إذا كان عمرك دون 18 سنة أو تجاوزت عمر 75 سنة فلا يوصى العلاج بـ ريباليد. لم تجرى أبحاث بالنسبة للعلاج بالدواء لدى هذه الفئات من العمر.

عليك إبلاغ الطبيب إذا كانت إحدى تلك الحالات تتطبق عليك. من الجائز أن العلاج بـ ريباليد غير مناسب لك. سوف يرشدك الطبيب حول كيفية التصرف.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز تناول هذا الدواء إذا كنت دون عمر 18 سنة.

إذا كنت تقاسي من هيبوچليکيميا (نسبة منخفضة للسكر في الدم):

من الجائز أن تقاسي من 'هيبو' (مختصر الكلمة هيبوچليکيميا: إنخفاض نسبة السكر في الدم) الذي قد يحدث في الحالات التالية:

• إذا كنت تتناول أكثر من اللازم من ريباليد.

• إذا كنت تقوم بنشاط بدني أكثر من المعتاد.

• إذا كنت تتناول أدوية إضافية أو إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلية (انظر في السياق البند "التدخلات/التفاعلات بين الأدوية").

العلامات التحذيرية لحالة هيبوچليکيميا، التي يمكن أن تظهر بشكل مفاجئ، ويمكن أن تشمل: تعرق بارد، جلد شاحب وبارد، صداع، تسرع النبض، غثيان، الشعور بجوع شديد، تغيرات مؤقتة في الرؤية، نعاس، ضعف وإرهاق شاذين، عصبية أو رجفة، قلق، إرتباك، صعوبات في التركيز.

إذا كانت نسبة السكر بدمك منخفضة أو إذا كنت تشعر باقتراب حدث هيبوچليکيميا فعليك تناول قرص چلوكوز (سكر) أو أي طعام أو شراب يحتوي على كميات كبيرة من السكر وبعد ذلك الخلود للراحة.

عند زوال علامات هيبوچليکيميا أو عند توازن نسب السكر في الدم، يجب مواصلة العلاج بـ ريباليد.

عليك إبلاغ الأشخاص المقربين إليك بأنك مريضاً بالسكري وفي حال مفاجئ (فقد الوعي) نتيجة حالة هيبوچليکيميا، يجب إضطرجاعك على الجانب وطلب مساعدة طبية في الحال. لا يجوز إعطاؤك طعام أو شراب إذا كنت فاقداً للوعي وذلك لتجنب الإختناق.

• إذا لم تعالج حالة هيبوچليکيميا شديدة، فهي قد تسبب ضرراً للدماغ (مؤقت أو دائم) لا بل الوفاة.

إذا كنت تعاني من حالة هيبوچليکيميا التي تسبب لك الإغماء أو من حالات كثيرة من هيبوچليکيميا، فعليك التحدث مع طبيبك.

من الجائز أن يحتاج الأمر لتغيير المقدار الدوائي من ريباليد أو إجراء تغيير في التغذية أو في النشاط البدني.

في حال إرتفاع نسبة السكر بدمك:

من الجائز أن تصبح نسبة السكر في الدم مرتفعة أكثر مما ينبغي (هيبرچليکيميا). يمكن أن تحدث حالة هيبرچليکيميا:

• إذا تناولت مقداراً دوائياً منخفضاً مما ينبغي من ريباليد.

• إذا وجد لديك تلوث أو سخونة.

• إذا كنت تأكل أكثر من المعتاد.

العلامات التحذيرية لحالة هيبرچليکيميا تظهر بالتدريج وتشمل: زيادة التبول، عطش، جفاف الجلد وجفاف الفم. عليك التحدث مع طبيبك.

من الجائز أن يحتاج الأمر لتغيير المقدار الدوائي من ريباليد أو إجراء تغيير في التغذية أو في النشاط البدني.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكٌ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

من الجائز أن تصبح نسبة السكر في الدم مرتفعة أكثر مما ينبغي (هيبرچليکيميا). يمكن أن تحدث حالة هيبرچليکيميا:

• إذا تناولت مقداراً دوائياً منخفضاً مما ينبغي من ريباليد.

• إذا وجد لديك تلوث أو سخونة.

• إذا كنت تأكل أكثر من المعتاد.

العلامات التحذيرية لحالة هيبرچليکيميا تظهر بالتدريج وتشمل: زيادة التبول، عطش، جفاف الجلد وجفاف الفم. عليك التحدث مع طبيبك.

من الجائز أن تحتاج إلى تغيير المقدار الدوائي من ريباليد أو إجراء تغيير في التغذية أو في النشاط البدني.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكٌ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

من الجائز أن تصبح نسبة السكر في الدم مرتفعة أكثر مما ينبغي (هيبرچليکيميا). يمكن أن تحدث حالة هيبرچليکيميا:

• إذا تناولت مقداراً دوائياً منخفضاً مما ينبغي من ريباليد.

• إذا وجد لديك تلوث أو سخونة.

• إذا كنت تأكل أكثر من المعتاد.

العلامات التحذيرية لحالة هيبرچليکيميا تظهر بالتدريج وتشمل: زيادة التبول، عطش، جفاف الجلد وجفاف الفم. عليك التحدث مع طبيبك.

من الجائز أن تحتاج إلى تغيير المقدار الدوائي من ريباليد أو إجراء تغيير في التغذية أو في النشاط البدني.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكٌ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

من الجائز أن تصبح نسبة السكر في الدم مرتفعة أكثر مما ينبغي (هيبرچليکيميا). يمكن أن تحدث حالة هيبرچليکيميا:

• إذا تناولت مقداراً دوائياً منخفضاً مما ينبغي من ريباليد.

• إذا وجد لديك تلوث أو سخونة.

• إذا كنت تأكل أكثر من المعتاد.

العلامات التحذيرية لحالة هيبرچليکيميا تظهر بالتدريج وتشمل: زيادة التبول، عطش، جفاف الجلد وجفاف الفم. عليك التحدث مع طبيبك.

من الجائز أن تحتاج إلى تغيير المقدار الدوائي من ريباليد أو إجراء تغيير في التغذية أو في النشاط البدني.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكٌ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

من الجائز أن تصبح نسبة السكر في الدم مرتفعة أكثر مما ينبغي (هيبرچليکيميا). يمكن أن تحدث حالة هيبرچليکيميا:

• إذا تناولت مقداراً دوائياً منخفضاً مما ينبغي من ريباليد.

• إذا وجد لديك تلوث أو سخونة.

• إذا كنت تأكل أكثر من المعتاد.

العلامات التحذيرية لحالة هيبرچليکيميا تظهر بالتدريج وتشمل: زيادة التبول، عطش، جفاف الجلد وجفاف الفم. عليك التحدث مع طبيبك.

من الجائز أن تحتاج إلى تغيير المقدار الدوائي من ريباليد أو إجراء تغيير في التغذية أو في النشاط البدني.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكٌ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

من الجائز أن تصبح نسبة السكر في الدم مرتفعة أكثر مما ينبغي (هيبرچليکيميا). يمكن أن تحدث حالة هيبرچليکيميا:

• إذا تناولت مقداراً دوائياً منخفضاً مما ينبغي من ريباليد.

• إذا وجد لديك تلوث أو سخونة.

• إذا كنت تأكل أكثر من المعتاد.

العلامات التحذيرية لحالة هيبرچليکيميا تظهر بالتدريج وتشمل: زيادة التبول، عطش، جفاف الجلد وجفاف الفم. عليك التحدث مع طبيبك.

من الجائز أن تحتاج إلى تغيير المقدار الدوائي من ريباليد أو إجراء تغيير في التغذية أو في النشاط البدني.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكٌ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

من الجائز أن تصبح نسبة السكر في الدم مرتفعة أكثر مما ينبغي (هيبرچليکيميا). يمكن أن تحدث حالة هيبرچليکيميا:

• إذا تناولت مقداراً دوائياً منخفضاً مما ينبغي من ريباليد.

• إذا وجد لديك تلوث أو سخونة.

• إذا كنت تأكل أكثر من المعتاد.

العلامات التحذيرية لحالة هيبرچليکيميا تظهر بالتدريج وتشمل: زيادة التبول، عطش، جفاف الجلد وجفاف الفم. عليك التحدث مع طبيبك.

من الجائز أن تحتاج إلى تغيير المقدار الدوائي من ريباليد أو إجراء تغيير في التغذية أو في النشاط البدني.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكٌ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

من الجائز أن تصبح نسبة السكر في الدم مرتفعة أكثر مما ينبغي (هيبرچليکيميا). يمكن أن تحدث حالة هيبرچليکيميا:

• إذا تناولت مقداراً دوائياً منخفضاً مما ينبغي من ريباليد.

• إذا وجد لديك تلوث أو سخونة.

• إذا كنت تأكل أكثر من المعتاد.

العلامات التحذيرية لحالة هيبرچليکيميا تظهر بالتدريج وتشمل: زيادة التبول، عطش، جفاف الجلد وجفاف الفم. عليك التحدث مع طبيبك.

من الجائز أن تحتاج إلى تغيير المقدار الدوائي من ريباليد أو إجراء تغيير في التغذية أو في النشاط البدني.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكٌ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

من الجائز أن تصبح نسبة السكر في الدم مرتفعة أكثر مما ينبغي (هيبرچليکيميا). يمكن أن تحدث حالة هيبرچليکيميا:

• إذا تناولت مقداراً دوائياً منخفضاً مما ينبغي من ريباليد.

•

- كلوبيدوجريل (لمنع الخثارات الدموية)
- فينيتوئين، كاربامازيبين، فينوباربيتال (العلاج الصرع)
- هيبيريكوم (St. John's wort) (عشبة طبية، لعلاج الإكتئاب)

إستعمال ريباليد والطعام

يجب تناول ريباليد قبل وجبات الطعام الرئيسية.

إستعمال ريباليد وإستهلاك الكحول

يمكن للكحول أن يغير من قدرة ريباليد على خفض نسب السكر في الدم. إنتبه لعلامات حالة هيبوچليکيميا التي ذكرت أعلاه.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً، مرضعة أو تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، استشيري طبيبك قبل تناول الدواء. لا يجوز تناول ريباليد إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. لا تتناولين ريباليد إذا كنت مرضعة.

السيادة وتشغيل الماكينات

إن قدرتك على السيادة أو تشغيل الماكينات قد تتأثر إذا كانت نسبة السكر بدمك منخفضة أو مرتفعة. تذكر بأنك قد تعرض نفسك أو الأشخاص الآخرين للخطر. عليك إستشارة طبيبك بالنسبة لقدرتك على قيادة المركبة في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من تكرر حوادث هيبوچليکيميا.
- إذا كانت العلامات التحذيرية لحالة هيبوچليکيميا لديك قليلة أو غير موجودة بتاتاً.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

- المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو عادة 0.5 ملغ قبل كل وجبة طعام رئيسية. يجب تناول الأقراص مع كأس من الماء مباشرة قبل أو حتى 30 دقيقة قبل كل وجبة طعام رئيسية.

- يجب بلع القرص بشكله الكامل. لا تتوفر معلومات حول شطر أو سحق القرص.

- تتم ملائمة المقدار الدوائي من قبل طبيبك، حتى مقدار دوائي قدره 4 ملغ الذي يجب تناوله مع كأس من الماء مباشرة قبل أو حتى 30 دقيقة قبل كل وجبة طعام رئيسية. المقدار الدوائي الأعظمي الموصى به هو 16 ملغ لليوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا يجوز تناول أقراص أكثر مما أوصاك بها الطبيب.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت أكثر من اللازم من الأقراص فإن نسبة السكر بدمك قد تصبح منخفضة عن اللازم لدرجة حدوث حالة هيبوچليکيميا. أنظر الفقرة 2 "إذا كنت تقاسي من هيبوچليکيميا" بالنسبة لشرح هذه الحالة وطريقة معالجتها.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء

عليك أن تعرف بأن التأثير المرغوب به لن يحصل وقد يطرأ تفاقم على حالة السكري لديك. إذا دعت الحاجة لإجراء أي تغيير في العلاج، عليك إستشارة الطبيب أولاً.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال ريباليد، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ريباليد قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

حالة نقص سكر الدم (Hypoglycemia)

إن العرض الجانبي الأكثر شيوعاً هو حالة نقص سكر الدم التي يمكن أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 مستعملين (أنظر الفقرة 2 "إذا كنت تقاسي من هيبوچليکيميا"). ردود الفعل الإنخفاض السكري في الدم هي عادة ما تكون خفيفة حتى معتدلة، لكنها قد تتطور أحياناً لفقدان الوعي نتيجة حالة نقص سكر الدم أو سبات: في مثل هذه الحالة يجب تلقي مساعدة طبية في الحال!

حساسية

الحساسية هي نادرة جداً (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 مستعمل). علامات مثل إنفاس، صعوبات في التنفس، تسرع النبض، دوار وتعرق - جميعها يمكن أن تكون علامات لرد فعل إستهدافي. يجب الإتصال بالطبيب فوراً!

أعراض جانبية أخرى

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

- ألم في البطن

- إسهال

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

مرض قلبي إكليلي حاد (ليس بالضرورة متعلق بالعلاج بالدواء)

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

- تقيؤات

- إمساك

- تشوش الرؤية

- مشاكل خطيرة في الكبد

- خلل في الأداء الوظيفي للكبد

- ارتفاع نسبة إنزيمات الكبد في الدم

أعراض جانبية شيعها غير معروفة (أعراض لم يحدد شيعها بعد)

- فرط حساسية (على سبيل المثال: طفح، حكة جلدية، إحمرار الجلد، إنفاس الجلد)

- غثيان

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية

أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية:

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" (www.health.gov.il) الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (بليستر). يشير تاريخ عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il> بالإضافة لذلك، بالإمكان تبلیغ شركة پاداچيس بواسطة العنوان التالي: padagis.co.il

(5) كيفية تخزين الدواء

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روبية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على علبة الكرتون وعبوة اللويحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين

يجب التخزين في العلبة الأصلية دون 25 درجة مئوية.

لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه المجاري أو في القمامات المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجتها. إن إتخاذ هذه الوسائل يساعد في الحفاظ على البيئة.

شارع راكيفيت 1، شوهام.

تم إعدادها في آذار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ريپالید 0.5 ملغ: 159-05-34990

ريپالید 1 ملغ: 158-33936

ريپالید 2 ملغ: 158-18-33935

من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.