

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## לרקאנפריל טבע 10/10

## טבליות מצופות

## לרקאנפריל טבע 10/20

## טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה של **לרקאנפריל טבע 10/10** מכילה:
לרקנידיפין הידרוכלוריד 10 מ"ג ואנלפריל מלאט 10 מ"ג.

Lercanidipine hydrochloride 10 mg and Enalapril maleate 10 mg

כל טבליה של **לרקאנפריל טבע 10/20** מכילה:
לרקנידיפין הידרוכלוריד 10 מ"ג ואנלפריל מלאט 20 מ"ג.

Lercanidipine hydrochloride 10 mg and Enalapril maleate 20 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגיים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה.

**לרקאנפריל טבע אינה מיועדת לטיפול ראשוני ביתר לחץ דם.**

### 1. למה מיועדת התרופה?

- לרקאנפריל טבע 10/10** משמשת לטיפול ביתר לחץ דם במטופלים אשר לחץ הדם שלהם אינו ניתן לשליטה במידה מספקת על-ידי טיפול בלרקנידיפין בלבד.
- לרקאנפריל טבע 10/20** משמשת לטיפול ביתר לחץ דם במטופלים אשר לחץ הדם שלהם אינו ניתן לשליטה במידה מספקת על-ידי טיפול באנלפריל בלבד.

**קבוצה רפוטית:**

- אנלפריל שי"ך לקבוצת מעכבי אנזים המהפא אנגיוטנסין (ACE inhibitor).
- לרקנידיפין שי"ך לקבוצת חוסמי תעלות סידן.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (אנלפריל מלאט ו/או לרקנידיפין הידרוכלוריד) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").
- הייתה לך בעבר תגובה אלרגית לסוג תרופה הדומה לאלה שיש ב**לרקאנפריל טבע**, כלומר התופות הנקראות מעכבי ACE או חוסמי תעלות סידן.
- סבלת אי פעם מנפיחות של הפנים, הפה, השפתיים, הלשון או הגרון, שגרמה לקשיי בליעה או נשימה (אנגיודממה) בעקבות שימוש בתרופה מקבוצת מעכבי ACE או מסיבה לא ידועה או עקב סיבה תורשתית.
- אתה לוקח סקוביטריל/ואלסרטן, תרופה המשמשת לטיפול בסוג של אי ספיקת לב כרונית במבוגרים, מאחר שהסיכון לאנגיואדמה (נפיחות מהירה מתחת לעור באזורים כגון הגרון) עולה.
- אתה סובל מסוכרת או מפגיעה בתפקודי הכליה ואתה מטופל בתרופה להורדת לחץ דם שמכילה אליסקירן.
- את בהריון מעל ל-3 חודשים (עדיף להימנע משימוש ב**לרקאנפריל טבע** גם בתחילת ההריון - ראי סעיף "הריון ונקה").
- אתה סובל ממחלות לב מסימות: חסימת דרימת דם מהלב, אי ספיקת לב לא מטופלת, תעוקת חזה לא יציבה (אי נוחות בחזה במנוחה, או אי נוחות בחזה שמחמירה בהדרגה), בתוך חודש אחרי התקף לב.
- אתה סובל מבעיית חמורת לבכבד.
- אתה סובל מבעיית חמורת בכליות, או שאתה מטופל בדיאליזה.
- אתה נוטל תרופות המעכבות מטבוליזם כבדי כגון: תרופות נגד פטריות (כגון קטקונאזול, איטרקונאזול), אנטיביוטיקות ממשפחת הקטרוליזים (כגון אריתרומיצין, טרולידימוצין, קלריתרומיצין), תרופות נגד יורוסים (כגון ריטונאביר).
- אתה נוטל תרופה הנקראת ציקלוסופורין (מישמת לאחר השתלות, למניעת דחיית האיבר).
- אתה צורך אשכוליות או מיץ אשכוליות.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני טיפול בלרקאנפריל טבע, ספר לרופא אם:**
אתה סובל מלחץ דם נמוך (מתבטא בתסמינים כגון עיטפון או סחרחורת, במיוחד במעבר למצב עמידה).

- סבלת לאחרונה מהקאות חמורות או משלשולים.
- אתה נמצא תחת הגבלת מלח בתזונה.
- אתה סובל מבעייה בלב.
- אתה סובל ממצב שמערב את כלי הדם במוח.
- אתה סובל מבעיית בכליות (כולל השתלת כליה).
- ביעות אלו עשויות להוביל לרמות גבוהות של אשלגן בדם שעלולות להיות חמורות. ייתכן שהרופא יצטרך להתאים את מינון האנלפריל או לעקוב אחר רמת האשלגן בדם.
- אתה סובל מבעייה בכבד.
- אתה סובל מבעייה בדם כגון: רמה נמוכה או חוסר בתאי דם לבנים (ליוקופניה, אגרנולוציטוזיס), רמת טסיות נמוכה (טרומבוציטופניה) או ירידה בפסירת תאי הדם האדומים (אנמיה).
- אתה סובל ממחלת רקמת חיבור עם מידע של כלי דם (כגון זאבת אדמונית, דלקת פרקים שרגונית או טרשת עור [סקלרודרמה]). אתה מקבל טיפול לדיכוי המערכת החיסונית, אתה נוטל את התרופות אלופורינול או פרוקאבאמיד או שילוב שלשניהם של אלה.
- אתה מטופל שחור עור. אתה צריך להיות מודע לכך שמתופלים שחורי עור נמצאים בסיכון גבוה לפתח תגובה אלרגית שכוללת נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון עם קשיי בליעה או נשימה, בנטילת מעכבי ACE.
- יש לך סוכרת. עליך לנטר את רמת הסוכר בדם לרמות גלוקוז נמוכות, במיוחד במהלך החדש הראשון לטיפול. רמת האשלגן בדם עלולה גם היא להיות גבוהה.
- אתה לוקח תוספי אשלגן או תרופות אצורות אשלגן או מלחים שמכילים אשלגן.
- אתה מעל גיל 70.

אם אתה לוקח אחת מהתרופות הבאות, הסיכון לאנגיואדמה עלול לעלות:

- רסקודטריל, תרופה לטיפול בשלשולים.
- מושתלים ולסרטן (כגון טמסירולימוס, סירולימוס, אברולימוס).
- וילדגליפטין, תרופה המשמשת לטיפול בסוכרת.
- אם אתה לוקח אחת מהתרופות הבאות המשמשות לטיפול בלחץ דם גבוה:
- חוסמי רצפטור לאנגיוטנסין 2 (כגון: ואלסרטן, טלמיטרטן, אירביסרטן), במיוחד אם יש לך בעיות בלילות כתוצאה מסוכרת.
- אליסקירן.
- בידוק מועקב**

ייתכן שהרופא יבדוק את תפקודי הכליות שלך, לחץ הדם וכמות האלקטרוליטים (כגון אשלגן) בדם במשך תדירות זמן קבועים. בנוסף ראה בסעיף "אין להשתמש בתרופה אם".

**אם אתה עומד לעבור הליך רפואי**

אתה עומד לעבור אחת מהבאים, ספר לרופא

שאתה נוטל **לרקאנפריל טבע**:

- ניוחת או קבלת חומרי הרדמה (כולל אנל רופא שיניים).
- טיפול לסילוק כולסטרוול מהדם הנקרא LDL אפריס.
- טיפול להפחתת תגובה אלרגית לעקיצות דבורים או צרעות.

עליך לספר לרופא אם את חושבת שאת בהריון, עשויה להיכנס להריון או מניקה (ראי סעיף "הריון ונקה").

**לידים ומתנגבים**

ילדים ובמתגברים מתחת לגיל 18 שנים.

### תגובות בין תרופתיות

אין לקחת **לרקאנפריל טבע** בשילוב עם תרופות מסימות:

**אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה, או אם אתה עשוי לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי חזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** זאת מכיוון שלקיחת **לרקאנפריל טבע** בשילוב עם תרופות אחרות עלול לשנות את השפעת **לרקאנפריל טבע** או את השפעת התרופות האחרות, או שתופעות לוואי מסימות עלולות להופיע בתדירות גבוהה יותר.

במיוחד ספר לרופא או לרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות אחרות להורדת לחץ דם.
- תוספי אשלגן (כולל תחליפי מלח), משתנים אצרי אשלגן, תרופות אחרות שעלולות להעלות את רמת האשלגן בדם (כגון: טרימטופרים וקו-טרימוקסזול לטיפול בזיהומים הנגרמים מחיידק; ציקלוסופורין [מדכא מערכת החיסון, למניעת דחיית איבר מושתל]; הפרין, תרופה המשמשת לדילול הדם למניעת קרישים). ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".
- ליתיום (תרופה לטיפול בסוג מסוים של דיכאון).
- תרופות נגד דיכאון הנקראות נוגדי דיכאון טריציקליים.
- תרופות לבעיות נפשיות הנקראות אנטי פסיכויטות.
- תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות, כולל מעכבי COX-2 (תרופות להפחתת דלקת ולשיכון כאב).
- תרופות מסימות לשיכון כאב או לדלקת פרקים שרגונית כולל טיפול דבהב.
- תרופות מסימות לטיפול בשיעול ובהצטננות ותרופות להורדה במשקל המכילות מרכיב סימפטומיטי.
- תרופות לטיפול בסוכרת (כולל תרופות במתן דרך הפה ואינסולין).
- אסטמיזול או טרפנאדין (תרופות לטיפול באלרגיה).
- אמיודארון, כינידין או סוטאלול (תרופות לטיפול בדופק מהיר).
- פניטואין, פנובארביטאל או קרבמזפינ (תרופות לטיפול באפילפסיה).
- ריפמפיצין (תרופה לטיפול בשחפת).
- דידוקסין (תרופה לטיפול בבעיות בלב).
- מידאזולאם (תרופה להפרעות שינה).
- חוסמי בטא כגון מטופרולול (תרופה לטיפול בלחץ דם גבוה, באי ספיקת לב ובקצב לב לא סדיר).
- סימטידין (במינון הגבוה מ-800 מ"ג ליום, תרופה לכיבי קיבה, לבעיות עיכול או לצרבת).

אל תיקח **לרקאנפריל טבע** אם אתה לוקח סקוביטריל/ואלסרטן, תרופה המשמשת לטיפול בסוג של אי ספיקת לב או לסיקירן (ראה סעיף "אין מאחר שהסיכון לאנגיואדמה (נפיחות מהירה מתחת לעור באזורים כגון הגרון) עולה.

אם אתה לוקח אחת מהתרופות הבאות, הסיכון לאנגיואדמה עלול לעלות:

- רסקודטריל, תרופה לטיפול בשלשולים.
- תרופות המשמשות למניעת דחיית איברים מושתלים ולסרטן (כגון טמסירולימוס, סירולימוס, אברולימוס).
- וילדגליפטין, תרופה המשמשת לטיפול בסוכרת. ייתכן שהרופא יצטרך להתאים את המינון שלך ו/או לנקוט באמצעי זהירות אחרים אם אתה לוקח חוסמי רצפטור לאנגיוטנסין 2 או אליסקירן (ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם" וסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

### שימוש בתרופה ומזון

- יש לטויל **לרקאנפריל טבע** לפחות 15 דקות לפני הארוחה.

ארוחה עתירת שומן מגדילה באופן משמעותי את רמת התרופה בדם.

אין לטויל **לרקאנפריל טבע** בעת צריכת אשכוליות או מיץ אשכוליות, מכיוון שהם עלולים להגביר את השפעת התרופה על הורדת לחץ הד (ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם").

### שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אלכוהול עלול להגביר את ההשפעה של **לרקאנפריל טבע**. אין לצרוך אלכוהול בזמן הטיפול ב**לרקאנפריל טבע**.

### הריון ונקה

עליך לספר לרופא אם את חושבת שאת בהריון או עשויה להיכנס להריון. הרופא בדרך כלל ימליץ לך להפסיק את השימוש ב**לרקאנפריל טבע** לפני שאת נכנסת להריון או ברגע שקלית שאת בהריון וייעץ לך לקחת תרופה אחרת במקום **לרקאנפריל טבע**. **לרקאנפריל טבע** אינה מומלצת במהלך הריון ואסור לטויל אותה אם את בהריון מעל ל3 חודשים, מכיוון שהיא עלולה לגרום לנזק חמור לעובר בשימוש לאחר החודש השלישי של ההריון.

### הנקה

אין להשתמש ב**לרקאנפריל טבע** במהלך הנקה.

### נהיגה ושימוש במכוונת

אם אתה מרגיש סחרחורת, חולשה או נמנום, בעת השימוש בתרופה זו, אל תנהג ברכב ואל תשתמש במכוונת.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**
תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

**מבוגרים:** המינון המקובל בדרך כלל הוא טבליה אחת פעם ביום, באותה השעה.

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם כוס מים.

יש לטויל **לרקאנפריל טבע** לפחות רבע שעה לפני הארוחה, מומלץ לפני ארוחת הבוקר. ראה בסעיף 2 "שימוש בתרופה ומזון".

**לידים ומתנגבים:** התרופה אינה מיועדת לטיפול בילדים ובמתגברים מתחת לגיל 18 שנים.

**מטופלים עם בעיות בכליה/קשישים:** מינון התרופה יקבע על-ידי הרופא בהתאם לתפקוד הכליות שלך.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

אסור לחצות את הטבליות, מאחר שאין קו חצייה. אין מידע לגבי כתישה/לעיסה.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר,** תיתכן ירידה מופרזת בלחץ הדם ודופק לב לא סדיר או מהיר. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

### אם שכחת לטויל את התרופה

אם שכחת לטויל תרופה זו בזמן המיועד, דלג על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה כרגיל. אין לטויל מנה כפולה על מנת להשלים מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעות עם רופא.

**אין לטויל תרופות בחושרך בידוק תהויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**לרקאנפריל טבע** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

### חלק מתופעות הלוואי עלולות להיות חמורות.

**יש לפנות לרופא מיד בהופעת:** תגובה אלרגית עם נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון שעלולה לגרום לקשיי נשימה או בליעה.

בתחילת הטיפול ב**לרקאנפריל טבע**, אתה עלול להרגיש חולשה, סחרחורת או לחוות טשטוש ראייה. זה קורה בעקבות נפילה פתאומית בלחץ הדם שלך.

במקרה זה, יש לשכב. אם אתה מודאג, ספר לרופא שלך.

### תופעות לוואי שנוצפו עם לרקאנפריל טבע

**תופעות לוואי שכיחות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 100):

כאב ראש, סחרחורת, שיעול.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 1,000):

- שינויים בערכים בדם כמו ירידה ברמת טסיות הדם.
- עלייה ברמת האשלגן בדם.
- עצבנות (חרדה).
- תחושת סחרחורת במעבר למצב עמידה, ורטיגו. דופק מהיר, מודעות לפעימות לב (פלפטציות).
- האדמה פתאומית של הפנים, הצוואר או החלק העליון של החזה (הסמקה), לחץ דם נמוך.
- כאב בטן, עצירות, בחילה.
- רמות גבוהות של אנזימי כבד.
- אדמומיות בעור.
- כאב פרקים.
- עלייה במספר הפעימים של מתן שתן.
- תחושת חולשה, עייפות, תחושת חום, נפיחות של הקרסוליים.

**תופעות לוואי נדירות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 10,000):

- אנמיה.
- תגובות אלרגיה.
- צלצולים באוזניים (טיניטוס).
- עיטפון.
- יושב בגרון. כאב גרון.
- קשיי עיכול, הרגשת מליחות בלשון, שלשול, יובש בפה, נפיחות של התיכיים.
- תגובה אלרגית המלווה בנפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון עם קשיי בליעה או נשימה, פריחה בעור, חרלת.

- קימה בלילה לצורך השתנה, ייצור כמויות גדולות של שתן.

- אין אונות.

**תופעות לוואי נוספות שנוצפו עם אנלפריל או לרקנידיפין לבד:**

### אנלפריל

**תופעות לוואי שכיחות מאוד** (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מתוך עשרה):

טשטוש ראייה, סחרחורת, חולשה, בחילה ושיעול.

**תופעות לוואי שכיחות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 100):

דיכאון, כאב ראש, עיטפון, כאב חזה, סחרחורת עקב לחץ דם נמוך, שינויים בקצב הלב, דופק מהיר, תעוקת חזה, קוצר נשימה, שינוי בחוש הטעם, עלייה ברמת הקריאטינין בדם (גבוה כלל ניתן לזהות בבדיקה), רמת אשלגן נמוכה בדם, קשיי עיכול, בטן, עייפות, פריחה, תגובה אלרגית עם נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון עם קשיי בליעה או נשימה.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 1,000):

אנמיה (כולל אנמיה אפלסטית והמוליטית), ירידה פתאומית בלחץ הדם, בלבול, עצבנות, דודי שינה או נישניות, הרגשת קוצץ עור או חוסר תחושה בעור, התקף לב (הנובע כנראה מלחץ דם נמוך מאוד במטופלים בסיכון, כולל אלו עם בעיות בזרימת הדם בלב או במוח), שבץ מוחי (כנראה בגלל לחץ דם מאוד נמוך במטופלים בסיכון), זדלת, כאב גרון וצרידות, לחץ בחזה הקשור לאסתמה, תגובה איטית של מזון במעיים, דלקת בלבב, הקאה, קשיי עיכול, עצירות, גירוי בקיבה, יובש בפה, כיב, אורוקסיה, התכווצות שרירים, הרגשה כללית לא טובה, חום גבוה, רמות נמוכות של סוכר או של נתרן בדם, רמות גבוהות של אוריאה בדם (נמדד בבדיקות דם), הסמקה, מודעות לפעימות לב (פלפטציות), ורטיגו (תחושת סחרור), צלצולים באוזניים (טיניטוס), אין אונות.

**תופעות לוואי נדירות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 10,000):

שינויים בערכי הדם כגון ירידה במספר תאי הדם הלבנים, דיכוי חיסו העצם, מחלות אוטואימוניות, חלומות מזרחים או בעיות שינה, תופעת רינון (קור וחירורן ככפות הידיים והרגליים כתוצאה מזרימת דם נמוכה), דלקת באף, דלקת ריאות, בעיות בכבד כגון ירידה בתפקוד הכבד, דלקת בכבד, צהבת (הצהבה של העור או של העיניים), רמות גבוהות של אנזימי כבד או של בילירובין (נמדד בבדיקות דם), אריתמה מולטיפורמה (נקודות אדומות בצורות שונות על העור), תסמונת טייבנס-ג'ונסון וטוקסיקי אידירמט דם נקרוליזיס (מצבי עור חמורים עם אדמומיות וקילוף בעור, שלפוחיות או פצעים פתוחים), דלקת עור קילופית/ארתרודרמה (פריחה חמורה בעור עם קילוף בעור), מפפיגוס (בליטות קטנות בעור מלאות נוזל), מיעוט בייצור שתן, הגדלת בלוטות הלחלב בגברים, בלוטות נפוחות בצוואר, בבית השחי או במפשעה, הצטברות נוזלים או חומרים אחרים בתאים (נראה בשפתיים, רטגון), דלקת בלחיים בתכניים, בלשון, בעיניים, בגרון.

**תופעות לוואי נדירות מאוד** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-10000):

נפיחות משתמשת אחד מתוך 10,000, התפחות נפיחות של המעיים (אנגיואדמה של המעיים).

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה** (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

ייצור יתר של הורמון נוגד השתנה הגורם לאצירת נוזלים, ובעקבות כך לחולשה, לעיפות או לבלבול. דווח על מכלול תסמינים שעלול לכלול חלק מהתופעות הבאות או את כולן: חום, דלקת בכלי דם (רוסיטוסיס/וסקולטיס), כאב שרירים (מאליגה/ מיוסיטיס), כאב מפרקים (ארתרלגיה/ארטריטיס). פריחה, רגישות לאור או תופעות עור אחרות עלולות להופיע.

### לרקנידיפין

**חלק מתופעות הלוואי עלולות להיות חמורות.**

**יש לפנות מייד לרופא בהופעת אחת מהתופעות הבאות:**

**תופעות לוואי נדירות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 10,000):

תעוקת חזה (כאב בחזה בעקבות מחסור באספקת הדם ללב), תגובות אלרגיה (התסמינים כוללים גרד, פריחה וחרחלת), עיטפון.

מטופלים עם תעוקת חזה קיימת, יכולים לחוות עלייה בתדירות, במשך או בחומרה של ההתקפים בעקבות שימוש בתרופות המשפחה שאליה משתייכת לרקנידיפין. מקרים בודדים של התקף לב יכולים לקרות.

### תופעות לוואי נוספות

**תופעות לוואי שכיחות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 100):

כאב ראש, קצב לב מהיר, מודעות לפעימות לב (פלפטציות), האדמה פתאומית של הפנים, הצוואר או החלק העליון של החזה (הסמקה), נפיחות של הקרסוליים.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 1,000):

סחרחורת, נפילה בלחץ הדם, צרבת, בחילה, כאבי בטן, פריחה בעור, גרד, כאבי שרירים, מתן שתן בכמויות גדולות, תחושת חולשה או עייפות.

**תופעות לוואי נדירות** (תופעות שמופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 10,000):

שינויות, הקאה, שלשול, חרלת, עלייה במספר הפעימים של מתן שתן, כאב חזה.

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה** (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):