

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

أتكند ٦ ملغ	أتكند ٨ ملغ	أتكند ٤ ملغ
أقراص	أقراص	أقراص

التركيب

كل قرص يحتوي على:

كandiسيارتان سيليكسيتيل ٤ ملغ Candesartan cilexetil 4 mg

كandiسيارتان سيليكسيتيل ٨ ملغ Candesartan cilexetil 8 mg

كandiسيارتان سيليكسيتيل ١٦ ملغ Candesartan cilexetil 16 mg

للمواد غير الفعالة الرجاء أنظر الفقرة ٦ - "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

حافظ على هذه النشرة من الجائز أن تحتاجها ثانية. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك. الدواء مخصص لكتار فوق عمر ١٨ سنة.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

لمعالجة إرتفاع ضغط الدم ولمعالجة قصور القلب.

الفصيلة العلاجية

من مضادات المستقبل أنجيوتنتسين ||، يحجب تأثير الهرمون أنجيوتنتسين || وبذلك يؤدي إلى إرتخاء الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك ينخفض ضغط الدم. كذلك فإن هذا الأمر يساعد القلب على ضخ الدم إلى كافة أنحاء الجسم.

(٢) قبل إستعمال الدواء

X لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت في فترة الحمل بعد الشهر الثالث (يفضل أيضاً الإمتناع عن إستعمال الدواء في بداية الحمل، لمعلومات إضافية انظر فقرة "الحمل والإرضاع" أدناه).
- علمت بوجود حساسية لديك للمادة الفعالة - كandiسيارتان سيليكسيتيل أو لأحد مركبات الدواء (أنظر الفقرة ٦ "معلومات إضافية" أدناه).
- كنت تعاني من خلل خطير في وظائف الكبد أو من إنسداد في الطرق الصفراوية.
- كنت تتناول دواء لتخفيض ضغط الدم يحتوي أليسكيرين aliskiren ولديك السكري.
- كنت تتناول دواء لتخفيض ضغط الدم يحتوي أليسكيرين aliskiren ولديك مشاكل في وظيفة الكلى.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال أتاكند

! قبل العلاج بـ أتاكند إحك للطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب، الكبد، الكلية أو تخضع للعلاج بالديلز.
- اجتررت مؤخراً عملية زرع كلية، إذا كنت تعاني من إسهالات وتقؤات أو عانيت مؤخراً من تقؤات شديدة، إذا كنت تعاني من مرض يسمى فرط الألدوستيرونية الأولى، إذا كنت تعاني من مرض الغدة الكظرية المسمى متلازمة كونس (Conn's)، إذا وجد لديك ضغط دم منخفض، إذا عانيت في الماضي من سكتة.
- عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل. لا يوصى بإستعمال أتاكند في بداية الحمل ويمنع إستعماله بعد الشهر الثالث من الحمل لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً للجنين (معلومات إضافية أنظري فقرة "الحمل والإرضاع").
- كنت مقدماً على إجراء عملية جراحية، يجب إبلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول أتاكند.
- أتاكند بمشاركة مواد تخدير قد يؤدي إلى هبوط ضغط الدم.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.
- إذا كنت تتناول إحدى الأدوية التالية التي تستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم:

 - مثبطات الإنزيم ACE (مثل - إنالاپريل، ليسينوپريل وراميپريل) خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل كلوية تتعلق بمرض السكري.
 - اليسكيرين aliskiren
 - إذا كنت معالجاً بأدوية من فصيلة مثبطات الإنزيم ACE سوية مع أدوية لعلاج فشل القلب التي تعرف بمضادات مستقبل القشرانيات المعدنية (MRAs).

في هذه الحالة من الجائز أن يضطر الطبيب لفحص ومراقبة القيم التالية - الأداء الوظيفي الكلوي، ضغط الدم ونسبة الشوارد الكهربائية (مثلاً - البوتاسيوم) في الدم بفواصل زمنية محددة.

! إذا كنت تتناول أدوية أخرى

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب الإبلاغ خاصة إذا كنت تتناول أدوية:

- لا يجوز إستعمال أتاكند إذا كنت تتناول دواء لتخفيض ضغط الدم يحتوي اليسكيرين aliskiren ولديك مشاكل السكري.
- لا يجوز إستعمال أتاكند إذا كنت تتناول دواء لتخفيض ضغط الدم يحتوي اليسكيرين aliskiren ولديك مشاكل في وظيفة الكلية.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى لتخفيض ضغط الدم - بما في ذلك المدرات البولية، حاجبات بيتا، ديازوكسيد، مثبطات الإنزيم ACE مثل إنالاپريل، كلابتوريل، ليسينوپريل وراميپريل.
- أدوية مدرة للبول (diuretics)، لطرح السوائل من الجسم.
- إذا كنت معالجاً بأدوية من فصيلة مثبطات الإنزيم ACE سوية مع أدوية لعلاج فشل القلب التي تعرف بمضادات مستقبل القشرانيات المعدنية (MRAs) مثل - سبيرونولاكتون، إيليليرينون.

- مستحضرات تستعملها دون وصفة طبية.
- مزيج لدوائين لعلاج تلوث جرثومي - تريميتوپريم وسولفاميكوكسازول (مثل ريسپيريم).
- أدوية مضادة للإلتهاب لاستيروئيدية (NSAIDs) المستعملة أيضاً لتسكين الألم مثل إيبوبروفن، ناپروكسين، ديكلافيناك، أسيبرين (إذا كنت تتناول أكثر من ٣ غرام في اليوم) إنوريكوكسيب وسيليوكسيب.
- مدرات بولية حافظة للبوتاسيوم، إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح الحاوية ٩بوتاسيوم أو أدوية أخرى يمكنها رفع نسبة البوتاسيوم.
- هيبارين - دواء يستعمل لتمثيل الدم
- ليتيوم (دواء يستعمل لعلاج مشاكل نفسية).

! استعمال الدواء والطعم:

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

! استعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

يجب التحدث مع الطبيب حول عادات إستهلاك الكحول لديك. بعض الأشخاص الذين يتناولون أتاكند قد يشعروا بدوار وضعف عند إستهلاكهم للكحول.

! الحمل والإرضاع:

- عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت في فترة الحمل، تعتدين بأنك حامل أو تخططين للحمل. غالباً يوصي الطبيب بالتوقف عن إستعمال أتاكند والإنتقال لإستعمال دواء آخر قبل حصول الحمل أو مباشرة بعد إكتشاف حصول حمل. لا يوصى بإستعمال أتاكند في بداية الحمل ويمنع إستعماله بعد الشهر الثالث من الحمل، لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً للجنين إذا تم تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل.
- إذا كنت في فترة الرضاعة أو تخططين للإرضاع الرجاء إعلام الطبيب. توصى الأمهات المرضعات بعدم إستعمال أتاكند خلال فترة الرضاعة خاصة لدى حديثي الولادة والخدج. إذا رغبت في الإرضاع فمن الجائز أن يوصي الطبيب بعلاج بديل.

! السيارة وإستعمال الماكولات:

قد يسبب هذا الدواء الدوار أو الإرهاق لأشخاص معينين. تجنب سيافة المركبات، تشغيل الماكولات الخطيرة وأي نشاط يقتضي اليقظة وذلك إذا شعرت بذلك الأعراض.

! معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

الأقراد تحوي لكتوز حيث يعتبر نوع من السكر. إذا قيل لك من قبل الطبيب أنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، إستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب الإستعمال دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
- الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
- لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
- الدواء مخصص لكتاب الذين تجاوزوا عمر ١٨ سنة.

إرشادات الإستعمال:

- لا يجوز مضغ أو سحق القرص، بالإمكان شطره بغية تسهيل البلع، يجب بلع كلا نصفين القرص سوية.
- يبلع الدواء مع الماء.
- يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.
- يوصى بتناول الأقراص كل يوم في نفس الوقت (في الصباح مثلاً).
- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول الجرعة التالية كالمعتاد، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعتين معاً!
- إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.
- يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب.
- لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
- لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة الدوائية الإعتيادية في حال عدم توفر تعليمات أخرى من الطبيب هي:

لعلاج إرتفاع ضغط الدم:

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي ٨ ملغ مرة في اليوم، بإمكان الطبيب رفع الجرعة الدوائية حتى جرعة دوائية إجمالية قدرها ١٦ ملغ للبيوم كأمر مرتبط بقيم ضغط الدم. من الجائز أن يوصي الطبيب بإستعمال جرعة دوائية إبتدائية أكثر إنخفاضاً وذلك لدى بعض المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى، الكبد أو فقدوا في الفترة الأخيرة سوائل (مثلاً جراء تقيؤات وإسهالات أو نتيجة إستعمال مدرات بولية). من الجائز أن يستجيب بعض المرضى ذوي لون بشرة سوداء بشكل أقل للدواء عندما يعطى كعلاج وحيد. لذا، من الجائز أن يحتاج هؤلاء المرضى لجرعة دوائية أعلى.

لعلاج قصور القلب:

الجرعة الدوائية الإبتدائية الإعتيادية هي ٤ ملغ مرة في اليوم. بإمكان الطبيب رفع الجرعة الدوائية بمضاعفتها كل أسبوعين حتى جرعة دوائية إجمالية قدرها ٣٢ ملغ للبيوم.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أناكيند قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

الأعراض التي تقتضي إهتماماً خاصاً (نادر)

يجب التوقف عن تناول الدواء ومراجعة الطبيب حالاً إذا كنت تعاني من:

- صعوبات في التنفس، تترافق أو لا تترافق بانفاس في الوجه، الشفتين، اللسان والحنجرة
- إنفاس الوجه، الشفتين، اللسان والحنجرة، التي قد تسبب صعوبات في البلع
- حكة شديدة في الجلد (ترافق بحويصلات بارزة).

قد يسبب أثاكند إنخفاض في نسبة خلايا الدم البيضاء، نتيجة لذلك قد تكون لديك مقاومة أقل للتلوثات ومن الجائز أن تشعر بارهاق، إلتهابات أو سخونة. في هذه الحالة عليك الإتصال حالاً بالطبيب لإجراء فحوص دم (لنبي حدوث عرض نقص الكريات المحببة).

في أي حالة لشعورك بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغير على شعورك العام، فعليك إستشارة الطبيب حالاً.

أعراض جانبية شائعة، تظهر في أوقات متقاربة (تؤثر على أقل من مريض واحد من بين ١٠):

- الشعور بدوار
- صداع
- تلوث في الطرق التنفسية
- ضغط دم منخفض (قد يسبب دوار وإغماء)
- تغيرات في فحوص الدم: ارتفاع نسب البوتاسيوم في الدم، خاصةً إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلية أو من قصور القلب. إذا كان ذلك شديداً، من الجائز أن تشعر بارهاق، ضعف، إضطرابات في نظم القلب، والشعور بـ "إبر ودبابيس".
- مشاكل في وظائف الكلية، وفي أحيان نادرة أكثر، فشل كلوي.

أعراض جانبية نادرة جداً (تؤثر على أقل من مريض واحد من بين ١٠٠٠٠):

- إنفاس الوجه، الشفتين، اللسان والحنجرة
- إنخفاض في خلايا الدم البيضاء أو الحمراء - من الجائز أن تشعر بارهاق، تلوث أو سخونة
- طفح، شرى
- حكة
- آلام في الظهر، المفاصل والعضلات
- تغيرات في وظائف الكبد، تشمل إلتهاب الكبد، إرهاق، إصفرار الجلد وإصفرار بياض العينين، وأعراض إنفلوإنزا غثيان
- تغيرات في فحوص الدم: إنخفاض في كمية الصوديوم في الدم. إذا كان هذا الإنخفاض شديداً، من الجائز أن تشعر بضعف، قلة الحيوية، أو تقلصات عضلية.
- سعال

أعراض جانبية شيوعها غير معروفة (أعراض شيوعها لم يحدد بعد):

- إسهال

إذا تفاقمت الأعراض الجانبية المذكورة سابقاً، أو إذا كنت تلاحظ أعراض جانبية لم تفصل أعلاه، الرجاء التوجّه إلى الطبيب أو الصيدلي.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقصاء تاريخ الصلاحية (Exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة/القنينة/الكرتون/الملاصقة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. في حالة الشك، عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.
- لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تتجاوز ٣٠ درجة مئوية.
- لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Lactose monohydrate, maize starch, carmelloose calcium, hydroxypropyl cellulose, polyethylene glycol (macrogol), magnesium stearate, iron oxide reddish-brown (E172) (only 8 mg and 16 mg tablets).

كل قرص من عيار ٤ ملغ يحتوي ٩٣,٤ ملغ لكتوز
 كل قرص من عيار ٨ ملغ يحتوي ٨٩,٤ ملغ لكتوز
 كل قرص من عيار ١٦ ملغ يحتوي ٨١,٤ ملغ لكتوز

كيف يبدو الدواء:

أقراص أتناكند ٤ ملغ ذات شكل مستدير، محدبة الجانبين، ذات لون أبيض يميل إلى الكريم، مع شق، حُفر في جانب واحد A/CF و 004 في الجانب الثاني.

أقراص أتناكند ٨ ملغ ذات شكل مستدير، محدبة الجانبين، ذات لون زهري فاتح، مع شق، حُفر في جانب واحد CG/A و 008 في الجانب الثاني.

أقراص أتناكند ١٦ ملغ ذات شكل مستدير، محدبة الجانبين، ذات لون زهري، مع شق، حُفر في جانب واحد CH/A و 016 في الجانب الثاني.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٤ ملغ: ٢٩١٨٣ ٠٨ ١٠٩

٨ ملغ: ٢٩١٨٤ ٠٩ ١٠٩

١٦ ملغ: ٢٩١٨٥ ١٠ ١٠٩

المصنّع وعنوانه:

تسيلفافارم أرتسنایميتل م.ض.، چریسفالد، ألمانيا.

صاحب الامتياز وعنوانه:

تسامال بيو-فارما م.ض.، شارع هاماچشيميم 20، بيتح نيكفا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتهاها فُحص ورُخص من قبلها في تاريخ تموز ٢٠٢٣ وتم تديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ كانون أول ٢٠١٩

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

