

يسوّق هذا الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

تزسپاير™

محلول للحقن

للحقن تحت الجلد

التركيب:

يحتوي كل قلم جاهز للإستعمال (1.91 ملل) على:

تيزبييلوماب 210 mg ملح Tezepelumab 210 mg

للمركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6 - معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

إحفظ النشرة من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، الرجاء راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) ما هو تزسپاير ولأى غرض مخصص الدواء؟

تزسپاير مخصص كعلاج داعم بالإضافة إلى العلاج الحالي للربو الشديد لدى الكبار والمراهقين فوق عمر 12 سنة.

الفصيلة العلاجية:

من أدوية علاج تضيّقات الطرق التنفسية.

ضد وحيد النسيلة ضد البروتين TSLP (*thymic stromal lymphopoietin*)

ما هو تزسپاير

تزسپاير عبارة عن دواء يحتوي على المادة الفعالة تيزبييلوماب، التي تعتبر ضد وحيد النسيلة. إن الضد عبارة عن نوع بروتين مصمم للتعرف والإرتباط

بموقع هدف معين في الجسم. موقع الهدف الخاص لـ تيزبييلوماب هو بروتين يسمى TSLP (*thymic stromal lymphopoietin*). للبروتين

TSLP دور هام في المسيرة الإلتهابية في الطرق التنفسية حيث يسبب أعراض وعلامات الربو. بواسطة حجب عمل البروتين TSLP، فإن تزسپاير

يساهم في تقليل المسيرة الإلتهابية وأعراض الربو.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لـ تيزبييلوماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6). تحقق من الطبيب، الممرضة أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً أو كنت تعتقد أن ذلك قد ينطبق عليك

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال تزسپاير

- تزسپاير ليس دواء طوارئ. لا تستعمله لعلاج نوبات الربو المفاجئة.

● إذا لم يتحسن الربو لديك أو يتفاقم أثناء العلاج بالدواء، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة.

● إنتبه لأعراض رد الفعل التحسسي. يمكن أن تسبب أدوية مثل تزيساير ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. تختلف علامات رد الفعل التحسسي

ويمكن أن تشمل مشاكل في التنفس، شرى وطفح. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.

تحدث مع الطبيب حول كيفية تشخيص علامات مبكرة للحساسية وكيفية التعامل معها إذا ظهرت.

● إنتبه للعلامات المحتملة لحدوث تلوث خطير أثناء إستعمالك تزيساير مثل:

○ سخونة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تعرق ليلي

○ سعال لا يتوقف

○ جلد مائل للون الأحمر، ساخن ومؤلم أو طفح جلدي مؤلم يترافق بحويصلات.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.

إذا وُجد لديك حالياً تلوث خطير، تحدث مع طبيبك، قبل إستعمالك لـ تزيساير.

● إنتبه لأعراض المشاكل القلبية، مثل:

○ آلام في الصدر

○ ضيق في التنفس

○ شعور عام بعدم الراحة، وعكة أو تضرر جودة الحياة.

○ دوام أو إغماء.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.

● إذا وُجد لديك تلوث طفيلي (تسبب به طفيلي) أو كنت تقطن في منطقة تنتشر فيها التلوثات الطفيلية (أو إذا كنت مسافراً إلى مثل هذه المنطقة)، تحدث

مع طبيبك. قد يضعف تزيساير من قدرة جسمك على محاربة أنواع معينة من التلوثات الطفيلية.

الأطفال والمراهقون

تزيساير غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال دون عمر 12 سنة. لا تتوفر معلومات حول سلامة ونجاعة إستعمال هذا المستحضر لدى أطفال دون عمر

12 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

بالأخص إذا كنت تستعمل:

● أخبر الطبيب إذا تلقيت مؤخراً لقاحاً أو ستلقى لقاحاً في الفترة القريبة.

أدوية إضافية لعلاج الربو

لا تتوقف بشكل مفاجئ عن أدوية الوقاية من الربو بمجرد أن تبدأ العلاج بـ تزيساير. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتناول الستيروئيدات (تسمى أيضاً

كورتيكوستيروئيدات). يجب التوقف عن إستعمال هذه الأدوية بشكل تدريجي، تحت إشراف مباشر من طبيبك وبناءً على إستجابتك لـ تزيساير.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا كنت تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، إستشير ي طبيبك قبل إستعمال الدواء.

لا يجوز إستعمال تزيساير أثناء الحمل إلا إذا أخبرك الطبيب خلاف ذلك. من غير المعروف ما إذا كان تزيساير من شأنه أن يلحق الضرر بالجنين.

قد ينتقل تزيساير إلى رضيعك عبر حليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، يجب إستشارة الطبيب.

السياقة وإستعمال الماكنات

من غير المحتمل أن يؤثر تزسپاير على قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي تزسپاير على أقل من 1 ميليومول من الصوديوم (23 ملغ) في كل مقدار دوائي قدره 210 ملغ، وبالتالي يعتبر خالٍ من الصوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال تزسپاير دائماً حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

الكبار والمراهقون فوق عمر 12 سنة:

المقدار الدوائي الموصى به هو 210 ملغ (حقنة واحدة) كل أربعة أسابيع. يُعطى تزسپاير بالحقن تحت الجلد.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

سيقرر كل من طبيبك أو الممرضة، ما إذا كان بإمكانك حقن الدواء بنفسك أو إذا كان بإمكان شخص آخر يعتني بك القيام بذلك من أجلك. إذا كان الأمر

كذلك، فستتلقى أنت أو سيتلقى الشخص الذي يُعالجك إرشاداً حول الطريقة الصحيحة لتحضير وحقن الدواء تزسپاير.

قبل إستعمال تزسپاير، عليك قراءة كامل "تعليمات الإستعمال" بالنسبة لـ تزسپاير قلم جاهز للإستعمال.

قم بذلك قبل كل عملية حقن، من الجائز أن يتم تحديث المعلومات الواردة في "تعليمات الإستعمال".

لا يجوز مشاركة قلم تزسپاير الجاهز للإستعمال أو إستعمال القلم أكثر من مرة واحدة.

إذا فوّت مقداراً دوائياً من تزسپاير

● إذا نسيت حقن مقداراً دوائياً من تزسپاير، قم بحقن المقدار الدوائي في أسرع وقت ممكن. وبعد ذلك، إحقن حقنتك التالية في الوقت المخطط له.

● إذا لم تلاحظ أنك فوّت مقداراً دوائياً وقد حان وقت المقدار الدوائي التالي بالفعل، إحقن المقدار الدوائي التالي كما هو مخطط له. لا تحقن مقداراً دوائياً

مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي الذي فوّته.

● إذا لم تكن واثقاً متى عليك حقن تزسپاير، إسأل الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

التوقف عن إستعمال تزسپاير

لا يجوز التوقف عن العلاج بـ تزسپاير دون التحدث عن ذلك أولاً مع الطبيب، الممرضة أو الصيدلي. قد يؤدي إيقاف أو تشويش العلاج بـ تزسپاير إلى

عودة أعراض ونوبات الربو.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة

الدواء.

لا يجوز استعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال تزيساير قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين):

- ألم في الحنجرة
- طفح
- آلام في المفاصل
- أعراض في موقع الحقن (مثل إحمرار، إنتفاخ وألم)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

● يجب الحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية (في البراد). إذا دعت الحاجة، يمكن حفظ تزيساير في علبة الكرتون في درجة حرارة الغرفة (حتى 20-25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 30 يوماً. لا يجوز إعادته إلى البراد بعد أن تم تخزين تزيساير في درجة حرارة الغرفة.

● يجب حفظ تزيساير في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء.

● لا يجوز الخض، التجميد أو التعريض لمصدر حرارة.

● لا يجوز استعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. عند أي حالة من الشك، عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

● لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة.

● لا تستعمل تزيساير إذا سقط القلم، تضرر أو في حالة تلف ختم العلبة.

لا يجوز إلقاء أي دواء إلى المجاري. يجب إستشارة الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

L-proline, Acetic acid glacial, Polysorbate 80, Sodium hydroxide, Water for injection

كيف يبدو الدواء؟

تزسپاير عبارة عن محلول شفاف حتى حليبي، عديم اللون حتى مائل للأصفر.

يتوفر تزسپاير ضمن علبة تحتوي على قلم واحد جاهز للإستعمال.

المنتج:

أسترازينيكاب، AB، سودرتالية، السويد

صاحب الإمتياز والمستورد:


أسترازينيكاب (إسرائيل) م.ض.

شارع عتيري بيدع 1، كفار سابا 4464301.


رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 171-59-37290

تم تحديثها في أيار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.




PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



- 1 تخلص من الحاوية المقاومة للأشياء الحادة وفقاً للتعليمات التي قدمها لك الطبيب أو الصيدلي.
- 2 لا تتخلص من الحاوية المقاومة للأشياء الحادة في النفايات المنزلية، ما لم تكن هذه هي الإرشادات الخاصة بمنطقة إقامتك.
- 3 **لا تقم بإعادة تدوير الحاوية المقاومة للأشياء الحادة.**
- 4 من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

التخلص من القلم
الخطوة 10 - التخلص من القلم المستعمل بأمان



يحتوي كل قلم جاهز للاستعمال من تزيباير على مقدار دوائي واحد ولا يمكن معاودة استعماله مرة أخرى. لا تعد السدادة مرة أخرى إلى القلم. ضع القلم المستعمل والسدادة في حاوية مقاومة للأشياء الحادة فوراً بعد الاستعمال. إرمِ المعدات الإضافية في سلة المهملات المنزلية. لا يجوز التخلص من القلم المستعمل في سلة المهملات المنزلية.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6


7

8

9


10

الخطوة 9 - افحص موقع الحقن




قد تلاحظ قليلاً من الدم أو السائل في موقع الحقن.
هذا سليم. اضغط برفق على مكان الحقن بالقطن أو
الشاش حتى يتوقف النزف.
لا تفرك منطقة الحقن. إذا لزم الأمر، قم بتغطية موقع
الحقن بواسطة بلاستر.

الخطوة 8 - افحص نافذة المشاهدة



افحص نافذة المشاهدة للتأكد من حقن كل سائل الدواء.
إذا لم يملأ المكبس البرتقالي نافذة المشاهدة بالكامل، فربما لم تحقن المقدار الدوائي من الدواء بالكامل. إذا حدث ذلك، أو إذا كانت لديك أسئلة أخرى، فاتصل بالطبيب المعالج.



1

2

3

4

5




6

7


8

9

10

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	 <p>4</p> <p>بعد الانتهاء من الحقن، ارفع قلم تزسپاير بشكل مستقيم. سينزلق وافي الإبرة البرتقالي للأسفل، يغطي الإبرة وينغلق في مكانه.</p>	 <p>3</p> <p>امسك نمو الأسفل بقوة لمدة 15 ثانية. سوف تسمع 'نقرة' ثانية. سيشير لك هذا إلى انتهاء الحقن. سوف يملأ المكبس البرتقالي نافذة المشاهدة.</p>	 <p>2</p> <p>اضغط للأسفل بقوة حتى لا يكون بإمكانك رؤية وافي الإبرة البرتقالي. سوف تسمع 'النقرة' الأولى، هذا سيشير لك أن الحقن قد بدأ. سيتحرك المكبس البرتقالي للأسفل في نافذة المشاهدة أثناء الحقن.</p>
8			
9			
10			

الخطوة 7 - احقن الدواء تزسپاير



وضعية القلم في منطقة الحقن

- ضع واقي الإبرة البرتقالي للقلم بشكل مسطح على الجلد (بزاوية 90 درجة).
- تأكد من أنه يمكنك رؤية نافذة المشاهدة.

اتبع التعليمات التي تلقيتها من فرد الطاقم الطبي حول كيفية الحقن. يمكنك قرص الجلد برفق في منطقة الحقن أو الحقن بدون قرص الجلد في منطقة الحقن.

اتبع التعليمات المفصلة في الصور التالية 1، 2، 3 و-4 من أجل حقن الدواء تزسپاير.

ستسمع أثناء الحقن أول 'نقرة' التي تشير إلى أن الحقن قد بدأ. اضغط وامسك القلم الجاهز للاستعمال لمدة 15 ثانية، حتى تسمع 'النقرة' الثانية.

لا تغير وضعية مسك القلم بعد بدء الحقن.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10


الخطوة 6 - انزع السدادة



لا تقم بنزع السدادة حتى تكون جاهزاً للحقن.
 أمسك جسم القلم بيد واحدة، واسحب بحذر وبشكل
 مستقيم السدادة بيدك الأخرى.
 ضع السدادة جانباً للتخلص منها لاحقاً.
 واقى الإبرة البرتقالي مكشوف الآن. واقى الإبرة البرتقالي
 مخصص لمنعك من لمس الإبرة.
لا تلمس الإبرة أو تضغط على واقى الإبرة البرتقالي
بإصبعك.
لا تضع السدادة مرة أخرى على القلم.
 قد تقوم بتشغيل حقن القلم في وقت مبكر جداً أو قد
 تلحق ضرراً بالإبرة.

الخطوة 5 - اغسل يديك ونظف مكان الحقن

اغسل يديك جيداً بالصابون والماء.
نظف منطقة الحقن بضمادة كحولية بحركات دائرية. دع المنطقة تجف في الهواء.
لا تلمس المنطقة التي نظفتها قبل الحقن.
لا تجفف المنطقة بالنفخ أو بأي تهبوية.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

حقن تزسپاير الخطوة 4 - اختر مكان حقن تزسپاير




إذا كنت تحقن تزسپاير لنفسك، فإن **موقع الحقن الموصى به** هو الجزء الأمامي من فخذك أو الجزء السفلي من بطنك. لا تحقن لنفسك في الذراع.

إذا تم إجراء الحقن من قبل شخص آخر، فيمكنه حقنك في أعلى الذراع، في الفخذ أو في البطن. بالنسبة لكل حقنة، اختر مكان حقن مختلف يبعد 3 سنتيمترات على الأقل من مكان الحقن الأخير.

- لا تحقن في مسافة حتى 5 سنتيمترات من سرتك.
- لا تحقن في مكان يكون فيه جلدك حساساً، مرضوفاً، فيه قشرة أو قاسياً.
- لا تحقن على ندبة أو جلد متضرر.
- لا تحقن من خلال الملابس.

الخطوة 3 - أخرج القلم الجاهز للاستعمال من العبوة



أمسك في منتصف القلم الجاهز للاستعمال لإخراج القلم الجاهز للاستعمال من اللويحة.

تحقق من أن القلم الجاهز للاستعمال ليس تالفاً.

لا تستعمل القلم الجاهز للاستعمال إذا كان تالفاً.

تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية الذي على القلم الجاهز للاستعمال. لا تستعمل القلم الجاهز للاستعمال إذا انقضى تاريخ انتهاء الصلاحية.

أنظر إلى السائل من خلال نافذة المشاهدة في القلم.

يجب أن يكون السائل الموجود في القلم رائقاً وعتيم اللون أو مائلاً للأصفر.

لا تستعمل قلم تزسباير الجاهز للاستعمال إذا كان السائل الموجود في القلم عكراً، إذا كان لونه مختلفاً عن الموصوف أعلاه أو إذا كان يحتوي على جزيئات كبيرة.

قد تلاحظ فقاعات هواء صغيرة في السائل الموجود في القلم. هذا سليم. ليست هناك حاجة لفعل أي شيء حيال ذلك.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الخطوة 2 - حضّر قلم تزيّسباير للاستعمال



ضع قلم تزيّسباير خارج البراد لمدة 60 دقيقة أو أكثر قبل الحقن (كحد أقصى 30 يوماً)، من أجل أن يسخن قليلاً وتبلغ درجة حرارته درجة حرارة الغرفة (بين 20 إلى 25 درجة مئوية).

قم بإبقاء قلم تزيّسباير في علبة الكرتون لحمايته من الضوء.

لا يجوز تسخين القلم بأي طريقة أخرى. مثلاً، لا يجوز تسخينه في الميكروويف، بالماء الساخن، بالشمس المباشرة أو وضعه بالقرب من أية مصادر للحرارة.

لا تعد قلم تزيّسباير إلى البراد بعد بلوغه درجة حرارة الغرفة. تخلص من قلم تزيّسباير إذا مكث خارج البراد لأكثر من 30 يوماً.

لا يجوز نزع السدادة حتى الخطوة 6.

1

استعد لحقن تزسپاير الخطوة 1 - تنظيم المعدات

- 1 قلم تزسپاير جاهز للاستعمال من البراد
- 1 ضمادة كحولية
- 1 قطن أو شاش
- 1 بلاستر صغير الحجم (ممكن)
- 1 حاوية مقاومة للأشياء الحادة (الرجاء أنظر الخطوة 10 - التخلص من القلم المستعمل)



حاوية مقاومة
للأشياء الحادة



بلاستر



قطن أو شاش



ضمادة
كحولية



قلم جاهز
للاستعمال

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10


القلم الجاهز للاستعمال

لا يجوز نزع السدادة حتى تصل إلى الخطوة 6 من تعليمات الاستعمال هذه وتكون جاهزاً لحقن ترسپاير.

بعد الاستعمال



قبل الاستعمال



معلومات مهمة يجب أن تعرفها قبل حقن تزسپاير

يجب تخزين تزسپاير في البراد في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية في العلبة الأصلية حتى تكون مستعداً لاستعمال الدواء. إذا دعت الحاجة، يمكن الاحتفاظ بـ تزسپاير في العلبة الأصلية في درجة حرارة الغرفة (حتى 20-25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 30 يوماً. لا يجوز إعادة إلى البراد بعد تخزين تزسپاير في درجة حرارة الغرفة. يجب التخلص من تزسپاير الذي تم تخزينه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 30 يوماً (أنظر الخطوة 10).

لا يجوز استعمال قلم تزسپاير الجاهز للاستعمال إذا:

- تم تجميد القلم
- سقط القلم أو تلف
- تلف ختم العلبة
- انقضى تاريخ انتهاء صلاحية الدواء.

لا يجوز خضّ القلم الجاهز للاستعمال.

لا يجوز المشاركة مع أي شخص أو معاودة استعمال القلم الجاهز للاستعمال.

لا يجوز تعريض القلم الجاهز للاستعمال لمصدر حراري.

في حالة حدوث إحدى الحالات الموضحة أعلاه، يجب رمي القلم في حاوية مقاومة للأشياء الحادة ويجب استعمال قلم جديد جاهز للاستعمال.

يحتوي كل قلم جاهز للاستعمال من تزسپاير على مقدارٍ دوائي واحد من تزسپاير للاستعمال لمرة واحدة فقط. **تجنب التسمم! يجب حفظ تزسپاير وكل دواء آخر بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال. يُعطى تزسپاير بالحقن تحت الجلد فقط.**

تعليمات الاستعمال للحقن الذاتي

ترزسپاير™

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للاستعمال

يحتوي كل قلم جاهز للاستعمال (1.91 ملل) على:

Tezepelumab 210 mg ملغ

للحقن تحت الجلد

قلم جاهز للاستعمال لمرة واحدة

تحتوي تعليمات الاستعمال هذه على معلومات حول كيفية حقن ترزسپاير.

قبل استعمال قلم ترزسپاير، سيوضع أحد أفراد الطاقم الطبي لك أو لشخص يساعدك كيفية

استعمال القلم بشكل صحيح.

يجب قراءة تعليمات الاستعمال للحقن الذاتي قبل أن تبدأ باستعمال قلم ترزسپاير لأول

مرة وقبل كل استعمال. قد تكون هناك معلومات جديدة. المعلومات التي تظهر هنا لا تحل

محل الحاجة إلى التحدث مع الطبيب المعالج حول حالتك الطبية أو علاجك.

إذا كانت لديك أنت أو للشخص الذي يساعدك أي أسئلة، فيجب التحدث مع الطبيب المعالج.

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

210 ملغ/1.91 ملل
(110 ملغ/ملل)

تزسپاير

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للاستعمال
يحتوي كل قلم جاهز للاستعمال (1.91 ملل) على:
تيزيبيلوماب 210 ملغ Tezepelumab 210 mg

تعليمات الاستعمال للحقن الذاتي
للحقن تحت الجلد

قلم جاهز للاستعمال لمرة واحدة
تحتوي تعليمات الاستعمال هذه على معلومات حول كيفية حقن تزسپاير.

AstraZeneca 