

## سليبي إيد

### أقراص

المادة الفعالة وكميتها:

- يحتوي كل قرص ص 25 ملغ دوكسيلامين سوكسينات (Doxylamine succinate 25 mg)
- لغاية المواد غير الفعالة في المستحضر - انظر للند 6 وللند 2 "معلومات عن جزء مركبات الدواء" في النشرة.

أقرأ النشرة بعناية حتى يهتأيتي قبل أن تستعمل الدواء. هذه النشرة تحتوي على معلومات هجرية عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي. عليك تناول المستحضر بموجب التعليمات في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات.

إذا استمرت قلة النوم لأكثر من عشرة أيام متتالية، على الرغم من استعمال الدواء، توقف عن استعمال الدواء واتصل بطبيبك. قد تكون قلة النوم عرضاً لمرض آخر في الخلفية. لا تأخذ الدواء في وقت لاحق من اليوم. يجب التوجه إلى الطبيب تحت هذا الجبل.

### 1. لأي شخص مخصص الدواء؟

سليبي إيد مخصص كمساعدة لتخفيف اضطراب النوم المؤقت.

**الفصلية العلاجية:** مضادات الهيستامين.

آلية عمل الدواء: حصر عمل الهيستامين ومواد أخرى التي تنتج من استعمال الدواء. توقف عن استعمال الدواء مع الحساسية. بالإضافة، يجب الدواء بانتظاماً في نشاط الجهاز العصبي المركزي. ملاحظة: يخفف الأرق.

لا يوجد دليل على أن الدواء يهتأيتي للإدمان.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجحاً) للمادة الفعالة دوكسيلامين سوكسينات أو لأي واحد من مركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للند 6 "معلومات إضافية"). قد تشمل أعراض التفاعل التحسسي: سعال، ضيق تنفس، آزيز أو صعوبة في التنفس؛ انتفاخ الوجه، تورم اللسان، الحلق أو أجزاء أخرى من الجسم؛ طفح حكة أو قشور في الجلد؛ غثام أو أعراض مماثلة لحصى الكلى. إذا كنت تعتقد أنك تتخدر رد فعل تحسسي، توقف عن تناول الدواء وتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريبة.
- كنت تعاني أو عانيت من مشاكل تنفس مثل: الربو أو التهاب الشعبات (bronchitis) مزمنة.
- كنت تعاني أو عانيت من مرض كبدي أو كلي وخيم.
- كنت تعاني أو عانيت من مرض زرق (جلوكوما) انغلاق الزاوية.
- كنت تعاني أو عانيت من مشاكل في غدة البروستات (الموتة).
- كنت بدت صعوبة أو وجدت صعوبة في التبول.
- كنت تعاني أو عانيت من تضيق أو انسداد بين المعدة والأمعاء الدقيقة مما يسبب قيء الطعام غير المهضوم.
- كنت تعاني أو عانيت من الصرع.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بسليبي إيد، أخبر الطبيب إذا:

- كنت حاملاً، مرضعة أو تويني الحمل (انظري بند 2 "الحمل، الإرضاع والحساسية").
- التناخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. على وجه الخصوص يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ:

- أدوية مضادة للاكتئاب من عائلته مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAO inhibitors)، مثل: موكلوبيمي، فينلزين، ترانيلوبرومين.
- أدوية مضادة للاكتئاب من عائلته ثلاثية الحلقات، مثل: أميتريبتاين، إيميبرامين، نورتريبتاين، دوكسين.
- مسكنات الألم قوية، مثل: كودين، مورفين.
- أدوية أخرى تساعد على النوم، مثل: تيزاميام، تريزولام أو نيتزالبيام.
- أدوية لعلاج القلق، مثل: أوكسانازيم، ديازيبام.
- مضادات حيوية من نوع أمينوجليكوزيدات، مثل: توبراميسين.

### استعمال الدواء واستهلاك الكحول

تصرف حتى عند شرب الكحول (الخمر والمشروبات الخمرية) في فترة العلاج بالدواء، قد تكون تأثيرات الكحول أكثر وضاهة عند التمدج مع الأدوية المضادة للهيستامين مثل سليبي إيد.

### الحمل والإرضاع والحساسية

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت حاملاً أو تويني الحمل. لا يوجد دليل على أن الدواء يسبب تشوهات خلقية، ولكن لا يتم إجراء دراسات لإثبات سلامة استعمال الدواء للطور الجنين. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت مرضعة أو تويني الإرضاع. تتنقل كميات صغيرة من الدواء إلى حليب الأم، هناك إمكانية أن يصبغ الحليب الذي يرضع من حليب الأم، سرعان الضئب أو مثيراً بشكل غير عادي. وعلاوة على ذلك، قد يؤثر الدواء على الحليب.

### القيادة واستعمال الآلات

أثناء استعمال الدواء يجب توخي الحذر عند قيادة السيارة. تشغيل الآلات الخطرة أو في نشاط يتطلب اليقظة. لأن استعمال سليبي إيد قد يضعف اليقظة في اليوم التالي لتناول الدواء.

### معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء:

يحتوي سليبي إيد على أقل من 23 مغ صوديوم في القرص ولذلك يجب اختياره خلافاً من الصوديوم.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية الاعتيادية عادةً للبالغين وللأطفال من 12 سنة وما فوق هي: نصف قرص حتى قرص، حوالي نصف ساعة قبل النوم. هذا الدواء غير مخصص للرضع وللأطفال تحت جبل 12 سنة.

### لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج: لا يجوز استعمال سليبي إيد لأكثر من عشرة أيام متتالية. إذا استمر اضطراب النوم لأكثر من عشرة أيام، يجب التوجه إلى الطبيب.

### طريقة التناول

يجب على سليبي إيد مع الماء. يمكن تناول الدواء مع الطعام. يجب تناول سليبي إيد قبل النوم فقط.

يجب إخراج القرص عن طريق قشر ورقة التغليف

في زاوية البليستر (الوجه)، في المكان المطبق

عليه **PEEL&PUSH**. لا يجوز دفع القرص

بقوة خارجاً عبر ورقة التغليف، لأن القرص قد ينكسر.

سحق/شطر/مضغ

يمكن شطر القرص.

لا توجد معلومات بخصوص سحق/مضغ القرص.

إذا تناولت جرعة أخرى عن طريق الخطأ فقد تشعر ب:

- نعاس شديد
- جفاف وخدر في الفم، في الأنف وفي الحلق
- احمرار في الوجه
- ضرب قلب سريع، تخفق بقوة أو غير منتظمة
- ضيق تنفس
- هلوسات
- اختلاجات تشنجات
- أرق
- تخلقت مؤسعة

إذا تناولت جرعة زائدة أو بلع طفل عن طريق الخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام. تحقق من

المنصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء.

ضع النظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بشأن استعمال

الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، قد يسبب استعمال سليبي إيد أعراضاً جانبية عند بعض المستخدمين. لا تفرح من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل أن تعاني من أي منها.

إذا كنت فوق جبل 65 سنة، فقد يكون الامتثال لظهور أعراض جانبية أكبر.

الأعراض الجانبية التالية هي الأكثر شيوعاً. تكون

عادة متوسطة وتختفي بعد فترة زمنية قصيرة:

نعاس خلال اليوم التالي من استعمال الدواء

دوخة

نقص التنسيق

جفاف في الفم، في الأنف وأو في الحلق

شعاع

سعال (مع ضعف) عضلات

هيوان أنفي لزج

أعراض جانبية وخيمة وتكون نادرة.

يجب التوجه إلى أرق وقت ممكن إلى الطبيب إذا

تعاني من:

- ضرب قلب سريع، تخفق بقوة أو غير منتظمة
- صعاب عدم تنفص
- صعوبة في التبول
- إسك
- شعاع
- تشنجات
- عصبية

عدم دواء

تنطق

اغصام

تشوش الرؤية

زيادة أرقع المعدة

إذا ظهر أحد أعراض جانبية، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة: عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن أعراض جانبية:

يمكن الإبلاغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة في خلال القرص على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية" مع ملصق علاج دولي "الموجود في صفحة البيت الإلكتروني لوزارة الصحة ([www.health.gov.gov](http://www.health.gov.gov)) الذي يوجه إلى الاستمارة الإلكترونية للإبلاغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق النسخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.au>

بالإضافة، يمكن التبليغ لشركة بادجيس بواسطة العنوان التالي:

[Padajis.co.id](mailto:Padajis.co.id)

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب الاستعمال بعد حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع ومجال نظرهم وبذلك تمنع التسمم. لا تستيب التقيود عن معلومات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية.

### 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المواد الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على: Microcrystalline Cellulose, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, FD&C Blue #1 Aluminium Lake.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: قرص بيضوي لونه أزرق سمواي، مع خط شطر في جانب واحد وختم "L441" في الجانب الأخر.

الأقراص مرزومة بعبوة بليستر تحتوي على 16 قرص.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه: بادجيس إسرائيل

وكالات المصن: شارع ريكيت 1، شوما،

اسم المصن وعنوانه: شركة بريجهو، الجان، ميشيفين، الولايات المتحدة.

تم الترخيص في أيار المتحد.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 131-07-30938.

التبسيط وتسهيل القراءة: تم تصياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

07.05.2023