

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיים) התשמ"א – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אמטריציטבין/טנופובייר טבע טבליות מצופות

הרכב

כל טבלה נמצופה מכילה:

אמטריציטבין 200 מ"ג (Emtricitabine 200mg)
טנופובייר דיסופרוקסיל (כפוסfat) 245 מ"ג (Tenofovir Disoproxil (as Phosphate) 245mg)

למייד על מרכיבים בלתי פעילים וארגנים ראה סעיף 2 - "מייד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מייד נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מייד תמצית' על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה לשלה.

התרופה מיועדת למבוגרים מעל גיל 18 שנים.

בנוסף לעalon, לאמטריציטבין טנופובייר טבע קיימת חוברת מידע בטיחותי למטופל. חוברת זו מכילה מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בתרופה ולפעול על פיו. יש לעיין בחוברת מידע בטיחותי למטופל וובלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את החוברת לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

אמטריציטבין טנופובייר טבע היא טיפול ב齊hom החיסוני האנושי (HIV) במבוגרים בני 18 שנים ומעלה, בשילוב עם תרופות אחרות לטרוויראליות נוספת.

קבוצה רפואייתית:
מעכבי טרנסקריפטאז-הופכי, נוגדי נגיפים

אמטריציטבין טנופובייר טבע **מכילה שני חומרים פעילים**, אמטריציטבין וטנופובייר דיסופרוקסיל. שני חומרים פעילים אלה הם תרופות נוגדות נגיפי רטרו המשמשות לטיפול ב齐hom-B-HIV. אמטריציטבין הוא מעכב טרנסקריפטאז-הופכי נוקלאוזידי, ופעולתו היא הפרעה לפעולות הרגילה של מוכחות בדרך כלל כמעכבי טרנסקריפטאז-הופכי נוקלאוזידי (NRTIs) ופעולתן היא הפרעה לפעילויות (טרנסקריפטאז-הופכי) אשר חיוני לתהיליך השכפול של נגיף ה-HIV.

- **אמטריציטבין טנופובייר טבע משמשת לטיפול ב齐hom הכנגי 1 (1-HIV), למבוגרים בני 18 שנה ומעלה.**
 - יש להשתמש תמיד באמטריציטבין טנופובייר טבע בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול ב齐hom ב-HIV.
 - ניתן ליטול אמטריציטבין טנופובייר טבע במקום ליטול בנפרד אמטריציטבין וטנופובייר דיסופרוקסיל כאשר מדובר באותו מינונים.

תרופה זו אינה מרפאת **齊hom ב-HIV**. בעת נטילת אמטריציטבין טנופובייר טבע אתה עדין עלול לפתח **齊homים או מחלות אחרות הקשורות ל齐hom ב-HIV**.

- **אמטריציטבין טנופובייר טבע גם משמשת להפחחת הסיכון להדבקות ב-1-HIV במבוגרים**, כאשר נוטלים את התרופה לטיפול יומי, בשילוב עם התנהגות מינית בטוחה:
ראה סעיף 2, רשימת אמצעי ההירות שיש לנקט נגד הדבקות ב-1-HIV.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאמטריציטבין, טנופובייר, טנופובייר דיסופרוצסיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מרכיבת התרופה (רשומים בסעיף 6).
- **אם אחד הדברים הללו חל לגביך, עליך לספר על כך לרופא מייד.**

ازהירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני השימוש באמטריציטבין טנופובייר טבע, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות ב- HIV:

אמטריציטבין טנופובייר טבע יכולה לעזור לך בהפחחת הסיכון בהדבקות ב- HIV רק אם טרם נדבקת.

- **לפני תחילת הטיפול באמטריציטבין טנופובייר טבע, عليك לא להיות נשא של HIV על מנת להפחית את הסיכון להדבקות ב- HIV.** עליך לבדוק על מנת לוודא שאין כבר נשא של HIV. אל תיטול את התרופה להפחחת הסיכון אלא אם ידעת כי איןך נשא של HIV. נשאי HIV חייבים ליטול אמטריציטבין טנופובייר טבע בשילוב עם תרופות אחרות.
- **בדיקות רבות לנשאות HIV עלולות שלא לאבחן הדבקה שהתרחשה לאחרונה.** במידה והנוך חוליה במחלה דמוית שפעת, יתכן כי נדבקת לאחרונה ב- HIV. הסימנים היכולים להעיד על הדבקות ב-HIV הינם:

- עייפות
- חום
- כאבי שרירים או מפרקים
- כאבי ראש
- הקאות או שלשלולים
- פריחה
- זיעת לילה
- בלוטות לימפה מוגדלות בצוואר או במפשעה

דוח לרופא שלך על כל兆לה דמוית השפעת - בין אם במהלך החודש הקודם הקודם להתחלה הטיפול באמטריציטבין טנופובייר טבע או בכל עת במהלך נטילת התרופה.

ازהירות ואמצעי זהירות

בזמן נטילת אמטריציטבין טנופובייר טבע על מנת להקטין את הסיכון בהדבקות ב- HIV:

- **יש ליטול אמטריציטבין טנופובייר טבע כל יום על מנת להקטין את הסיכון, לא רק כשהאתה חושב שאתה בסיכון להדבקות ב- HIV.** אל תחסיר מנה של אמטריציטבין טנופובייר טבע, או תפסיק ליטול את התרופה. החסירה של מנה עלולה להגדיל את הסיכון שלך להדבק ב- HIV.

- **הבדק באופן שיגרתי ל- HIV.**

- **דוח מיד לרופא אם אתה חושד שנדבקת ב- HIV.** יתכן והרופא יערוך בדיקות נוספות על מנת לוודא כי איןך נשא של HIV.

- **נטילת אמטריציטבין טנופובייר טבע בלבד אינה מבטיחה אי הדבקות בנגיף.** לפיכך عليك לנוקוט בעועלות הבאות:

- **הקפד על התנהלות מינית בטוחה.** השתמש בקונדומים על מנת לצמצם את המגע עם נזאל הזרע, נזאלים וגינאלים או דם.
- **אל תחלק ציוד אישי היכיל דם או נזאל גוף,** כגון מברשות שיניים וסכינים גילוח.
- **אל תחלק או תעשה שימוש חוזר במוחטים או אביזרי הזרקה או ציוד רפואי.**
- **היבדק למחלות נוספות המועברות מגע מיני כמו עגבת וזיבבה.** זיהומיים אלהאפשרים ביותר קלות לנגיף ה HIV להדבק אותך.

היוועץ ברופא המטפל אם יש לך שאלות נוספות על איך למנוע הדבקות ב- HIV או לגבי הדבקת אנשים אחרים ב- HIV.

בזמן נטילת אמטריציטבין טנופובייר טבע לטיפול ב- HIV או להפחית הסיכון להדבק ב- HIV:

• אמטריציטיבין טנופובייר טבע עלולה לפגוע בצליות. לפני תחילת ובמשך הטיפול הרופא עשוי להפנות לבדיקות דם כדי להעריך את תפקוד הצליות. ספר לרופא אם הייתה לך מחלת כליות, או אם הבדיקות הצביעו על בעיות בצליות. אם יש לך בעיות בצליות, הרופא עשוי להמליץ לך להפסיק לטבול את התרופה או אם הנך נשא HIV הרופא עשוי להנחותך לטבול את התרופה בתדריות נמוכה יותר. הטיפול באמטריציטיבין טנופובייר טבע איינו מומלץ כאשר קיימת מחלת כליות חמורה או למי שמטוסל בדיאליזה.

בעיות עצומות (המופיעות ככאבי עצמות מתמשכים או מחמירים אשר לעיתים גורמות לשברים) עלולות להופיע גם בגלל נזק לתאי אבובית הכליה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"). ספר לרופא שלך אם יש לך כאבי עצומות או שברים עצומות.

טנופובייר דיסופורוקסיל עלול גם לגרום לירידת מסת עצם. אובדן העצם המשמעותי ביותר בינויים קליניים בקרב מטופלים שטופלו ל- HIV עם טנופובייר דיסופורוקסיל בשילוב עם-מעכבי פרוטאצ מואץ.

בצליות, ההשפעות של טנופובייר דיסופורוקסיל על בריאות העצם לטוח רחוק ויכולו לשבר עתידי במובגרים הין בלתי ודאיות.

ספר לרופא שלך אם אתה יודע שהינך סובל מאוסטאופורוזיס. מטופלים עם אוסטאופורוזיס נמצאים בסכנה מוגברת לשברים.

• שוחח עם הרופא אם יש לך עבר של מחלת כבד, כולל דלקת כבד. לחולים ב- HIV גם במחלה כבד (כולל דלקת כבד חרונית B או C), המטופלים בתרופות נגדות נגיפי רטרו, נתונים בסיכון רב יותר לפתח סיבוכים חמורים בכבד העולאים להיות קטלניים. אם יש לך דלקת כבד B או C, הרופא ישකול בקפידה מה משטר הטיפול הטוב ביותר עבורך.

• דע את מצבך מבחינת הדימות בגנייף דלקת כבד B (HBV). לפני שתתחיל לטבול אמטריציטיבין טנופובייר טבע. אם יש לך דלקת כבד B, קיים סיכון רציני לעליות כבד בעקבות הפסקת נטילת התרופה, בין אם יש לך ובין אם אין לך HIV. חשוב לא להפסיק לטבול אמטריציטיבין טנופובייר טבע בלי להיוועץ ברופא: ראה בסעיף 3 "אל תפסיק לטבול אמטריציטיבין טנופובייר טבע"

• היועץ ברופא אם גילך מעל 65 שנים. התרופה לא נחקרה במטופלים שגילם מעל 65 שנים.

ילדים וمتבגרים

אמטריציטיבין טנופובייר טבע אינה מיועדת לשימוש ילדים וمتבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

תגובהות בין תרופתיות

אל תיטול אמטריציטיבין טנופובייר טבע אם אתה כבר נוטל תרופות אחרות המכילות את הרכיבים של אמטריציטיבין טנופובייר טבע, (אמטריציטיבין טנופובייר דיסופורוקסיל) או כל תרופה נגדות נגיפים אחרת המכילה טנופובייר אלפנאמיד, למיבודין או אדפובייר דיבוקסיל.

אם אתה לוקח, או אם לך歛ת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

נטילת אמטריציטיבין טנופובייר טבע יחד עם תרופות העולאות לפגוע בצליות שלך: חשוב במיוחד לספר לרופא אם אתה נוטל תרופות אחרות, ביניהן:

- אמינוגליקוזידים (טיפול בזיהום חיידקי)
- אמפולטריצין B (טיפול בזיהום פטריית)
- פוסקרנט (טיפול בזיהום נגיפי)
- גנציקלוביר (טיפול בזיהום נגיפי)
- פנטמידין (טיפול בזיהומי)
- ונקזומיצין (טיפול בזיהום חיידקי)
- אינטראלקין-2 (טיפול בסרטן)

- סידופובי (טיפול בזיהום נגיפי)
- תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (SAsIDs), לשיכור כאבי עצמות או שרירים)

אם אתה נוטל עוד תרופה נגד נגיפים הנקראט מעכבר פרוטאץ' לטיפול ב-HIV, הרופא עשוי להפנותך לביקורת דם כדי לעקוב בקפידה אחר תפקוד הכליות.

חשיבות גם שתספר לרופא אם הנר נוטל לדיפוסויר/סופוסוביר, סופוסוביר/ולפטסביר או סופוסוביר/ולפטסביר/ווקסילפריבר לטיפול בזיהום בדלקת CBD.

נטילת אמטריציטיבין טנופובי טבע עם תרופות אחרות המכילות דידנוזין (טיפול בזיהום ב- HIV): נטילת אמטריציטיבין טנופובי טבע עם תרופות נגד נגיפים אחרות המכילות דידנוזין עלולה להעלות את רמות הדידנוזין בدم ועלולה להפחית את ספירת תא CD4. לעיתים נדירות דוח על דלקת של הלבלב וחמצת לקטית (עודה של חומצה לקטית בדם), שלפעמים גורמות למות, בעת נתילה בו-זמןית של תרופות המכילות טנופובי דיספרוקסיל ודידנוזין. הרופא ישකול בקפידה האם לטפל בך בשילוב של טנופובי ודידנוזין.

ספר לרופא אם אתה נוטל את אחת מהתרופות האלה. אם אתה נוטל או אם נטلت לאחרונה תרופות אחרות כלשהן, או אם יתכן שתיטול תרופות אחרות כלשהן, ספר על כך לרופא או ברוקח.

שימוש עם מזון ושתייה
כאשר ניתן, יש ליטול אמטריציטיבין טנופובי טבע עם מזון.

הירין והנקה
אם הנר הרה או מניקה, חשוב שיתacen שאת הרה, או מתכוננת להרות, היועצי ברופא או ברוקח לפני נתילה של תרופה כלשהי.

אם נטلت אמטריציטיבין טנופובי טבע במהלך ההירין, יתכן שהרופא יבקש מכם לעמוד בבדיקות דם סדיות ובבדיקות אבחון אחרות כדי לעקוב אחר התפתחות יולדת. ילדים שאמהותיהם נטלו בהירין מעכבי טרנסקריפטאז-הופכי נוקלאוזידי (IsNRTs), התעלמת מההגנה מפני HIV עלתה על הסיכון לתופעות לוואי.

- **אין להניך במהלך הטיפול אמטריציטיבין טנופובי טבע.** הסיבה לכך היא שהחומרים הפעילים בתרופה זו עוברים לחלב אם.
- **הנקה אינה מומלצת בנשים החיות עם נגיף ה- HIV כיוון שזיהום ה- HIV עלול לעורר לתינוק דרך חלב האם.**
- **אם הינך מניקה או שוקלת הנקה, עליך להיעזר ברופא ש郎 בהקדם האפשרי.**

נהיגה ושימוש במכונות
אם אמטריציטיבין טנופובי טבע עלולה לגרום לסתחרחות. אם אתה חש סחרחות בעת נטילת התרופה, **אין לנווג או להפעיל כלים או מכונות.**

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה פחתות מ- 23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או ברוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המומלץ של אמטריציטיבין טנופובי טבע לטיפול ב- HIV או להפחחת הסיכון להדבקות ב-HIV, הינו:
מבודרים: בטבליה אחת ליום.
כאשר ניתן, יש ליטול את אמטריציטיבין טנופובי טבע עם מזון.

אין לעורר על המנה המומלצת.

במקרה של קשי בבליעה, ניתן, לרשך את הטבילה באמצעות קצה כפיה (או לחלקה לחלקים קטנים יותר, אך יש להקפיד לבלווע את כל חלקי הטלילה מיד) לאחר מכן לערוב את האבקה בכ- 100 מ"ל (חצי כוס) מים, מי'ז תפוזים או מי'ז ענבים ולשתות מיד.

- **יש ליטול תמיד המין שעליו המלאץ הרופא.** כך תזודד שהתרופה שלא ייעלה לחולטיין, ותפחית את הסיכון להתקפות חותם נוגדות לטיפול. אל תנסה את המין ללא הוראה מהרופא.
- **אם אתה מטופל בשל זיהום ב- HIV הרופא שלך ירשם אמטריציטבין טנופובייר טבע עם תרופות נוגדות גיגי רטרו אחרות.** להנחיות לגבי אופן הנטילה של תרופות נוגדות גיגי רטרו אחרות, אנא עיין בעלונים לצריך של תרופות אחרות אלה להדרכה כיצד יש ליטול תרופות אלה.
- **אם אתה מבוגר הנוטל אמטריציטבין טנופובייר טבע להפחחת הסיכון להדבקות ב- HIV, יש ליטול אמטריציטבין טנופובייר טבע בכל יום לא רק כשאתה חושב שאתה בסיכון להדבקות ב- HIV.**

פנה לרופא שלך בכל שאלה לגבי מניעת הדבקות ב - HIV או מניעת הדבקה של אנשים אחרים ב- HIV.

אם נטלת אמטריציטבין טנופובייר טבע במיןון גבוה מהנדרש

אם נטلت בטיעות אמטריציטבין טנופובייר טבע במיןון גבוה מהנדרש, פנה לרופא או לחדר המין הקרוב ביותר והיוועץ בהם. הבא את אריזת התרופה עמר כדי שתוכל לתאר במדויק מה נטלה.

אם החמצת מנתה

חשוב לא להחמייך מנתה של אמטריציטבין טנופובייר טבע.

אם הבדיקה בפרק 12 שניות מהשעה שבה בדרכך כל נטול אמטריציטבין טנופובייר טבע, יש ליטול את הטלילה בהקדם האפשרי, עדיף עם מזון. לאחר מכן יש ליטול את המנה הבאה בשעה הרגילה.

אם הבדיקה בפרק 12 שניות או יותר לאחר השעה שבה בדרכך כל נטול אמטריציטבין טנופובייר טבע, אל תיטול את המנה שהחמצת. המtan וקח את המנה הבאה בשעה הרגילה, עדיף עם מזון.

אם הקאת פחות משעה אחת אחרי נטילת אמטריציטבין טנופובייר טבע, יש ליטול טבילה נוספת. אם הקאת יותר משעה אחת אחרי נטילת אמטריציטבין טנופובייר טבע, אין צורך ליטול טבילה נוספת.

אל תפסיק ליטול אמטריציטבין טנופובייר טבע

- **אם אתה נטול אמטריציטבין טנופובייר טבע לטיפול ב- HIV, הפסיקת נטילת הטלילות עלולה להפחית את היילות של הטיפול נגד HIV שעליו המלאץ הרופא.**
- **אם אתה נטול אמטריציטבין טנופובייר טבע להפחחת הסיכון להדבקות ב- HIV, אל תפסיק ליטול אמטריציטבין טנופובייר טבע או להחמיר אף מנתה.** הפסיקת השימוש בתרופה או החמצת מנתה, עלולה להגדיל את הסיכון בהדבקות ב- HIV.

אל תפסיק ליטול אמטריציטבין טנופובייר טבע בלי להיוועץ ברופא.

- **אם יש לך זיהום מסווג הפטיטיס B,** חשוב במיוחד לא להפסיק את הטיפול באמטריציטבין טנופובייר טבע בלבד להיוועץ קודם ברופא. אחריו הפסיקת הטיפול יתאפשר רק לאחר בדיקות דם במשך מספר חודשים. בחלק מהמטופילים עם מחלה כבד מתקדמת או שחמת לא מומלץ להפסיק את הטיפול מכיוון שהדבר עלול לגרום להחמרה דלקת הכלב, עלולה לסכן את חייהם.
- **ספר מייד לרופא על תסמינים חדשים או יוצאי דופן שהופיעו אחרי שהפסיקת את הטיפול, במיוחד jeśli אתה מקשר לזמן מסווג הפטיטיס B.**

אין ליטול תרופות בחושרי בדוק התווית ומהנה בכל פעע שהן נטול תרופה. הרכיב משקפיים אם הנר זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באמטריציטבין טנופובייר טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אפילו אחת מהם.

ספר לרופא על כל אחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי רציניות אפשריות: ספר מיד לרופא

- **חמצת לקטית** (עדף חומצה לקטית בדם) היא תופעת לוואי נדירה. עם זאת, היא עלולה לסכן את החיים. חמצת לקטית מופיעה לעיתים קרובות יותר בנשים, במיוחד אם יש להן עדף משקל, ובאנשים עם מחלת CBD. סימנים אפשריים של חמצת לקטית:
 - נשימה عمוקה ומהירה
 - ישוניות
 - בחילות, הקאות
 - כאבי בטן

אם אתה סבור שיתכן שיש לך חמצת לקטית, פנה מיד לטיפול רפואי.

- **כל סימן לדלקת או לדיזום.** בחלק מהמטופלים עם ז'יהם מתקדם ב-HIV (אידס) ועمر של זיהומי תורפה (זיהומים המופיעים באנשים עם מערכת חיסון חלה), סימנים וטסמים של דלקת מזיהומים קודמים עלולים להופיע זמן קצר אחרי תחילת טיפול נגד-HIV. הסבירה היא שתסמים אלה נגרמים בשל טיפול בתגובה החיסונית של הגוף, המאפשר לאגף להילחם בזיהומים קיימים ללא טסמים ברורים.

- **מחלות אוטואימוניות,** מצב שבו מערכת החיסון תוקפת רקמות בריאות בגוף, העשו להופיע גם לאחר התחלת הטיפול. שים לב לכל טסמי ז'יהם או טסמים אחרים, כמו:
 - חולשת שרירים
 - חולשה המתחילה בכפות הידיים והרגליים ומתפשטה מעלה לכיוון הגו
 - דפיקות לב, רעד או פעילות יתר (היפראקטיביות)
- אם תבחן בתסמים אלה או בסימן כלשהו לדלקת או לדיזום, פנה מיד לטיפול רפואי.

תופעות לוואי אפשריות:

תופעות לוואי שכיחות מודרנית (עשויות לפגוע בייתר ממטופל אחד מתוך 10 אנשים):

- שלשול, בחילות, הקאות
- סחרחות, כאב ראש
- פריחה
- הרגשת חולשה

"**תcken שבבדיקות הדם יראו גם:**

- ירידת ברמת הזרchan בדם
- עלייה ברמת הקריאטין קינאז

תופעות לוואי שכיחות (עלולות לפגוע بعد מטופל 1 מתוך 10 אנשים):

- כאבים, כאבי בטן
- נדודי שינה, חלומות חריגים
- בעיות בעיכול הגורמות לאי נוחות אחרי ארוחות, תחושת נפיחות, גדים בבטן
- פריחות (כולל נקודות אדומות או כתמים גדולים אדומים, לפעמים עם שלפוחיות ונפיחות של העור), העולות להיות תשובות אלרגיות, גרד, שינוים בצבע העור כולל היוציארות כתמים כהים בעור
- תשובות אלרגיות אחרות, כמו צפצופים, נפיחות או תחושת שחרור קלה.

"**תcken שבבדיקות יראו גם:**

- ספירה נמוכה של תא דם לבנים (ספירה מופחתת של תא דם לבנים עלולה להגביר את הנטייה לדיזהומיים)
- רמה גבוהה של טריגליקידים (חומר שומן), מריה או סוכר בדם
- בעיות בכבד ובלבול

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות לפגוע بعد מטופל אחד מתוך כל 100 אנשים):

- כאבים בבטן הנגרמים מדלקת של הלבלב
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או האגרון
- אנמיה (ספירה נמוכה של תאי דם אדומים)
- פירוק שרירים, כאבי שרירים או חולשת שרירים העולאים להופיע עקב נזק לתאי אבובית הכליה.

"**תיכון** שבבדיקות יראו גם:

- ירידה ברמות האשלאגן בדם
- עלייה ברמות הקריאטינין בדם
- שינויים בשתן

תופעות לוואי נדירות (עלולות לפגוע بعد מטופל אחד מתוך כל 1,000 אנשים):

- חמצת לקטית (ראה "תופעות לוואי חמורות אפשריות")
 - כבד שומי
 - הצהבהה של העור או העיניים, גרד או כאבי בטן הנגרמים מדלקת של הכליה
 - דלקת של הכליות, השתנה מרובה וצימאון, אי ספיקת כליות, נזק לתאי אבובית הכליה
 - התרככות העצמות (עם כאבי עצמות. לעיתים מצב זה גורם לשברים)
 - כאביגב הנגרמים מע比ות בכליות נזק לתאי אבובית הכליה העולול להיות קשור לפירוק שריר, התרככות של העצמות (עם כאבי עצמות, ולפעמים המצב גורם לשברים), כאבי שרירים, חולשת שרירים וירידות ברמות האשלאגן או הזרחן בדם.
- אם שמת לב לכל תופעת לוואי המופיעה בעלון זה, או אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה,** ספר לרופא או לרוקח.

התדריות של תופעות הלוואי הבאות אינה ידועה:

- בעיות בעצמות. אצל חלק מהמטופלים הנוטלים תרופות נוגדות נגיפי רטרו משולבות, כמו אמטריציטיבן טנופובי טבע, עלולה להתרפתח מחלת עצם הנקראט נמק העצם (אוסטאונקרוזיס, מותם של רקמת עצם הנגרם מאובדן אספקת דם לעצם). נטילת תרופות מסווג זה במשך זמן רב, נטילת קורטיקוסטרואידים, שתית אלכוהול, מערכת חיסון חלה מאוד וודף משקל הם חלק מגורמי הסיכון הרבים להתרפות מחלת זו. סימני נמק העצם כוללים:
 - נזקשות מפרקים
 - כאבים ומחושים במפרקים (במיוחד במפרק הירך, בברך ובכתף)
 - קשי תנועה

אם תבחן באחד מהתסמינים הללו ספר לרופא.

במהלך טיפול בתרופות ל- HIV תיתכן עליה במשקל ברמות השומנים והגלוקוז בדם. הדבר קשור בחלוקת לשיקום הבריאות וסגנון החיים, ובמקרה של שומנים בדם לעיתים הדבר קשור בתרופות ל- HIV עצמו. הרופא יערוך בדיקות כדי לאתרא את השינויים האלה.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עיר להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעליה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כרך תמנעו הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התגובה (Date of expiry) המופיע על גבי האריזה. תאריך התגובה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן מתחה ל-25°C.**
- **יש לשמור באזירה המקורית על מנת להגן מלחות.**

- אריזת בקבוק: ניתן להשתמש בתרופה עד 60 ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה ולא יותר מתאריך התפוגה.
- **שים לב:** הבקבוק מכיל סופח לחות. אין לבלוע! יש להשאיר את הסופח בתוך הבקבוק ולסגור היטב את הבקבוק לאחר כל שימוש!
- אל תשליך כל תרופה לביב או לאשפה הביתית. יש להיוועץ ברוקח כיצד להשליך תרופות שאין משתמש בהן עוד. אמצעים אלה יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Mannitol, Low-substituted hydroxypropyl cellulose, Microcrystalline cellulose, Sodium stearyl fumarate, Polyvinyl alcohol, Titanium dioxide, Macrogol, Hypromellose, Talc, Iron oxide yellow, indigo carmine aluminium lake/ FD&C Blue

כיצד נראה תרופה ומה תוכן האריזה:
 טבלייה אובלית, מצופה בצבע ירוק עד ירוק בהיר. בצדיה האחד של הtablיה מוטבע "ET" ובצדיה השני, הtablיה חלקה.
 גודלי אריזות: 30 או 90 טבליות באrizת מגשית (בליסטר). 30 או 90 טבליות בבקבוק עם סופח לחות. יתכן ולא כל גודלי האריזות משווים.

שם הייצן ובעל הרישום וכתובתו:
 טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

עלון זה נערך ביוני 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות .

מספר רישום התרופה בפניו התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 162-68-35319

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נوشט בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.