

فوروسيميد إينوفامد

أقراص

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص على:

فوروسيميد 40 ملغ

Furosemide 40 mg

معلومات حول المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر
تُنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 -
"معلومات إضافية".

اقرأ النشرة يتعمّن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

(1) لأيّ غرض مخصص الدواء؟

التأثير الطبي

مدرّ للبول لعلاج الوذمة الرئوية، الوذمة المرافقة ل قصور القلب، تشمّع الكبد، مرض الكلى ولعلاج ضغط الدم المرتفع.

الفصيلة العلاجية: أدوية مدرّة للبول.

تعطى هذه الأدوية لعلاج الوذمة، حالة يوجد فيها في جسمك أكثر مما ينبغي من الماء. قد تحدث هذه الحالة جراء مشكلة في القلب، الرئتين، الكلى، الكبد، الأوعية الدموية أو ارتفاع في ضغط الدم.

يساعد فوروسيميد إينوفامد الكلى على التخلص من فائض الماء غير الضروري في الجسم.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة أو للسلفوناميدات الأخرى أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية").

• كنت تعاني من خلل خطيري في الكلى يمنع عملها كما ينبغي وإنتاج البول.

• وجد لديك نسب منخفضة جداً في الدم من البوتاسيوم، الصوديوم أو الشوارد الكهربائية الأخرى أو نقص حجم الدم (بإمكان الطبيب أن يقدم لك الإستشارة).

• وجد لديك تجفاف.

• وجد لديك إنخفاض في ضغط الدم.

• كنت تتناول إضافات البوتاسيوم أو مدرات البول الحافظة للبوتاسيوم لعلاج ضغط الدم المرتفع (مثل أميلوريد أو سيرونولاكتون).

• وجد لديك تغيير في مستويات الوعي والغيبوبة نتيجة تشمّع الكبد (إرهاق، ضعف، إحتباس الماء، غثيان أو تقيؤات، إنخفاض الوزن أو الشهية للطعام، إصفرار الجلد أو العينين، حكة) أو نتيجة إعتلال دماغي كبدى (إرتباك، تغيير في مستويات الوعي والغيبوبة نتيجة فشل كبدى).

• وجد لديك مرض أديسون (إنخفاض نسب هورمونات الكورتيكوستيرويدات التي يتم إفرازها).

• وجد لديك تشمّع الدجاجاتيس (غثيان أو تقيؤات، نسب مرتفعة من البوتاسيوم في الدم، نظم قلب بطيء، سريع أو غير إعتيادي).

• كنت مرضعة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ فوروسيميد إينوفامد، إحك للطبيب إذا:

• كنت تعاني من نقص حجم الدم (hypovolaemia) أو كنت معرضاً لخطورة تطور إنخفاض في ضغط الدم.

• كنت تعاني من إنخفاض نسب البروتينات في الدم (نقص بروتين في الدم - hypoproteinaemia) نتيجة خلل كلوي.

• وجد لديك إحتقان في الكبد (تدفق بطيء للدم عبر الأوعية الدموية) أو مشاكل أخرى في الكبد.

• وجدت لديك مشاكل في الكلى.

• ربما كنت تعاني من السكري. إذا كنت تتناول الإنسولين، فقد يحتاج الطبيب إلى ملاء المقدار الدوائي للإنسولين الخاص بك.

• كنت مسنناً، إذا كنت تتناول أدوية أخرى التي قد تسبب إنخفاض ضغط الدم وإذا وجدت لديك حالات طبية أخرى تشكل عوامل خطورة لإنخفاض ضغط الدم.

• كنت تعاني من مشاكل في غدة البروستاتا (prostate) أو من صعوبة في التبول.

• كنت تعاني من النقرس (gout).

• وجدت لديك مشاكل شاذة في الدم.

• كنت مقدماً على إجتياز فحوص دم أو بول.

الفحوص والتابعة

طوال فترة تناول هذا الدواء قد يحتاج الطبيب إلى مراقبة حالتك ويوجهك لإجراء فحوص دم.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية لخفض ضغط الدم (مثل أدوية من نوع مثبطات ACE، مثبطات ريتين، حاجبات ألفا، حاجبات قنوات الكالسيوم، أدوية مدرّة للبول، فينوثيازينات)
- أدوية لعلاج مرض نفسي (مثل بيموزيد، أميسولبريد، سرتيندول)
- أدوية لعلاج إضطرابات نظم القلب (مثل سوتالول، أميودارون، فليكاينيد)
- ديجوكسين (للقلب)
- موكسيسيلات لعلاج متلازمة رينو (Raynaud's syndrome)

• نيترات (لعلاج الذبحة الصدرية)

• ليثيوم (لعلاج الإكتئاب أو الهوس)

• سكرالقات لعلاج قروح المعدة

- كولستريرامين أو كوليستيرينول لعلاج الكولسترول المرتفع
- أدوية مضادات الإلتهاب غير الستيروئيدية (NSAIDs)، مثل إيبوبروفين أو نابروكسين
- أسبيرين (للألم)

• مضادات حيوية لعلاج التلوثات التي تؤثر على الكلى أو الأذنين (مثل سيفاكلور، كولستين، جنتاميسين، فانكوسين)

• أمفوتيريسين (لعلاج التلوثات الفطرية)

• كورال هيدرات (لعلاج الأرق)

• مضادات الإكتئاب (مثل مثبطات موناأمين أو أكسيداز - MAOIs)

• أدوية للسكري، مثل إنسولين أو أقراص

• مضادات الإختلاجات، مثل فينيتوئين أو كاربامازيبين

• كورتيكوستيرويدات أو مضادات الهيستامين (لعلاج ردود الفعل التحسسية)

• أدوية لعلاج إضطرابات الإصغاء والتركيز (ADHD)

• أدوية لعلاج السرطان، مثل الديدسلويكين

• ليفودوبا (لعلاج مرض باركينسون)

• أقراص منع الحمل

• الأروستاتيل لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال

• أدوية معينة لعلاج الربو، مثل ثيوفيللين أو سالبوتامول

• بروبينيسيد لمنع النقرس (gout)

• أدوية مُسهلة يتم تناولها طوال فترة طويلة

• أدوية أو منتجات طعام تحتوي على عرق السوس

إذا كنت مقدماً على إجتياز علاج تُستعمل فيه مخرجات العضلات شبيهة بـ كورار (مثل فيكورونوم) أو مواد مخدرة، فعليك إعلام الطبيب المخدّر، طبيب الأسنان أو الطبيب.

إستعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع الطعام.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

عليك الإمتناع عن شرب الكحول عندما تتناول فوروسيميد إينوفامد لأن هذا الأمر قد يسبب إنخفاضاً إضافياً في ضغط دمك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

يجب إستشارة الطبيب قبل تناول فوروسيميد إينوفامد إذا كنت حاملاً، تخططين للحمل أو كنت مرضعة.

السياقة وإستعمال الماكينات

لا تقدّ أو تشغلّ ماكينات إذا شعرت بتدني اليقظة بعد تناول فوروسيميد إينوفامد.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي فوروسيميد إينوفامد على لكتوز مونوهيدرات الذي يعتبر نوع من السكر. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل اللكتوز أو لا يمكنك هضم سكريات معينة، إستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليوم من الصوديوم (23 ملغ) للقرص، وبالتالي يعتبر "خالياً من الصوديوم". أنظر أيضاً الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يلتزم الطبيب المقدار الدوائي لكل مريض وفق حالة وإستجابة المتعالج.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا تتوفر معلومات حول سحق/ مضغ القرص.

يمكن شطر القرص عند خط الشطر.

يجب بلع الأقراص مع القليل من الماء.

يمكن تناول الدواء مع الطعام.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً كبيراً

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخبر مكالبة الدواء. تشمل علامات فرط المقدار الدوائي على التجفاف وتغيرات في نسب مواد معينة في الدم.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد الإعتيادي، تناول المقدار الدوائي التالي ورتدرك بذلك ثم تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي. لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فوروسيميد إينوفامد قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهد من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوجه إلى الطبيب أو إلى المستشفى فوراً إذا وجدت لديك إحدى الأعراض الجانبية التالية:

- رد فعل تحسسي خطير الذي قد يشمل طفح جلدي، حكة، التهاب الجلد، تقشر الجلد، حساسية تجاه ضوء الشمس أو مصابيح التسفع أو سخونة، إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة أو صعوبة في التنفس أو البلع.
- بولصات أو تقشر الجلد حول الشفتين، العينين، الفم، الألف والأعضاء التناسلية، أعراض شبيهة بالإنفلونزا وسخونة يمكن أن تشكل حالة تسمى متلازمة ستيفنس جونسون.

- التهاب الأوعية الدموية (vasculitis)، الذي قد يؤدي إلى طفح، سخونة وآلام في المفاصل أو العضلات) والتهاب الكلى (الذي قد يغير عدد المرات التي تتبول فيها أو قد تشاهد دم في البول، قد تعاني من سخونة، شعور بالنعاس، أو تلاحظ إنتفاخاً، مثلاً، في الكاحل).

• خثرة دموية (تؤدي إلى ألم، إنتفاخ أو حساسية في الرجلين).

أعراض جانبية إضافية

عليك إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض التي تظهر

على أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- تجفاف، تغير في توازن السوائل والمواد في الجسم (مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم والمغنيزيوم) الذي يؤدي إلى جفاف الفم، ضعف، إرهاق أو نعاس، عدم هدوء، تشنجات، ألم في العضلات، ضعف أو تقلصات، ضغط دم منخفض الذي يؤدي إلى إخفاض التركيز وردود فعل بطيئة، صعوبة في التبول، نظم قلب سريع أو غير منتظم، غثيان وتقيؤات

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

• نقص حجم الدم (hypovolemia)

• إرتفاع قيم الكرياتينين واليورينا (urea) في الدم (يظهر في فحوص الدم)

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعمل من بين 1,000:

- فقر الدم الذي يؤدي إلى إرهاق، ضيق في التنفس، نرف غير عادي أو كدمات
- تغيرات في الجسم التي تظهر في الفحوص، مثل نسب الكولسترول، الجلوكوز، حمض اليوريك

(gout)

- تغيرات في الرؤية التي تشمل تشوش الرؤية أو رؤية صفراء

- دوام، شعور بضغط في الرأس، صداع، نعاس، ضعف، تغيرات في الرؤية، جفاف في الفم، دوام عند الوقوف

• عدم إنتظام نظم قلب

• تقلصات عضلية أو ضعف

• تغيرات في كمية البول أو في الحاجة إلى التبول

• إرهاق

• جفاف في الفم، عطش، غثيان أو تقيؤات، تغيرات في حركات الأمعاء تشمل

إسهال وإمساك

• صمم (أحياناً غير عكوس)

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- تغيرات في خلايا الدم، مثل كمية خلايا الدم البيضاء، إنخفاض عدد الصفائح الدموية الذي يؤدي إلى طفح، سخونة، تعرق، إرهاق وإنخفاض الوزن.
- سوف يجري الطبيب فحوص دم روتينية للتأكد من عدم حدوث تغيرات
- إضطراب نفسي (لا يمكن تصنيفه بشكل آخر) يؤدي إلى أوهام، هوسات، شعور غير منظم

- كلام مبتدل ونحز أو شعور بوخز

- إرتباك، صداع، إرهاق، شعور عام غير جيد، سخونة

- طنين في الأذنين، ضعف في السمع الذي يكون عادة قابل للعكس

- أعراض الصدمة، مثل تغيرات في نظم القلب، ضيق في التنفس، جلد طيب وبارد

- التهاب البنكرياس الذي يؤدي إلى آلام في البطن أو في الظهر وغثيان

- تغيرات في الكبد التي تؤدي إلى إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين

- طفح جلدي

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

- حركات عضلية لا إرادية

- التهاب أو فشل الكلية الأخر الذي قد يؤدي إلى ألم في الظهر أو إلى تغيرات في كمية البول أو في الحاجة إلى التبول

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):

- سوء الحالة بعد أن كان هناك بالفعل توازن للسوائل أو لمواد في الجسم

- بنار طفيح منتشر حاد (AGEP) (طفح حاد ومصحوباً بسخونة، يسببه دواء)

- دوام، إغماء وفقدان للوعي (يحدث بسبب إنخفاض ضغط الدم المصحوب

- أعراض)

- إنخفاض نسب البوتاسيوم في الجسم

أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال:

- إرتفاع في خطورة عدم إنغلاق القناة الشريانية (ductus arteriosus)

- أو تأخر إنغلاقها لدى الخدج

- حمص في الكلى لدى الرضع

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما

تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط

"تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية

لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج

المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقاص تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين الدواء في مكان بارد وجاف، بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

- لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Lactose monohydrate, maize starch, sodium starch glycolate (type A), magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص غير مطلية، مستديرة، بلون أبيض - كريم، ذات طرف مائل مُسطح، مختوم على أحد الجوانب "F" و "40" المفصولة بخط الشطر والجانب الآخر أتمس.

نوع العبوة: يتوفر الدواء ضمن عبوة كرتون تحتوي على ليوحات/بليسترات بإجمالي 30 قرصاً.

صاحب الإمتياز والمستورد: إينوفامد فارما م.ض.م.ص.ب. 2349، بني براك.

إسم المنتج: أروبيندو فارما م.ض.م.ص.ب. حيدر آباد، تيلانجانا، الهند.

تم إعداد النشرة في آب 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

174-14-36620

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.