

עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירם) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

| | | | | | |
|--|---|--|---|---------------|---|
| ג'ארדיינס דואו® 12.5 מ"ג / 850 מ"ג <table border="0"> <tr> <td>טבליות מצופות</td> <td>ג'ארדיינס דואו® 5 מ"ג / 850 מ"ג</td> </tr> </table> <p>כל טבליה מצופה מכילה 12.5 מ"ג אמפליג'פלוזין (empagliflozin) ו- 850 מ"ג מטפורמין (metformin HCl) הידrocולוריד (metformin HCl) HCl</p> | טבליות מצופות | ג'ארדיינס דואו® 5 מ"ג / 850 מ"ג | ג'ארדיינס דואו® 12.5 מ"ג / 1000 מ"ג <table border="0"> <tr> <td>טבליות מצופות</td> <td>ג'ארדיינס דואו® 5 מ"ג / 1000 מ"ג</td> </tr> </table> <p>כל טבליה מצופה מכילה 12.5 מ"ג אמפליג'פלוזין (empagliflozin) ו- 1000 מ"ג מטפורמין (metformin HCl) הידrocולוריד (metformin HCl) HCl</p> | טבליות מצופות | ג'ארדיינס דואו® 5 מ"ג / 1000 מ"ג |
| טבליות מצופות | ג'ארדיינס דואו® 5 מ"ג / 850 מ"ג | | | | |
| טבליות מצופות | ג'ארדיינס דואו® 5 מ"ג / 1000 מ"ג | | | | |

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 " מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
ג'ארדיינס דואו אינה מיועדת לאנשים עם סוכרת מסווג 1 או לאנשים עם חמצת קוטויטית סוכרתית (diabetic ketoacidosis).

מידע חשוב:

מטפורמין, אחד המרכיבים בג'ארדיינס דואו, עלול לגרום לתופעת לוויא נדירה אף חמורה הנקראת חמצת לקטית (lactic acidosis) (הצטברות של חומצה לקטית בدم) שעהולה לגורם מוות. חמצת לקטית היא מצב חירום רפואי טיפול בבית חולים. אם אתה חש סימנים של חמצת לקטית הפסיק ליטול ג'ארדיינס דואו ופנה לרופא מיד או גש לחדר המין של בית החולים הקרוב ביותר (ראה גם סעיף 4 - "תופעות לוואי").

1. למה מיועדת התרופה?

ג'ארדיינס דואו מיועדת, בנוסף לדיאטה ופעילות גופנית, לשיפור השלים ברמות הסוכר בדם בקשר למוגרים בני 18 ומעלה עם סוכרת מסווג 2: המטופלים עם מטפורמין לבד או בשילוב עם תרופות נוספות ורמות הסוכר שלהם אין מאוזנות, או למטופלים המקבלים שילוב של מטפורמין ואמפליג'פלוזין בטבילות נפרדות.

קבוצה טיפולית:

מטפורמין: קבוצה הביגואנידים.

אמפליג'פלוזין: מעכבי SGLT2 (sodium-glucose co-transporter 2).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומרים הפעילים אמפלג'יפלוזין ומטפורמין, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (רשימת המרכיבים הלא פעילים ראה סעיף 6).
 - תס敏ים של תגובה אלרגית חמורה לג'ארדיינס דוואו עלולים לכלול:
 - נפיחות של הפנים, השפתיים, הגרון ואזוריים אחרים על פני הגוף
 - קושי בבליעה או בנשימה
 - אזוריים מוגבהים, אדומים על פני הגוף (סרפפת).
- אם יש לך תסמן כלשהו מתס敏ים אלה, הפסיק ליטול ג'ארדיינס דוואו ונסה לרופא מיד או גש לחדר המין שבבית החולים הקרוב ביותר.
- יש לך תפקוד כלילי ירוד באופן חמור (הרופא שלך יגיד לך מהו רמת הפגיעה בתפקוד הכלילי שלך).
- אתה סובל מאיספיקאה כליתית בגיןית או חמורה, מחלת כליות סופנית או עובר טיפול דיאליזה.
- אתה סובל מחמצת מטבולית (metabolic acidosis) או מחמצת קטוטית סוכרתית (diabetic ketoacidosis) עודף קוטוניים בגוף או בשתן).

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול/bg'ארדיינס דוואו, ספר לרופא על מצבן הרופאי, כולל אם:

- אתה סובל מבעיות בכליות.
- אתה סובל מבעיות בכבד.
- אתה סובל מבעיות לב, כולל אי ספיקת לב.
- אתה בן 65 שנים או יותר.
- סבלת בעבר מזמן מה נורטיק או בפין.
- סבלת בעבר מזמן מה נורטיק או מבעיות במנתן שثان.
- אתה עומד לעבור ניתוח. יתכן שהרופא יספיק את הטיפול שלך/bg'ארדיינס דוואו לפני שתעביר את הניתוח. אם אתה עומד לעבור ניתוח הייעץ ברופא שלך לגבי מועד הפסקת ניתילת ג'ארדיינס דוואו ומועד התחלה הטיפול החדש.
- אתה אוכל פחות או חל שניי בתזונתך.
- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות לבלב שלך, כולל דלקת לבלב או ניתוח לבלב.
- אתה שותה אלכוהול לעיתים תכופות מאוד או שותה הרבה אלכוהול בפרק זמן קצר (ראה גם סעיף "שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול").
- אתה עומד לקבל זריקת צבע או חומרי-ניגוד לצורך צילום רנטגן. יתכן שהייה צריכה להפסיק את מתן ג'ארדיינס דוואו לפחות זמן קצר. דבר עם הרופא שלך באשר למועד הפסקת ג'ארדיינס דוואו ומועד חידוש המנתן של ג'ארדיינס דוואו.
- אתה סובל מסוכרת מסווג 1. ג'ארדיינס דוואו אינה מיועדת לטיפול באנשים עם סוכרת מסווג 1.
- יש לך רמות נמוכות של ויטמין B12 בגוף.
- את בהריון או מתכוננת להריון (אנא ראי סעיף "הריוון, הנקה ופוריות").
- את מניקה או מתכוננת להניק (אנא ראי סעיף "הריוון, הנקה ופוריות").
- את אישת שלא עברה את גיל המעבר (בפרה-מנופוזה) ואין לך וסת סדירה או שהוותת לא מופיעה כלל (אנא ראי סעיף "הריוון, הנקה ופוריות").

לאזהרות מיוחדות נוספת לתופעות הלואוי החמורות הבאות, ראה סעיף 4 "תופעות לוואי":

- חמצת לקטית
- חמצת קטוטית (ketoacidosis) - רמות מוגברות של קוטוניים בגוף או בשתן
- התיבשות

- זיהומים חמורים בדרכי השتن
- רמות סוכר נמוכות בدم (היפוגליקמיה)
- **Fournier's gangrene** (זיהום חידקי נדריר אך מסכן חיים ברקמות התת עוריות באוזור הגניטלי (עד פי הטבעת))
- זיהום פטריתית בונרטיין
- זיהום פטריתית בפין (זיהום בעתרת הפין בלבד או בעתרת הפין והעורלה בקרוב גברים לא נימולים)
- תגבות אלרגיות (رجשות יתר)
- רמה נמוכה של ויטמין B12 (חסר בוויטמין B12)

ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

בדיקות ועקב

- בתקופת הטיפול יש לבדוק את רמות הסוכר בدم בהתאם להוראות הרופא.
- בעת נתילת ג'ארדיינס דואו עלול להיות לך סוכר בשתן, אשר יופיע בבדיקה שתן.
- היועץ ברופא כיצד למנוע, להזהות ולטפל בرمות סוכר נמוכות בדם (היפוגליקמיה), בرمות סוכר גבוהות בדם (היפרגליקמיה) ובסיבוכים של סוכרת.
- הרופא יפנה אותך לדיקות דם על מנת לבדוק את תפקוד הקליות שלך לפני ובמהלך הטיפול שלך בג'ארדיינס דואו.
- יתכן שהרופא שלך יפנה אותך לדיקות דם מסוימות לפני תחילת השימוש בתרופה ובתקופת הטיפול.
- יתכן שהרופא יבקש לעורך בדיקת דם לרמת ויטמין B12.
- כף רגל סוכרתית: חשוב להקפיד על בדיקה תקופתית קבועה של כפות הרגליים בהתאם להמלצות של המטפל הרפואי שלך.

אינטראקטיות / תגבות בין תרופתיות

- אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, **תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה**, ספר על כך לרופא או לרוקח. ג'ארדיינס דואו עלולה להשפיע על הדרכך בה תרופות אחרות פועלות, ותרופות אחרות עלולות להשפיע על הדרכך בה ג'ארדיינס דואו פועלות. במיוחד חשוב שידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
- **תרופות המעצבות את האנדימים קרבוניק אנהידראז** (כדוגמת טופירמאט, זונייםיד, אצטוזלמייד או דיכלורופנמיז) - שימוש משולב עלול להגביר את הסיכון לחמצת לקטית.
 - **תרופות המפחיתות את הפינוי של מטפורמין** (כגון רנולאזין, ננדטניב, דזוטגרבריר וסימטידי) - עלולות להעלות את רמות המטפורמין בדם ולהגביר את הסיכון לחמצת לקטית.
 - **תרופות המשמשות להזאת נזולים מהגוף (משטנות)** - שימוש משולב עם אמגאליפלוזין (אחד המרכיבים בג'ארדיינס דואו) עלול להביא לעלייה בנפח השtan ובתדירות ההתרוקניות, אשר עלולות להגביר את הסיכון להתייבשות.
 - **איןסולין או תרופות המגבירות את הפרשת האינסולין** (כגון סולפונילאוריאה) - שימוש משולב עם ג'ארדיינס דואו מגביר את הסיכון לרמות נמוכות של סוכר בדם (היפוגליקמיה) - יתכן שהרופא ישකול הफחתת מינון של תרופות אלו (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי" לסימנים אפשריים לרמות סוכר נמוכות בדם).
 - **תרופות העולות לعليיה ברמות הסוכר בדם** - תיאזידים ומשתנים אחרים, קוורטיקוסטרואידים, פנותיאזינים, תרופות לטיפול בבלוטת התריס, אסטרוגניים, גלולות למניעת הריאן, פנטואזין, חומצה ניקוטינית, תרופות סימפטומימטיות, חסמי תעליות סייזן ואיזונייזד.
 - **ליתים** - טיפול משולב עם ליתיום עלול להוריד את ריכוז הליתיום בסרום. הרופא יעקוב אחר הריכוז של הליתיום בסרום בתדירות גבוהה יותר לאחר תחילת הטיפול בג'ארדיינס דואו ובעת שינויים במינון.

הכר את התרופות שהינך נוטל. שמו רשיימה שלhn על מנת להראות לרופא ולרוקח כשהינך מקבל תרופה חדשה.

שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול את התרופה עם הארוחה. נטילה עם מזון עשויה להפחית הפרעות במערכת העיכול.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להימנע משתיית אלכוהול לעתים תכופות מאוד או משתיית כמותות גדולות בתוך פרק זמן קצר. זה עלול להגבר את הסיכון שלך לחוות תופעות לוואי חמורות (ראה גם סעיף 2 תחת "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

הריאן, הנקה ופוריות

אם את בהריון, מתכנתת הריאן, מיניקה או מתכנתת הנקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. אין להשתמש בג'ארדיינס דאו בהריון, התכשיר עלול להזיק לעוברך. אם כניסה להריון בזמן הטיפול בג'ארדיינס דאו, ספרי על כך לרופא בהקדם האפשרי. שוחחי עם הרופא שלך בנוגע לדרכי הטובה ביותר לשлот ברמות הסוכר בدم בזמן ההריון.

אין להניך במהלך השימוש בג'ארדיינס דאו. ג'ארדיינס דאו עלולה לגרום לחלב האם ולפגוע בתינוקך. היועצי ברופא שלך לגבי הדרך נוספת יותר להאכיל את תינוקך אם את נטלה ג'ארדיינס דאו.

פוריות בקרב נשים

אם הינך אישة שלא עברת את גיל המעבר (בפרהמןופאוזה), ואין לך וסת סדירה או שהוות לא מופיעה כלל, התייעצי עם הרופא המטפל לפני הטיפול בג'ארדיינס דאו. ג'ארדיינס דאו עלול להגבר את הסיכויים להיכנס להריון. ספרי מיד לרופא שלך אם כניסה להריון בזמן נטילת ג'ארדיינס דאו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל הוא טבליה אחת פעמיים ביום עם הארוחה. נטילת הטబליות עם מזון עשויה להפחית את הסיכון להפרעות במערכת העיכול.

אם יש לך רידיה בתפקידו קלויות, יתכן שהרופא ירשום לך מינון נמוך יותר.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אסור לכטוש, לחצוץ או ללוועס את הטబליות.

יתכן שהרופא יורה לך ליטול ג'ארדיינס דאו יחד עם תרופות אחרות לטיפול בסוכרת. רמות סוכר נמוכות בדם (היגוגליקמיה) עלולות להופיע לעתים קרובות יותר אם נוטלים במקביל תרופות מסוימות לטיפול בסוכרת (ראה סעיף 2 "אינטראקציות/תגובהות בין-תרופתיות" וסעיף 4 "תופעות לוואי").

אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר המין של בית החולים הקרוב ביותר והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן החדש, יש ליטול את המנה מייד כשנזכרת. אם לא נזכרת עד שהגיע הזמן למנה הבאה, דילג על המנה שנשכחה וקח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה.

היוועץ ברופא אם יש לך שאלות לגבי מנתה שהוחמזה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
אם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה רמות הסוכר בدم עלולות לעלות.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע שהינך נוטל תרופה.** הרכב משקפיים
אם הינך זוקק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בג'ארדיינס דואו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשיימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול אפילו אחת מהן.

ג'ארדיינס דואו עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל:

- **חמצת לקטית:** מטפורמין הידרוכולוריד, אחד המרכיבים בג'ארדיינס דואו, עלול לגרום לתופעת לוואי נדירה אף חמורה הנקראת חמצת לקטית (lactic acidosis) (הצטברות של חומצה לקטית בדם) שעלולה לגרום למוות. חמצת לקטית היא מצב חירום רפואי המחייב טיפול בבית חולים.

הפסק ליטול ג'ארדיינס דואו ופנה לרופא מייד או גש לחדר המין של בית החולים הקרוב
ביותר אם אתה חוווה אחד מהתסמינים הבאים של חמצת לקטית:

- אתה מרגיש מאד חלש ועייף.
- יש לך כאב שרירים יוצא דופן (בלתי רגלי).
- יש לך בעיות בלתי מוסברות בקיבת או במעי המלוות בבחילות וקאות או שלשלולים.
- אתה סובל מישנויות חריגת או ישן יותר זמן מהרגיל.
- אתה חש בקור, במיוחד בזרועות וברגליים.
- אתה מרגיש מסוחה.
- יש לך דופק איטי או לא סדיר.

יש לך סיכון גבוה יותר לפתח חמצת לקטית עם ג'ארדיינס דואו אם אתה:

- סובל מבעיות כליה ביןוניות עד חמורות.
 - סובל מבעיות בכבד.
 - שותה הרבה אלכוהול (לעתים תכופות מאד או הרבה בפרק זמן קצר) (ראה גם סעיף "שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול").
 - סובל מהתייבשות (איבוד כמות רבה של נוזלי הגוף). זה עלול לקרטות אם אתה חולה עם חום, הקאות או שלשלולים. התיבשות עלולה לקרות גם כאשר אתה מזיע הרבה בפעילות או באימון גופני ולא שותה מספיק נזלים.
 - עובר בבדיקות רנטגן מסוימות עם הזרקת חומר צבע או חומר-ניגוד.
 - עובר ניתוח או הליך אחר אשר בשבילו הינך צריך להגביל את כמות המזון והונזל שהינך אוכל ושותה.
 - סובל מאירוע רפואי לב.
 - סובל מהתקף לב,>Zיהום חמור או שbez.
 - בן 65 ומעלה, לאחר שבגילים אלו עלולות להיות בעיות בתפקודי כליה, כבד או לב. עליך להקפיד על בדיקות תפוקדי כליה תכופות.
- ספר לרופא שלך אם הינך סובל מażות מהבעיות שברשימה מעלה.
ספר לרופא שלך שהינך נוטל ג'ארדיינס דואו לפני שתעביר ניתוח או בדיקות רנטגן. יתכן שהרופא יצטרך להפסיק לך את הג'ארדיינס דואו לפחות מה אם יש לך ניתוח או בדיקות רנטגן מסוימות.

חמצת קוטוטית (ketosis) - רמות מוגברות של קוטוניים בدم או בשתן (שכיחות לא ידועה): חמצת קוטוטית הופיעה באנשים עם סוכרת מסוג 1 או סוכרת מסוג 2 במהלך הטיפול באמפלג'ילולין, אחד המרכיבים בג'אראדיינס דואו. חמצת קוטוטית הופיעה גם באנשים עם סוכרת שהיו חולים או שעברו ניתוח במהלך הטיפול בג'אראדיינס דואו. חמצת קוטוטית היא מצב חמור שצורך לטפל בו בבית החולים. חמצת קוטוטית עלולה להוביל למומות.

חמצת קוטוטית עלולה לקרות עם ג'אראדיינס דואו גם אם רמות הסוכר בدم נמוכות מ- 250 מ"ג/דל. הפסיק לטבול ג'אראדיינס דואו וננה מיד לרופא שלך או גש לחדר המין בבית החולים הקרוב ביותר אם אתה חוווה את אחד התסמינים הבאים:
בחילה, הקאה, כאבי בטן (באזור הקיבה), עייפות, בעיה בנשימה.
אם אתה סובל מAhead מהתסמינים האלה במהלך הטיפול בג'אראדיינס דואו, אם מرتאפשר, בדוק את רמת הקוטוניים בשתן, אף אם רמות הסוכר שלך בדם נמוכות מ- 250 מ"ג/דל.

התיבשות (תופעת לוואי שאינה שכיחה - מופיעה ב-1 עד 10 משותמים מתוך 1,000): ג'אראדיינס דואו עלולה לגרום לחלק מהאנשים לתיבשות (אי-בוד נזלי גוף ומלחים). התיבשות עלולה לגרום לך לחש שחרורת, עילפון או חולשה, במיוחד כשהינך עמד (תת לחץ דם בעמידה). היי דיווחים על החמרה פתאומית בתפקודו כלויות באנשים שנוטלים ג'אראדיינס דואו. התיבשות עלולה להעלות את הסיכון לתת-לחץ דם. יש להקפיד על צריכת נזלים נאותה במהלך היום. אם הינך חוווה תת-לחץ דם, יש לדוח לרופא. הינך עלול להיות בסיכון גבוה יותר להטיבשות אם הינך:

- סובל מביעות בכלייה.
- בן 65 ומעלה.
- מקפיד על דיאטה דלת נטרן (מלח).

היוועץ ברופא לגבי מה שתוכל לעשות על מנת למנוע התיבשות, כולל כמה נזלים עליר לשתו על בסיס יומיומי.

היוועץ מיד ברופא אם הינך מפחית את כמות המזון והנזלים שהינך שותה, לדוגמה אם הינך חולה או לא יכול לאכול, או מתחיל לאבד נזלים מגופך, לדוגמה בעקבות הקאות, שלשול או שהיא ארוכה מדי במשש.

ziehominim חמורים בדרכי השתן: ziehominim חמורים בדרכי השתן, אשר עלולים להביא לאשפוז, קרו לאנשים שנטלו אמפלג'ילולין, אחד המרכיבים בג'אראדיינס דואו. דוחה לרופא שלך אם יש לך סימנים או תסמינים כלשהם של ziehominim בדרכי השתן כגון צריבה במתן שתן, תכיפות במתן שתן, דחיפות במתן שתן, כאב בחולק מתחתון של הבطن (אגן) או דם בשתן. לעיתים אנשים עלולים לסבול גם מחום, כאב גב, בחילות או הקאות.

רמת סוכר נמוכות בדם (hypoglycemia) (תופעת לוואי שכיחה מאוד - מופיעה ביוטר ממשותם 1 מתוך 10): אם אתה נוטל ג'אראדיינס דואו עם תרופה נוספת עלולה לגרום לרמות סוכר נמוכות בדם, כגון סולפונילאוריאה או אינסולין, הסיכון שלך לסבול מרמות סוכר נמוכות בדם גבוהה יותר.

יתכן שאתה צריך להוריד את המינון של תרופה הסולפונילאוריאה או של האינסולין במהלך הטיפול ג'אראדיינס דואו. סימנים ותסמינים של סוכר נמוך בדם עלולים לכלול: כאב ראש, נמנום, חולשה, רגונות, רעב, דופק מהיר, בלבול, רעד או תחושת עצבנות, סחרחות, הזעה.

Fournier's gangrene - ziehominim חרידי נדיר אך מסכן חיים ברקמות התת עוריות באذור הגניטלי (עד פי הטבעת) (שכיחות לא ידועה):

יש לפניו בקדם האפשרי לרופא אם הינך מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות: אודם, כאב, רגשות או נפיחות באזור הגניטלי עד פי הטבעת, בלויי חום מעל 38°C או הרגשה כללית רעה וחולשה. תופעות לוואי אלו יכולות להיעיד על התפתחות של Fournier's gangrene. מדובר בziehominim חרידי נדיר אך מס肯 חיים ברקמות התת עוריות באזור הגניטלי (עד פי הטבעת). קיימים מספר דיווחים אודות הירעות תופעת לוואי זו בנשים ובגברים אשר נטלו תרופות לטיפול בסוכרת משפחת התרופות אליה שיר ג'אראדיינס דואו. תופעת לוואי זו עלולה להוביל לאשפוז,

צורך בניוות ואף למוות. תסמייני Fournier's gangrene עלולים להידרדר במהירות, ולכן חשוב לפנות לעזרה רפואית מהירות אם הין חש באחד מהתסמיינים אלו.

- **ziehом פטריטי בונרטיק** (טופעת לואוי שכיחה - מופיעה ב-1 עד 10 משתמשים מתוך 100):
תסמיינים של ziehом פטריטי בונרטיק כוללים ריח מהנרטיק, הפרשה לבנה או צהבהבה מהנרטיק (ה הפרשה יכולה להיות גושית או להיראות כמו גבינת קוטג') או גרד בונרטיק.

- **ziehом פטריטי בפין** (ziehом בעתרת הפין בלבד או בעתרת הפין והעורלה בקרוב גברים לא נימולים) (טופעת לואוי שכיחה - מופיעה ב-1 עד 10 משתמשים מתוך 100):
עלולה להתפתח נפיחות בפין שאינו נימול שמקשה למשור אחורה את העור שמסביב לכתה הפין. תסמיינים אחרים של ziehом פטריטי של הפין כוללים אדמומיות, גרד או נפיחות של הפין, פרירה בפין, הפרשה עם ריח רע מהפין או כאב בעור שמסביב לפין.

יש להיעזר ברופא כיצד לפעול אם מופיעים תסמיינים של ziehом פטריטי של הנרטיק או הפין. יתכן שהרופא שלך ימליץ לך על טיפול רפואי ללא מרשם נגד ziehом פטריטי. כמו כן, יש לפנות מיד לרופא שלך אם נעשה שימוש בטיפול רפואי ללא מרשם נגד ziehומ פטריטי וה特斯מיינים שלך אינם חולפים.

- **תגובה אלרגיות (رجשות יתר)** (שכיחות לא ידועה): תגובה אלרגיות חמורות התרחשו בקרוב אנשים הנוטלים אמפלג'ילוזין, אחד המרכיבים בג'ארדיינס דאו. התסמיינים עלולים לכלול:
 - נפיחות של הפנים, השפתיים, הגרון ואזוריים אחרים של העור שלך
 - קושי בבליעה או בנשימה
 - אזהרים מוגבהים, אדומים על פני העור (סרפדת)אם הין חווה תסמן כלשהו מ特斯מיינים אלה, הפסיק ליטול ג'ארדיינס דאו ופנה מיד לרופא או גש לחדר המין בבית החולים הקרוב ביותר.

- **רמה נמוכה של ויטמין B12 (חסר בוויטמין B12)** (טופעת לואוי שכיחה - מופיעה ב-1 עד 10 משתמשים מתוך 100):
שימוש במטפורמין לפראקי זמן ממושכים עלול לגרום לירידה ברמות ויטמין B12 בدمך, במיוחד אם כבר סבלת בעבר מرمאות נמוכות של ויטמין B12. יתכן שהרופא יבקש לעורך בדיקות דם לרמות ויטמין B12.

טופעות לואוי שכיחות מאוד (מופיעות ביותר משתמש 1 מתוך 10) כוללות:
ziehומים בדרכי השתן בקרוב נשים.

טופעות לואוי שכיחות ב-1 עד 10 משתמשים מתוך 100) כוללות:
אף סתום או נזלת וכאב גרון, שלשול, בחילה או הקאה, גזים, אי נוחות בבטן, קשיי עיכול, חולשה, כאב ראש, ziehומ בדרכי נשימה עליונות, מתן שתן מוגבר (השתנת יתר, תכיפות במתן והשתנהليلית), הפרעה ברמת השומנים בדם, כאבי מפרקם, צמא (כולל צימאון יתר), ziehomים בדרכי שתן בקרוב גברים, עלייה ברמת הcolesterol LDL בדם, עלייה ברמת ההורטוקריט בדם.

טופעות לואוי שכיחות (מופיעות ב-1 עד 10 משתמשים מתוך 1,000):
ירידה בלחץ הדם, תת לחץ דם, תת-נפח הדם (היפולומיה), היצרות עורלה.

טופעות לואוי נוספת:

עליה ברמות הקרআনি בסרום (בדיקה דם) וירידה בקצב הסינון המשוער בפקיעית הכליה (eGFR), עצירות, דלקת כליה ואגן הכליה (pyelonephritis) ואלח דם כתוצאה מziehומם במערכת השתן (urosepsis), פגיעה כליאתית חרדה, תגובה עורית (למשל פרירה, סרפדת), פגעה כבדית.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה.
- תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון:**
- יש לאחסן מתחת ל 25°C .

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם –
copovidone, maize starch, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous.

ציפוי הטבלייה מרכיב מ:

- ג'ארדיאנס דואו 5 מ"ג / 850 מ"ג, ג'ארדיאנס דואו 5 מ"ג / 1000 מ"ג:
hypromellose 2910, titanium dioxide, talc, macrogol 400, iron oxide yellow.
- ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג / 850 מ"ג, ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג / 1000 מ"ג:
hypromellose 2910, titanium dioxide, talc, macrogol 400, iron oxide red and iron oxide black.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:

- ג'ארדיאנס דואו 5 מ"ג / 850 מ"ג – טבליות מצופות, בצורה אובלית, קמורות משני צידיהם, בצבע לבן-צהבהב. על צד אחד של הטעבליות מוטבע לוגו של חברת בורינגרא אינגליהים והכיתוב "S5", ועל הצד השני מוטבע הכיתוב "850".
- ג'ארדיאנס דואו 5 מ"ג / 1000 מ"ג – טבליות מצופות, בצורה אובלית, קמורות משני צידיהם, בצבע צהוב-חום. על צד אחד של הטעבליות מוטבע לוגו של חברת בורינגרא אינגליהים והכיתוב "S5", ועל הצד השני מוטבע הכיתוב "1000".
- ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג / 850 מ"ג – טבליות מצופות, בצורה אובלית, קמורות משני צידיהם, בצבע לבן-ורדרד. על צד אחד של הטעבליות מוטבע לוגו של חברת בורינגרא אינגליהים והכיתוב "S12", ועל הצד השני מוטבע הכיתוב "850".
- ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג / 1000 מ"ג – טבליות מצופות, בצורה אובלית, קמורות משני צידיהם, בצבע סגול-חום כהה. על צד אחד של הטעבליות מוטבע לוגו של חברת בורינגרא אינגליהים והכיתוב "S12", ועל הצד השני מוטבע הכיתוב "1000".

התכשיר משוק באזיות של 14, 60, 180 טבליות. יתכן שלא כל גודלי האזיות משוקרים.

- שם בעל הרישום והיבואן וכתובתו: בורינגרא אינגליהים ישראל בע"מ, מדינת היהודים 89, ת.ד. 4676672, הרצליה פיתוח 4124

עלון זה נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

• מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 155-26-34512 | ג'ארדיאנס דואו 5 מ"ג / 850 מ"ג: |
| 155-28-34533 | ג'ארדיאנס דואו 5 מ"ג / 1000 מ"ג: |
| 155-29-34534 | ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג / 850 מ"ג: |
| 155-27-34532 | ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג / 1000 מ"ג: |

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה עלון זה נסוח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.