

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אסריל® 12.5, 25, 50 מ"ג, טבליות

כל טבלייה מכילה קפטופריל (Captopril) במינון 12.5, 25 או 50 מ"ג בהתאם.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוספים" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העلون עד סוף בטרכם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמצית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול ביתר לחץ דם, اي ספיקת לב, נפרופתיה סוכרתית (פגעה בכלי הדם עקב סוכרת), לטיפול לאחר התקף לב.

קבוצה רפואיית: מעכבי אנזימים מהפרק אנג'יאוטנסין (ACE Inhibitors). מעכבי אנזימים מהפרק אנג'יאוטנסון פועלים להרחבות כלי הדם שלך, כך שלליבך יהיה קל יותר להזרים דרכם דם.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (קפטופריל), לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6) או לתרופות אחרות משפחת ACE inhibitors.
 - סבלת אי פעם מתגובה הכלולת נפיוחות הידיים, השפתיים, הפנים או הלשון מסיבה לא ידועה.
 - אתה סובל מסוכרת או מליקוי בתפקוד הכליה ומטופל בתרופה להורדת לחץ הדם המכילה אליסקירין.
 - את בהריון לאחר החודש השלישי (עדיף גם להימנע מנטיילת אסריל בתחלת ההריון – ראי בסעיף "הריון והנקה").
 - לךחת או אם אתה לוקחת סקוביטריל/ולסרטן, תרופה המשמשת לטיפול באיספיקת לב כרונית. במקריםים, שכן עליה הסיכון لأنגיודמה (התנפחות מהירה מתחת לעור למשל באזורי הגרון).
- אין ליטול אסריל אם אחד או יותר מהמרכיבים לעיל נכון לגבר. אם איןך בטוח, הייעץ ברופא לפני נטילת אסריל.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול באסריל, ספר לרופא:

- אם אתה סובל ממחלה כליה.
- אם אתה סובל ממחלה כבד.
- אם אתה עובר טיפול דיאליזה.
- אם סבלת ממחלה לב, במיוחד בעיות בשסתומי הלב.
- אם אתה מטופל בתכשירים המדכאים את מערכת החיסון (ראה גם סעיף "תגובהות בין תרופתיות").
- אם סבלת לאחרונה מריבוי שלשולים או הקאות.
- אם יש לך סוכרת.
- אם אתה סובל ממחלה קולגן של כלי הדם כגון דלקת מפרקים שיגרונית, צבתת אדרמניתית מעורכתית (לופוים) או טרשת רקמת חיבור (סקלרוודרומה).
- אם אתה סובל מיותר זיהומיים כגון כאב גרון או חום, אשר יכולים להיות עקב שינויים בתאי הדם שלך

- יכולם להיות מנוטרים על ידי הרופא באמצעות בדיקת דם.
- אם אתה עומד לעבר ניתוח בשיניים או ניתוח גדול הכרוך בהרדמה.
- אם אתה עומד לקבל טיפול נגד רגישות למשל להפחחת תגובת אלרגית לעקיצות צרעה או דברה.
- אם אתה עומד לעבר טיפול לפינוי עופדי כולסטרול מהדם באמצעות מכונה (נקרא LDL אפרזיס).
- עלייר לספר לרופא אם את חושבת שאת בהריון או עשויה להיכנס להריון. **אסריל** אינה מומלצת בתחילת ההריון. אין ליטול **אסריל** לאחר החודש השלישי להריון, מפני שימוש **אסריל** בשלב זה עלול לגרום לנזק חמור לתינוק ("הריון והנקה").
- יתכן שבחלק מהמתופלים האפרו-קריביאנים יהיה צורך במינון גבוהה יותר של **אסריל** על מנת להשיג רידה מספקת בלבד.
- אם אתה נוטל אחת מהתרופה הבאות, שכן הסיכון לאנגיאודמה עלול לעלות:
 - רסקdotריל, תרופה המשמשת לטיפול בששלשול.
 - תרופות למניעת דחיה של איברים מושתלים ולטיפול בסרטן (כגון טמסירולמוס, סירולמוס, אברולמוס).
 - וילדג'יפטן, תרופה המשמשת לטיפול בסוכרת.
- אם אתה נוטל תוספי אשלגן (כולל תחלפי מלח המיכלים אשלגן), משתנים אוצרי אשלגן ותרופות אחרות שעולות להעלות את כמות האשלגן בدم (כגון טרימטופרים וקו-טרימוקסازול לטיפול בziehomים הנגרמים על ידי חיידקים; ציקלוספורין, תרופה לדיכוי מערכת החיסון המשמשת למניעת דחיה של איברים מושתלים; הפרין, תרופה המשמשת לדילול דם כדי למנוע היוציארות קריישי דם).
- אם אתה נוטל אחת מהתרופה הבאות לטיפול ביתר לחץ דם:
 - חוסמי הקולטן לאנגיטנסין II (ARBs) (כגון ולסרטן, טלמייסרטן, אירבסרטן), במיחוד אם אתה סובל מבעיות כליה הקשורות למחלת הסוכרת.
 - אליסקiran.

"יתכן שהרופא שלך יפנה אותך לבדיקות תקופתיות של התפקוד הכלילי, לחץ הדם ורמות האלקטרוליטים (כגון אשלגן) בدم. ראה גם מידע בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

תגובה בין תרופות
אם אתה לוקח, אם לךחת לאחרונה או אם אתה עשוי לךחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
 יתכן שהרופא יצטרכ לשות את המינון שאתה לוקח /או לנוקט באמצעות זיהירות נוספת:
 אם אתה לוקח חוסם קולטן לאנגיטנסין II (ARB) או אליסקiran (ראה גם מידע בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם" ובסעיף "ازהירות מיוחדת הנוגעת לשימוש בתרופה").

- ספר לרופא או לרוקח במיחוד אם אתה לוקח:
- משתנים.
- תוספי אשלגן (כולל תחלפי מלח המיכלים אשלגן), משתנים אוצרי אשלגן (כגון טריאמטרין, אAMILORIDE, ספironolkton) ותרופות אחרות שעולות את כמות האשלגן בدم (כגון טרימטופרים וקו-טרימוקסازול לטיפול בziehomים הנגרמים על ידי חיידקים; ציקלוספורין, תרופה לדיכוי מערכת החיסון המשמשת למניעת דחיה של איברים מושתלים; הפרין, תרופה המשמשת לדילול דם כדי למנוע היוציארות קריישי דם).
- תרופות הגורמות להרחבה כל הדם (כגון מינוקסידיל, קלונידין).
- תרופות לטיפול בעבויות נפשיות כולל מאגניה דפרסיה או דיאקוז (כגון ליתיום, Amitriptilin).
- תרופות המדכאות את מערכת החיסון (כגון אזטיופרין, ציקלופוספמید).
- תרופות לטיפול בשיגdon (כגון אלופורנול, פרובנציד).
- תרופות לטיפול בקצב לב לא סידיר (כגון פרוקאנינאמיד).
- משככי כאבים נוגדי דלקת שאינים סטרואידים (NSAIDs) (כגון אינדומטיצין, איבופרופן).
- תרופות לטיפול בסוכרת (כגון חוסמי בטא [למשל פרופרנולול, אטונולול] או חוסמי תעלות סידן [למשל אמלודיפין, נידיפין]).
- כל תרופה אשר יתכן שתיננת בזמן ולאחר התקף לב.

- תרופות המכילות חומרים סימפטומימתים (למשל תרופות נגד שיעול והצטננות).
- אחת מהתרופות הבאות, שכן הסיכון לאנגיאודמה עולול לעלות:
 - רסקדוטריל, תרופה המשמשת לטיפול בשלשול.
 - תרופות המשמשות למניעת דחיה של איברים מושתלים ולטיפול בסרטן (כגון טמסירולימים, סירולימוס, אברולימוס).
 - וילדגלייפtin, תרופה המשמשת לטיפול בסוכרת.

שימוש בתרופה ומזון
ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

כמויות מתונות של אלכוהול לא ישפיעו על **אסריל**, אולם יש להיוועץ ברופא טרם צריכת משקאות אלכוהוליים.

הירין והנקה

הירין

ספרី לרופא אם את חשבת שתאת בהירין או עשויה להיכנס להירין. בדרך כלל, הרופא שלך ייעץ לך להפסיק את נטילת **אסריל** לפני שתאת נסנתה להירין או מייד לאחר שנודע לך שתאת בהירין ומלייח לך ליטול תרופה אחרת במקום **אסריל**. **אסריל** אינה מומלצת בתחילת ההירין ואסורה לשימוש לאחר החodus השישי להירין מאחר שהיא עלולה לגרום לנזק חמור לתינוק אם נלקחת לאחר החודש השלישי להירין.

הנקה

ספרី לרופא אם את מניקה או מתכונת להתחילה להניקה. הנקתת יילודים (במהלך השבועות הראשונים לאחר הלידה) ובמיוחד פגמים אינה מומלצת בתקופת נטילת **אסריל**. במקרה בו התינוק בוגר יותר, הרופא ייעץ לך לגבי היתרונות והיסוכנים שבנטילת **אסריל** בזמן הנקה וזאת בהשווואה לטיפולים אחרים. **היוועץ** ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופה כלשהי.

אם אתה עומד לעבור ניתוח

לפני ניתוח ורדמה (אפילו אצל רופא שניים), עליך לספר לרופא או לרופא השני שאתה נוטל **אסריל** מאחר שתיתיכון ירידת פתאומית בלבד הדם שלך.

נהיגה ושימוש במכוניות

אסריל יכולה להשפיע על יכולתך הנהוג, בדרך כלל בתחילת הטיפול או אם הרופא שלך משנה את המינון שאתה נוטל. אם אתה סובל מסחרחות בזמן נטילת **אסריל**, אל תנהג או תשתמש במכוניות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אסריל מכילה לקטוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבירות לסתורים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח

בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין לעבר על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות.

לעתים, מטופלים יכולים לסייע מלחמות המנה הראשונה או שתי המנות הראשונות של **אסריל**. אם זה קורה לך, שכוב עד שזה יעבור.

צורת הנטילה:

- יש ליטול את הטבליה עם כוס מים.
- עליך להשתדל ליטול את אספיריל בערך באותה השעה בכל בוקר. ניתן ליטול את התרופה לפני, במהלך או לאחר הארוחה.
- לא ניתן לחצוץ את הטבליה. הקו על הטבליה אינו מיועד לחציצה. אין מידע לגבי לעיסיה/כתישה של הטבליה.

אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר
אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, קח אותה מיד כשנזכרת ולאחר מכן המשך כרגיל. אם כמעט הגיע זמן המנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה והמשך כרגיל. אין ליטול mana כפולה על מנת לפצות על mana שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושרי! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה ذוקן להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באספיריל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהם.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא בהופעת:

- נפיחות הידיים, הפנים, השפתיים או הלשון
- קשיי נשימה
- פריחה או צריבה, אדמומיות או קילוף של העור אשר הופיעו בפתאומיות באופן בלתי צפוי
- כאב גרון או חום
- סחרורת חמורה או עילפון
- כאב בטן חמורי
- דופק מהיר או לא סדיר באופן חריג
- הצהבת העור ו/או העיניים (צחבת)

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שכיחות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- סחרורת
- גרד
- פריחות
- נשירת שיער
- יובש בפה
- הפרעות שינה
- שלשול או עצירות
- שיעול יבש וטורפני
- איבוד חוש הטעם (בדרכן כלל הפיר בהפסקת הטיפול)
- אי נוחות בטן העליון, בחילה, הקאה, כאב בטן
- קוצר נשימה
- כיבים בקיבה

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שሞיפות ב 10-1 ממשתמשים מתוך 1,000):

- כאב ראש
- דופק מהיר, לא סדר, חזק
- כאב חזה
- לחץ דם נמוך
- ירידה בזרימת הדם לידיים וכפות הרגליים (כגון תופעת ריין)
- הסמקה
- תחושת נימול, חוסר תחושה או עקצוץ
- עייפות
- תחושה כללית לא טובה
- חיוורן
- נפיחות העיניים והשפטיים (אנגיאו אדמה)

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמויפות ב 1-10 ממשתמשים מתוך 10,000):

- כיבים בפה
- נמנום
- שינויים בתדריות מתן שתן
- הפרעות בכליה או אי ספיקת כליות
- איבוד תיאבון

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמויפות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- ליקוי בתפקוד הגוף ועלייה באנמיי הגוף
- בלבול, דיכאון, עילפון
- מיני שbez
- טשטוש ראייה
- בעיות לב כולן התקף לב וziehomim בחזה
- דלקת בלב לב
- נזלת
- לשון נפocha (דלקת בלשון)
- אין אונות
- תסמנונת סטיבנס-ג'ונסון (מחלה חמורה המתבטאת בהופעת שלפוחיות על פני העור, הפה, העיניים ואיברי הגוף)
- נזק לכבד, דלקת בכבד או צהבת
- כאב שרירים
- כאב מפרקאים
- צפצופים בנשימה או קשי נשימה
- פריחות או תגבות עוריות
- נפיחות ברקמת השד בגברים
- חום
- רגישות העור לאור
- שינויים בرمמות תאים /או בבדיקות הכימיה של הדם או המערכת הלימפית (לדוגמא תאי דם אדומיים או לבנים, נתן, אשלגן, סוכרים)

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואן מחייבת או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי" עקף טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המופיע לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומ סגור מחוץ להישג ידם וטוויח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התגובה המופיע על גבי האריזה. תאריך התגובה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אין לאחסן מעל 25°C.
- אין להשליך תרופות לביב או לפח אשפה ביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל בתרופה מכילה גם:

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, starch pregelatinized, stearic acid

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליה בצבע לבן, עגולה, קמורה משני הצדדים, עם קו סימון.
גודלי אריזות מאושרים: 10, 20, 90, 100 טבליות. יתרן שלא כל גודלי האריזות משווים.

נערך ביוני 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אפריל 12.5: 106-49-29061-00

אפריל 25: 106-50-29062-00

אפריל 50: 106-51-29063-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נوشט בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

יצן ובטל רישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל