

ديكايبتيل ديبو 22.5 ملغ مسحوق ومذيب لتحضير معلق للحقن العضلي

التركيب:

كل قنية من ديكايبتيل ديبو 22.5 ملغ تحتوي على 22.5 ملغ تريپتوريلين (ك إميونات).
22.5 mg triptorelin (as embonate)

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: انظر الفصل 2، البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. هذا الدواء وصف لك لعلاج مرضك. لا تعطه لآخرين؛ لأنّه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابهه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

هذا الدواء معد

- لعلاج سرطان البروستات المتقدم، المتعلق بالهرمونات كعلاج بديل، إذا كانت الجراحة لاستئصال الخصية أو إعطاء الإستروجينات غير مستطب بها أو ليس ملائماً للمتعالج
- لعلاج البلوغ الجنسي المبكر لدى الأطفال فوق جيل ستين مع بدء البلوغ الجنسي قبل جيل 8 سنوات لدى البنات، وقبل جيل 10 سنوات لدى الأولاد

المجموعة العلاجية: نظير طويل المدى للهرمون الذي يحرّر چونادوتروبينات (موجهات الغدد التناسلية) (GnRH - Gonadotropin releasing hormone)

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (الرجي) لтриپتوريلين إميونات، هورمون الذي يحرّر چونادوتروبينات (GnRH)، نظائر أخرى للهormون الذي يحرّر چونادوتروبين (GnRH) المعروفة أيضاً باسم LHRH)، أو لأحد مركبات الدواء (انظر البند 6).
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بالدواء أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مزاج مكتتب. كانت هناك تقارير عن اكتتاب الذي يمكن أن يكون شديداً بين المرضى الذين يتناولون ديكايبتيل ديبو.
- كنت تستعمل أدوية لمنع تخثر الدم، حيث يمكن ظهور كدمة في منطقة الحقن.
- كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول، مدخن، أو لذوقك تارىخ عائلة من هشاشة العظام (Osteoporosis) أو لديك تاريخ عائلة من هشاشة العظام (مرض يصيب قوة العظام)، سوء التغذية، تناول مستمر للأدوية التي تقلل من كثافة العظام (على سبيل المثال أدوية مضادات الالتحالج، الستيرويدات). العلاج المطول مع ديكايبتيل ديبو يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام خاصة إذا تم وجود أحد الشروط المذكورة أعلاه.
- كنت تعاني من أي أمراض قلب أو أوعية دموية، بما في ذلك اضطرابات في نظم القلب (Arrhythmia) أو إذا كنت تتتعالج بأدوية لهذه الأمراض. الخطير لحدث اضطرابات نظم في القلب قد يزداد عند استعمال ديكايبتيل ديبو.
- كنت تعاني من السكري أو مشكلة قلب أو أوعية دموية.
- خضعت لعملية خصي، تريپتوريلين (tripotorelin) لن يؤدي إلى انخفاض إضافي في مستويات تستوستيرون، ولذلك لا تستعمله.

خلال العلاج بالدواء

- ردود فعل تحسسية: في حالات نادرة، وقت قصير بعد الحقن شوهدت ردود فعل تحسسية شديدة (انظر الفصل "أعراض جانبية"). في هذه الحالات، يجب التوجه فوراً للحصول على علاج طبي. في حالات نادرة من تقلل وصداع نصفي شديد يجب إيقاف العلاج إذا تكررت هذه الحالات أو إذا كانت شديدة.
- عند بدء العلاج سيحصل ارتفاع في كمية التستوستيرون في جسدك. هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم أعراض السرطان. توجه إلى طبيبك إذا تمكن هذا الأمر. من المحتمل أن يعطيك الطبيب دواء (مضاد للأندروجين) حتى يمنع تفاقم الأعراض.

- خلال الأسبوع الأول من العلاج، كما هو الأمر مع نظائر أخرى من GnRH، قد يسبب ديكايبتيل ديبو أعراضًا نتيجة للضغط على العمود الفقري (مثل ألم، إحساس بالخذر أو ضعف في القدمين) أو انسداد الإحليل (أنابيب خروج البول من الجسم). إذا شعرت بواء من هذه الأعراض، توجه فوراً إلى الطبيب، سيفحص الطبيب حالتك وسيعالج وفقاً لذلك.
- خصوصات عمل أداء الغدة النخامية أو الأعضاء التناسلية، التي يتم إجراؤها خلال العلاج أو بعد إيقاف العلاج بديكايبتيل ديبو قد تكون مضللة.

- إذا كان لديك تضخم (تورم حميد) في الغدة النخامية الذي لم تكن تعلم بوجوده، ممكن أن يظهر خلال العلاج بديكايبتيل ديبو. تشمل الأعراض صداع شديد أو متكرر، مشاكل في الرؤية، تقيؤات، مشاكل في الرؤية، وشلل عضلات العينين. في هذه الحالات، يجب التوجه فوراً للحصول على علاج طبي.

للأطفال:

- أخبر الطبيب إذا كان الطفل يُعاني من ورم متقدم في الدماغ، فهذا قد يؤثّر على قرار الطبيب بخصوص العلاج.
- فتنيات مع بلوغ جنسي متقدم قد يعاني من نزيف مهبلي في الشهر الأول من العلاج.
- إذا كان الطفل يُعاني من صداع شديد أو متكرر، مشاكل في الرؤية، تقيؤات، مشاكل في الأنف، اتصل بالطبيب على الفور (انظر الفصل 4).

الفحوصات والمتابعة

من المحتمل أن يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم خلال العلاج، من أجل متابعة ومراقبة نجاعة العلاج.

تفاولات/ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائية، فأخبار الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي، إذا كنت تتناول:
- قد يسبب ديكايبتيل ديبو خلاً في عمل الأدوية المستعملة لعلاج اضطرابات نظم القلب، مثل: كيندين (quinidine)، پروكايديناميد (procainamide)، أميدارون (amiodarone)، أو قد يؤدي إلى ارتفاع خطر حدوث اضطرابات في نظم القلب عند إعطاء مدموج مع أدوية أخرى (مثل ميثادون (methadone) الذي يستعمل كمسكن آلام لعلاج حالات الإدمان، موکسیفلوكساسين (moxifloxacin) (مضاد حيوي)، أدوية مضادة للذهان لعلاج مشاكل نفسية وخيمة).

الحمل والإرضاع:

- إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لأن تحمل، استشيري الطبيب قبل تناول أدوية.
- يُمنع استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

السيارة واستعمال الماكينات:

- ديكايبتيل ديبو 22.5 ملغ قد يغير ردود فعلك بحيث قد تتأذى قدرتك على السيارة وعلى تشغيل ماكينات. هذا صحيح خاصة عند مixture مع الكحول. قد تشعر بدوران، تعب أو تشعر بمشاكل مثل تشوش الرؤية. هذه الأعراض الجانبية قد تكون أعراض جانبية محتملة للعلاج أو نتيجة المرض نفسه. إذا شعرت بهذه الأعراض، منع السيارة أو تشغيل ماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي ديكايبتيل ديبو 22.5 ملغ على أقل من 1 ميلمول (1 mmol) (23 ملغ) صوديوم في كل قنية. الدواء خالي تقريباً من الصوديوم ولذلك يمكن تناوله في حالة حمية غذائية قليلة الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

يجب عليك الحصول مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

الجرعة المتبعة عادة، هي حفنة واحدة كل ستة أشهر.

سيقوم الطبيب أو الممرضة بحقن الدواء بواسطة إعطاء داخل العضل.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا حقت عن طريق الخطأ جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه، فوراً، إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيتأخذ الحقنة في الوقت المحدد (كل ستة أشهر)، تشاور مع الطبيب المعالج.

يجب الاستمرار في العلاج حتى حالتك الصحية يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول أدوية في الظلام! تتحقق من الملصق ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال ديكايبتيل ديبو 22.5 ملغ أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل لأنّ تعاني من أيّ منها.

يجب التوجه فوراً للطبيب إذا كنت تعاني من صعوبات في البلع أو التنفس، انتفاخ في الشفتين، في الوجه، في البلعوم أو في اللسان، طفح جلدي. هذه قد تكون أعراض لرد فعل تحسسي أو وذمة عانية (وذمة) التي تم التبلّغ عنها في حالات نادرة (قد تؤثّر على حتى 1 من بين 1,000 شخص).

أعراض جانبية إضافية:

لدى الرجال

كما هو الحال في علاجات أخرى بأدوية من مجموعة GnRH agonists أو بعد عملية خصي، الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً نتيجة العلاج بـ triptorelin هي نتاج نشاط دوائي متوقع للدواء.

تشمل هذه الأعراض هبات حرارة وانخفاض في الرغبة الجنسية.

تم التبلّغ عن ارتفاع في تعداد الخلايا الليمفاوية (خلايا دم بيضاء) بين المرضى الذين تم علاجهم بنظير GnRH.

باستثناء ردود الفعل المناعية - التحسسية وردود فعل في موقع الحقن، جميع الأعراض الجانبية معروفة كمرتبطة بالتغييرات في مستوى التستوستيرون.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة

• هبات حرارة

• ضعف

• فرط في التعرق

• ألم ظهر

• إحساس بالوخز في الساقين

• انخفاض الرغبة الجنسية

• عجز جنسي

اعراض جانبية شائعة (common) اعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

- غثيان، جفاف في الفم
- ألم، كدمات، احمرار وانتفاخ في موضع الحقن، ألم عضلات وعظام، ألم في اليدين والساقين، وذمة (تراكم سوائل في أنسجة الجسم)، ألم في أسفل البطن
- ضغط دم مرتفع
- ردود فعل تحسسية
- ارتفاع في الوزن
- دوار، صداع
- فقدان الرغبة الجنسية، اكتئاب، تقلبات في المزاج

اعراض جانبية غير شائعة (uncommon) اعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

- ارتفاع في تعداد صفائح الدم
- إحساس بخفقان القلب
- طنين في الأذنين، دوار (vertigo)، تشوش الرؤية
- ألم بطن، إمساك، إسهال، تقيؤ
- تشوش، ارتجاف قوي المصحوب بعرق وسخونة، نعاس، ألم
- تغيير في فحوصات الدم (يشمل ارتفاع في إنزيمات الكبد)، ارتفاع في ضغط الدم
- انخفاض في الوزن
- فقدان الشهية، ازدياد الشهية، نقرس (الم قوي وانتفاخ في المفاصل عادة في الإبهام)، سكري، فانض الدهون في الدم
- آلام مفاصل، تشنجات عضلية، ضعف عضلي، ألم عضلي، انتفاخ وحساسية، ألم في العظام
- شعور بالوخز أو التقلّل
- عدم المقدرة على النوم، عصبية
- تضخم الثديين لدى الرجال، ألم في الثديين، تقلص الخصيّتين، ألم في الخصيّتين
- صعوبات تنفس
- حب الشباب، تساقط الشعر، حكة، طفح جلدي، احمرار الجلد، شرى
- تبول ليلي، اضطرابات في التبول
- نزيف من الأنف

اعراض جانبية نادرة (rare) اعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000

- بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد
- إحساس غير سليم في العين، اضطرابات أو تشوش الرؤية
- إحساس بالامتلاء في البطن، غازات، اضطرابات في حاسة الذوق
- ألم في الصدر
- صعوبة في الوقوف
- متلازمة شبيهة بالإنفلونزا، سخونة
- التهاب في الأنف/الحلق
- ارتفاع في حرارة الجسم
- تصلب وانتفاخ المفاصل، تصلب العضلات، التهاب مفاصل تكسي (osteoarthritis)
- فقدان الذاكرة
- إحساس بالارتباك، انخفاض في النشاط، شعور بالبهجة وشعور جيد
- ضيق تنفس أثناء الاستلقاء
- حويصلات
- ضغط دم منخفض

اعراض جانبية نسبة شيوها غير معروفة (اعراض جانبية لم يتم تحديد توادرها بعد)

- تغيرات في فحص كهربائية القلب E.C.G (إطالة مقطع QT)
- إحساس بعدم الراحة العامة
- قلق
- سلس البول
- في حالة وجود ورم في الغدة النخامية، ارتفاع في خطر حدوث نزيف في هذه المنطقة

لدى الأطفال

اعراض جانبية شائعة جداً (very common) اعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة

- نزيف مهبلي الذي يمكن أن يحدث لدى الفتيات خلال الشهر الأول من العلاج

اعراض جانبية شائعة (common) اعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

- ألم بطن
- ألم
- احمرار وانتفاخ في موضع الحقن
- صداع
- هبات حرارة
- ارتفاع في الوزن
- حب الشباب
- فرط حساسية

اعراض جانبية غير شائعة (uncommon) اعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

- تشوش الرؤية
- تقيؤات، حالات غثيان
- إمساك
- شعور بعدم الراحة بشكل عام
- ازدياد الوزن
- آلام في الرقبة
- تغييرات في المزاج
- ألم في الثديين
- نزيف من الأنف
- حكة
- طفح جلدي

اعراض جانبية نسبة شيوها غير معروفة (اعراض جانبية لم يتم تحديد توادرها بعد):

- ضغط دم مرتفع
- اضطرابات في الرؤية
- ردود فعل تحسسية خطيرة التي تؤدي إلى صعوبات في البلع، صعوبات تنفس، انتفاخ في الشفتين، في الوجه، في البلعوم أو في اللسان، شرى
- تغييرات في فحوصات الدم، بما في ذلك مستويات الهرمونات
- تكون سريع للشري نتيجة انتفاخ في الجلد أو في الأنسجة المخاطية
- ألم عضلي
- اضطرابات في المزاج
- اكتئاب
- عصبية
- ارتفاع الضغط مجهر السبب داخل الجمجمة (ارتفاع الضغط داخل الجمجمة حول الدماغ يتميز بالصداع، ازدواجية الرؤية وأعراض بصرية أخرى، ورنين أو طنين في الأذنين).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترنت للتبلغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجاًل رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهذا تجنب التسمم.

لا تسبّب التقىّو بدوره تعليمات صريحة من الطبيب. يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير في نفس الشهر.

يجب الحفظ في درجة حرارة تحت الـ 25°C، يجب استعمال المعلق المعاد تجهيزه فوراً بعد تحضيره.

6. معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة يحتوي المسحوق أيضاً على:

poly (d,L-lactide-co-glycolide) 72/25 cooh, poly (dl-lactide-co-glycolide) 85/15 lauryl ester, mannitol, carmellose sodium, polysorbate 80.

تركيب المذيب: ماء للحقن.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

المستحضر هو مسحوق ومذيب لصنع معلق لإطلاق معدن لغرض الحقن. المسحوق بلون أبيض حتى كريمي، والمذيب هو محلول شفاف.

تحتوي عبوة المستحضر على قنينة واحدة من المسحوق، أمبولة واحدة من المذيب، بالإضافة إلى ذلك تحتوي العبوة على محققة وإبرتين.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

فرينج فارماستيكالز م.ض.، شارع هشيطا 8، بارك هتسبياه، قيساريا 3088900

اسم المنتج وعنوانه:

Debiopharm Research & Manufacturing S.A., Switzerland

تم تحرير هذه النشرة في أيار 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 154-61-34193

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.

DOR-DEC 22.5 mg-P-PIL-0623-11