

עלון לצרcn לפי תקנות הרווחחים (תכשירים) התשמ"א - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

ركتوزوري®
משחה

	הרכב
Zinc oxide	10.0%
Bismuth oxychloride	8.0%
Benzocaine	4.0%
Thymol biiiodide	2.0%
Menthol	0.25%

ركتוזורי®
פתחילות

	הרכב
תימול ב-יידיד	150 מ"ג
ביסמוט סבגאלט	100 מ"ג
אבק אוקסיד	100 מ"ג
בנזוקאין	100 מ"ג
Tannic acid	20 מ"ג
Menthol	5 מ"ג

למידע על מרכיבים בלתי פעילים וآلרגניים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווחה.

עליך לשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3 בעalon זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיini המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים. התרופה אינה מיועדת למטופלים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?
הקללה בכabi טהורם.

קבוצה תרפואיית
תכשירים לטיפול בטחורים לשימוש בפי הטעבת (שימוש רקטואלי).

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, ראה סעיף 6- "מידע נוספת".
- אתה רגיש למאלחשים מוקומיים (פרוקאין, בוטאקאיין (butacaine) או לחומצה פרוא-אמיןובנזואית, לפראבנים או ל- (PPD) paraphenylenediamine או לצבעי שיער. ראה סעיף 6 - "מידע נוספת".
- מדובר בשטחי עור גדולים, בפריחה עורית, בכויות שמש, בעור פגום או מודלק או בפה או בעיניים.
- יש לך קצב לב איטי או לא סדי.
- יש לך היסטוריה או חשד לרמות פיגמנט (צבע) בدم לא תקיןות.
- יש שילוב עם תרופות מסווג סולפונאמידים או מעכבי כולין-אסטרואז.

ازהירות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה לפניהם בركטוזורין ספר לרופא אם:

- את בהירון, או אם אתה מניקה.
 - יש לך דימום מפני הטבעת (דימום וקטלי), דם בצוואר או אם אתה חשש שמקור הדימום שאתה חווית איינו בטחורים.
 - יש לך גרד כלילי בכל הגוף.
 - אתה מתחת לגיל 18 שנים.
 - אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.
 - אתה רגיש ליד.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת למטופלים מתחת לגיל 18 שנים.

תגובה בי-תרופתיות
אם אתה לוקחת, או אם תקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הירון, הנקה ופוריות
אין להשתמש בתרופה מבליל להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם אתה בהירון או מניקה.

הניגזה ושימוש במכונות רקטוצוריין משחה ופטילות אין בעלות השפעה על יכולת הניגזה והשימוש במכונות.

מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
רקטוצוריין משחה מכילה לנולין (fat wool) העולול לגרום לתגובה מקומית בעור (כגון דלקת עור ממגע).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

פטילות:

פטילה אחת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה (פעולות מעיים).

משחה:

יש למרוח את המשחה באזור פ' הטבעת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה (פעולות מעיים).

אין לעבר על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא.

אופן השימוש

אין לבולעו! תרופה זו מיועדת לשימוש בפי הטבעת (רקטום) בלבד.

الترופوت אין מיועדת מתחת לגיל 18 שנים.

משחה:

- רחץ ויבש בעדינות את אזור פ' הטבעת.
- מרח כמות קטנה של המשחה באזור פ' הטבעת ועשה בעדינות.
- סגור היטב את השפופרת.
- רחץ יידר.

פטילות:

- רחץ ויבש בעדינות את אזור פ' הטבעת.
- **הוראות פתיחה:** הפרד פטילה אחת מסרט הפטילות. להסרת עטיפת הפלסטייק, הפרד הלשוניות בחלק השטוח של עטיפת הפלסטייק ומשוך לצדדים עד יציאת הפטילה החוצה. ניתן להרטיב את הפטילה כמעט להקלת החדרה (ראיה הערה מטה).
- שכב על צידר והחדר הפטילה עמוק לתוך פ' הטבעת בעזרת האצבע.
- בסיום, רחץ היטב את יידר.

הערה: אם הפתילה רכה מדי, ניתן לצננה במקror במשך כ- 30 דקות או לצננה תחת מים קרים לפני הסרת עטיפת הפלסטייק.

אם גטלה מנת יתר או אם בטעות בלעת או בלע יlid מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אם שכחת ליטול את התרופה, קח את המנה הבאה לפי הצורך. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצוץ על המנה שנשכחה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברקטוצירין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שימושיות עד משתמש 1,000 מטופר):

יש להפסיק את השימוש ברקטוצירין ולפנות מיד לרופא אם:

- יש לך תגובה רגשות יתר, היכולה להתבטא בפריחה, אודם בעור, נפיחות קלה בעור, שלפוחיות, החמרה בגרד /או בגיןו .

תופעות לוואי נסכנות שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- צריבה, אדמומיות, גירוי, גרד או כאב בזמן מריחה/ החדרה של התרופה. אם תופעות אלה נמשכות יותר מכמה ימים, יש להיעזץ ברופא.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. AIR לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן תרופות אלו מתחת ל-25°C.**
- ניתן להשתמש ברקטוצירין משחה עד 12 חודשים לאחר פתיחת השפופרת לראשונה, אך לא לאחר תאריך התפוגה המופיע על האריזה.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולות ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין עוד בשימוש. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיבים הפעילים בתרופה מכילה גם:

משחה : Petrolatum, mineral oil, wool fat, purified water, yellow wax, cholesterol
פתיילות: Witepsol E-76, witepsol W-35

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה

רקטוצירין משחה: משחה בצבע צהוב.

האריזה מכילה שפופרת אלומיניום המכילה 50 גרם משחה.

רקטוצורין פטילות: פטילות בצבע צהבהב עד חום בהיר.
הארזה מכילה 12 פטילות.

שם הייצן ובעל הרישום וכתובתו:
טבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל-אביב, 6944020

העלון לצרכן נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
רקטוצורין משחה: 135.34.20466.00/01
רקטוצורין פטילות: 030.68.20618.00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.