

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

كاتجل مع ليدوكائين

جل للإدخال في الإحليل

التركيب:

المواد الفعالة وتركيزها:

Lidocaine hydrochloride 2%

Chlorhexidine dihydrochloride 0.05%

للمزيد من المعلومات عن المواد الفعالة يرجى قراءة الفقرة 6 في نهاية هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك/من أجلك. لا ت给他 الآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم/حالتهم الطبية مشابهة.

إذا كنت تعاني من أية أعراض جانبية، فتحذر من طببك أو مع الممرضة. بما في ذلك أعراض جانبية محتملة التي لم تذكر في هذه النشرة. انظر الفقرة 4.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص للإدخال في الإحليل قبل إدخال قنطر أو جهاز آخر، جهاز تنظير داخلي، جهاز تنظير المثانة.

الفصيلة العلاجية: ليدوكائين - مدر موضعي ; كلورهكسيدين - مطهر موضعي.

آلية عمل الدواء:

كاتجل مع ليدوكائين هو جل معقم ومدر.

بالإضافة إلى فعاليته كمادة مزلقة فإن له فعالية تخدير موضعي وقدرة على قتل البكتيريا - لتسكين الألم أثناء الإجراءات الطبية ولمنع التلوثات إلى حد كبير.

يبدأ التأثير خلال أقرب وقت، 5-10 دقائق تقريباً من وقت الإعطاء، ويستمر لمدة 20-30 دقيقة.

كمادة تخدير موضعية (مدر موضعي) فهو يحتوي على ليدوكائين. في حالة التخدير الموضعي (الذي يتم عن طريق الدهن على سطح الجسم)، فإن التأثير عادة ما يبدأ بعد حوالي 3-5 دقائق. في النسيج الإلتهابي، ينخفض التأثير.

من أجل منع حدوث تلوثات في مكان العلاج، يحتوي كاتجل مع ليدوكائين على كلورهكسيدين. هذا المركب يطهر ويقتل العديد من البكتيريا، فطريات معينة وفiroسات.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مذكورة في الفقرة 6).
- كان لديك فرط حساسية (أليرجيا) لمواد تخدير موضعية معينة أخرى (من فصيلة الأميدات).
- لدى أطفال دون عمر السنين.
- في حالة وجود Bulbocavernosus reflex (إصابة في البطانة الرقيقة للإحليل، والذي يمكن أن يتسبب في تغلغل مادة التزيلق إلى داخل النسيج الناعم [النسيج الإسفنجي للقضيب]، حيث قد يحدث هناك امتصاص).
- لدى متعالجين لديهم قصور شديد في القلب، نظم قلب بطيء بشكل ملحوظ، إضطرابات في التوصيل الكهربائي في القلب (AV block)، صدمة عقب قصور القلب أو انخفاض حجم الدم.

يرجى التحدث إلى طبيبك إذا كانت واحدة أو أكثر من تلك الحالات تنطبق عليك، أو إنطبقت عليك في أي وقت في الماضي.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ كاتجل مع ليدوکائين، إحك للطبيب إذا:

- إذا تم إستعماله بشكل متكرر وبمقدار دوائية مرتفعة، لأن ذلك قد يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة.
- إذا كان لديك أي جروح، إصابة في الأنسجة المخاطية أو تقرح/التهاب في منطقة العلاج المطلوبة أو حولها.
- إذا كان هناك خلل شديد في وظيفة الكبد أو الكلية لديك.
- إذا كان لديك خلل في وظيفة القلب أو الجهاز التنفسي.
- لدى المسنين، متعالجين منهكين أو في حالة مرضية حادة.
- إذا كنت معرضاً للتشنجات (الصرع).
- إذا كنت تعاني من مرض عضلي معين (الوهن العضلي الوبييل).
- إذا كنت تتلقى علاجاً بأدوية معينة لإضطرابات نظم القلب، المعروفة باسم الأدوية المضادة لإضطراب النظم من الفئة III (مثل أميدارون)، لأن التأثير على القلب قد يزداد.
- إذا كنت تعاني من مرض الپورفيريا (إضطراب يؤثر على إنتاج الدم).
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل.

إذا تم إدخال محتويات أكثر من محقنة واحدة في الإحليل، إذا وصلت كمية كبيرة من الجل إلى داخل المثانة أو إذا كان هناك إلتهاب أو قرحة في الإحليل، فإن امتصاص الليدوکائين عبر الأنسجة المخاطية قد يزداد بشكل عام، بالأخص لدى متعالجين أطفال ومسنين، ويسبب أعراضًا جانبية خطيرة (انظر أيضاً الفقرة 3، "إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر").

لا يجوز لـ كاتجل مع ليدوکائين ملامسة العينين.

في حالة التخدير العام، يجب تفضيل إستعمال مادة مزلاقة بدون ليدوكائين.

التفاعلات/التدخلات بين الأدوية:

- إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إلْحُك للطبيب أو للصيادي عن ذلك.
- لا يجوز إستعمال كاتجل مع ليدوكائين في نفس الوقت مع أدوية أخرى تحتوي على ليدوكائين أو على مواد تخدير موضعية معينة أخرى (من فصيلة الأميدات)، لأن هذا الأمر قد يزيد من التأثيرات المنسوبة إليهن بشكل لا يمكن توقعه.
- نظرًا لأنه قد يكون هناك تأثير متزايد على القلب، يجب إستعمال ليدوكائين بحذر لدى متعالجين يتلقون أيضًا أدوية مخصصة لعلاج إضطرابات نظم القلب (مضادات إضطراب النظم مثل مكسياتين، توكتاينيد)، إرتفاع ضغط الدم (مثبطات بيتا، مثل بروپرانولول) أو حاجبات قنوات الكالسيوم (مثل ديلتيازيم، فيрапاميل).
- لم يتم إجراء دراسات خاصة حول التداخلات الدوائية لـ ليدوكائين مع الأدوية المضادة لإضطرابات نظم القلب من الفئة III، على الرغم من ذلك، يوصى بتوكسي الحذر (انظر أيضًا "التحذيرات والإحتياطات")، حيث إن التأثير على القلب قد يكون متزايدًا.
- إذا كنت تتناول سيميتيدين (الذي يحجب إنتاج الحمض في المعدة)، فتحذر عن هذا الأمر مع طبيبك قبل العلاج بـ كاتجل مع ليدوكائين. قد يؤدي إستعمال مثل هذه الأدوية في نفس الوقت إلى إرتفاع خطورة حدوث أعراض جانبية.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، فقومي بإستشارة طبيبك أو الممرضة قبل الإستعمال.

أثناء الحمل والإرضاع، يجب إستعمال كاتجل مع ليدوكائين فقط بعد أن يقوم الطبيب بالتفكير بعناية بالفوائد والمخاطر ويقرر بشأن المقدار الدوائي الخاص بك.
لا يوصى بالإستعمال المتكرر أثناء الحمل والإرضاع.

يرجى الإنبهان لأن هنالك حاجة لفواصل زمني مقداره 12 ساعة بين إستعمال كاتجل مع ليدوكائين وبين موعد الإرضاع التالي!

السيارة وإستعمال الماكنات

لـ كاتجل مع ليدوكائين لا يوجد تأثير أو يوجد تأثير ضئيل على القدرة على السيارة أو إستعمال الماكنات. مع ذلك، لا يمكن إستبعاد وجود تأثيرات على القدرة على السيارة أو إستعمال الماكنات بشكل كلي في حالات الحساسيات الخاصة.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.
عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيادي إذا لم تكن واثقًا بالنسبة للمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو: محقنة واحدة. لا يجوز إدخال أكثر من محقنة واحدة (أنظر "طريقة الإستعمال").

إنتبه!

لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

يجب تجنب الملمسة مع العينين.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة الإستعمال:

الإستعمال داخل الإحليل قبل إدخال قثطار، جهاز تنظير داخلي أو جهاز طبي آخر

تحتوي م الحقن الأكورديون (التي ستسمي "محاقن" في السياق) على 12.5 غرام من الجل، ومنها يتم إدخال حوالي 10 غرام في الإحليل أثناء العلاج.

تعتمد كمية الجل التي يتم إدخالها على الظروف التشريحية للإحليل.

إدخال الجل ببطء في الإحليل قبل إدخال جهاز طبي. يتم إجراء العلاج فقط من قبل طبيب أو طاقم مدرب آخر.

1. نظف/ي فتحة الإحليل.

2. إنزع/ي الورق من عبوة اللويحة (البليستر) وإكسر/ي طرف القنينة.

3. حرر/ي قطرة واحدة من الجل حتى تكون عملية إدخال المطابق أكثر سهولة.

4. إضغط/ي تدريجياً لإدخال محتوى القنينة.

محاقن كاتجل مع ليدوكائين مخصصة للإستعمال لمرة واحدة. تخلص من أية بقايا من الجل في المحقق التي لم يتم إفراغها بالكامل.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

في حالة ظهور علامات لمقدار دوائي مفرط، اتصل فوراً بالطبيب أو بالمستشفى.

نظرأ لأن هذا الدواء يتم إعطاؤه من قبل طبيب أو طاقم طبي مدرب، فمن غير المتوقع تلقي مقداراً دوائياً مفرطاً.

على الرغم من ذلك، في بعض الحالات من الجائز تلقي مقداراً دوائياً مفرطاً، على سبيل المثال، إذا لم تتم ملائمة كمية الجل التي تم إعطاؤها على النحو الأمثل للمتعالج، إذا دخلت كمية كبيرة من الجل في المثانة، أو في حالة الأنسجة المخاطية المصابة بالإلتهاب، تقرحات أو جروح، كل حالة منها يمكن أن تؤدي إلى زيادة إمتصاص الليدوکائين مما يؤدي إلى حدوث إضطرابات في الجهاز العصبي المركزي أو في جهاز القلب والأوعية الدموية. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتم الإستعمال بالتزامن مع مواد تخدير موضعية أخرى.

قد يحدث تنشيط/تنبيط للجهاز العصبي المركزي في حالة تلقي مقداراً دوائياً مفرطاً، والذي يمكن أن يتجلّى بأعراض مثل عصبية، دوران، شعور بالنعاس والإرتجاف. العلامات الأولى لمقدار دوائي مفرط يمكن أن تكون خدر في اللسان ("خدر" في اللسان)، تقلصات لا إرادية للعينين، دوران أو إرهاق.

الأعراض الجانبية في جهاز القلب والأوعية الدموية، مثل تباطؤ نبضات القلب، خلل في وظيفة القلب أو إنخفاض حاد في ضغط الدم، عادةً ما تحدث فقط عند وجود تراكيز عالية جداً من الليدوکائين في الدم.

يمكن أن يحدث شلل تنفسي وفشل قلبي وعائي (جهاز القلب والأوعية الدموية) في حالة تلقى مقداراً دوائياً عالياً جداً من الليدوكتين.

إذا تلقيت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، فتوجه فوراً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

ملاحظة للطاقم الطبي: مزيد من المعلومات حول المقدار الدوائي المفرط تظهر في نهاية النشرة.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر لذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستثمر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال كاتجل مع ليدوكتين قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

أعراض جانبية شائعة جداً - (very common) أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة.

أعراض جانبية شائعة - (common) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100.

أعراض جانبية غير شائعة - (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000.

أعراض جانبية نادرة - (rare) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000.

أعراض جانبية نادرة جداً - (very rare) أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000.

أعراض جانبية ذات شيوخ غير معروف (أعراض لم يحدد شيوخها بعد).

الأعراض الجانبية بعد إستعمال كاتجل مع ليدوكتين هي نادرة إذا تم إستعمال المنتج وفقاً لتعليمات المقدار الدوائي/توصيات الإستعمال وإتخاذ الاحتياطات الالزمة (انظر الفقرة 2).

التأثيرات على الجهاز العصبي المركزي وجهاز القلب والأوعية الدموية

هذه الأعراض ناتجة بشكل رئيسي عن إمتصاص سريع، مقدار دوائي مفرط أو فرط حساسية. قد تحدث الأعراض التالية:

عصبية، دوار، تنشوش في الرؤية أو ارتجاف، شعور بالنعاس، فقدان الوعي، سكتة تنفسية، إنخفاض حاد في ضغط الدم، نظم قلب بطيء، سكتة قلبية. للتدارير التي يجب إتخاذها في حالات حدوث الأعراض الجانبية انظر الفقرة 3 - "إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر".

الإضطرابات العامة والشروط في منطقة العلاج

نظرًا لأن إستعمال طب المسالك البولية من المتوقع أن ينتهي به الأمر إلى نسب منخفضة لليدوكتين في الدم، فإن أعراضًا جانبية أخرى لا تظهر عادة بعد إدخال كاتجل مع ليدوكتين في الإحليل.

مشاكل في الجهاز المناعي

في حالات نادرة تظهر أعراض لفرط حساسية موضعية مثل إحمرار، وخز أو حكة و/أو ردود فعل جهازية تجاه الليدوکائين وأ/أو الكلورهكسيدين، على الرغم من أنه لا يمكن إستبعاد حدوث تفاعلات خطيرة (مصحوبة في بعض الأحيان مع إنخفاض حاد في ضغط الدم، دوار، غثيان ومن الجائز ضيق في التنفس)، بما في ذلك صدمة تأقية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لنفادهم بالتسنم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp.Date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب تخزين الدواء في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. يجب الحفظ في العلبة الكرتونية من أجل الحماية من الضوء.
- محافن كاتجل مع ليدوکائين مخصصة للاستعمال لمرة واحدة. تخلص من أيه بقايا من الجل في المحافن التي لم يتم إفراغها بالكامل.
- لا يجوز رمي الأدوية للمجارى أو لقمامدة المنزلية. يجب التخلص من الدواء من قبل طاقم طبى مدرب عندما لا تعود هناك حاجة لاستعماله. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Hydroxyethylcellulose, Glycerol, Sodium lactate solution, Water for injection, Sodium hydroxide solution and Hydrochloric acid solution for pH adjustment.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

جل يذوب في الماء وشفاف، عديم اللون.
منتج معقم للاستعمال لمرة واحدة.

يتوفر الجل في محافن أكورديون ذات 12.5 غرام. كل من المحافن معبأة في عبوة لوبيحة (بليستر)
وتتضمن التعقيم بالبخار. اللويحات معبأة ضمن علب كرتونية.

25 محققة أكورديون ذات 12.5 غرام من الجل في علبة كرتونية.

• صاحب الإمتياز وعنوانه:

ع. ليبدوت فارماسوبيكالس م.ض.، شارع هاشيطا 8، بارك الصناعة، قيساريا 3088900

• إسم المنتج وعنوانه:

Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, Salzberstrasse 96, A-6067 Absam, Austria

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

134-65-31156-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المعلومات التالية مخصصة للطاقم الطبي المتخصص فقط:

إجراءات الطوارئ في حالة المقدار الدوائي المفرط

علاج التسمم في منطقة الجهاز العصبي المركزي (التشنجات، تثبيط الجهاز العصبي المركزي) أو في جهاز القلب والأوعية الدموية يكون عن طريقة علاج الأعراض، على سبيل المثال عن طريق إعطاء أدوية مضادة للتشنجات وأو دعم قلبي رئوي طاري:

- التوقف الفوري عن إعطاء الليدوكانين
- إبقاء المسالك الهوائية مفتوحة
- إعطاء الأوكسجين حتى تعود جميع المؤشرات الضرورية إلى القيم الطبيعية
- مراقبة ضغط الدم، نظم القلب وعرض حدقة العينين.

علاجات ممكنة أخرى

في حالة الإنخفاض الشديد لضغط الدم الذي يشكل خطراً على الحياة، يتم العلاج برفع الرجلين وتسريب وريدي بطيء لمستحضرات بيتا مقلدات الودي (beta-sympathomimetic) (مثل 10-20 نقطه في الدقيقة من محلول إيزوپيرينالين 1 ملغ في 200 مل محلول چلوكوز 5%) وإستكمال الحجم الناقص/علاج بإستبدال السائل.

في حالة زيادة توتر العصب المبهم (نظم قلب منخفض - بطء القلب)، يتم العلاج بإعطاء 1.0-0.5 ملغ أتروپين عن طريق التسريب الوريدي.

يتم علاج التشنجات التي تستمر لأكثر من 30 ثانية عن طريق إعطاء مستحضر مضاد التشنجات (تيوبنتال الصوديوم 3-1 ملغ/كغم في الوريد أو دياربيام 0.1 ملغ/كغم من وزن الجسم، عن طريق الوريد).

يمكن السيطرة على التشنجات المستمرة عن طريق حقن مرخ للعضلات (مثل سُكسينيل كولين [سُكساميتونيوم] 1 ملغ/كغم من وزن الجسم).

تم إعدادها في أيار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.