

## עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

### **סמביליקס 20 מ"ג**

### **סמביליקס 40 מ"ג**

**טבליות מצופות**

#### **חומר פעיל**

**סמביליקס 20 מ"ג:** כל טבליה מצופה מכילה אסימיניב הידרוולוריד, השווה בערכו לאסימיניב 20 מ"ג asciminib hydrochloride, equivalent to asciminib 20 mg

**סמביליקס 40 מ"ג:** כל טבליה מצופה מכילה אסימיניב הידרוולוריד, השווה בערכו לאסימיניב 40 מ"ג asciminib hydrochloride, equivalent to asciminib 40 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר - ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספים".  
קרה בעיון את **העלון עד סופו** בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### **1. ומה מיועדת התרופה?**

טיפול במוגדים עם:

- локמיה מייאלאידית כרונית חיובית לכромוזום פילדלפיה (Ph+ CML) בשלב כרוני (CP), טיפולו בעבר בשתי תרופות מסוג מעכבי טירוזין קינאז או יותר.
- локמיה מייאלאידית כרונית חיובית לכромוזום פילדלפיה (Ph+ CML) בשלב כרוני (CP) עם המוטציה T315I.

**קבוצה רפואיית:** תרופות אנטינאופלסטיות, מעכבות טירוזין קינאז

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אסימיניב או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).

**اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני תחילת הטיפול בסמביליקס, ספר לרופא לגבי כל מצב רפואי שלך, כולל אם:**

- יש לך ספירת תא דם נמוכה (דיכוי מוח עצם)
- סבלת בעבר מדלקת לבלב (פנקראיטיטיס) /או עליה ברמות אנדמיים בדם שנקראים עמליאל וליפאץ
- יש לך לחץ דם גבוה (יתר לחץ דם)
- יש לךTAG-ות אלרגיות (רג'ישוט יתר)
- סבלת בעבר מביעות לב או קריישי דם בעורקים ובוורידים (סוגים של כלי דם)
- את בהירון או מתכוננת להיכנס להירון
- את מניקה או מתכוננת להנין

ראה פרק 4 "תופעות לוואי" ופרק 2 סעיף "הירון, הנקה ופוריות".

#### **ילדים ומתבגרים**

סמביליקס לא מיועד לשימוש ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.  
לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים ומתבגרים.

## **בדיקות ועקב**

במהלך הטיפול בסמבליקס תעבור בדיקות דם ובדיקות לחץ דם תקופתיות.

## **איןטראקטיות/תגובה בין תרופות אחרות**

אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת כול תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.  
במיוחד אם אתה לוקח:

### **השפעת תרופות אחרות על סמבליקס**

#### CYP3A4 מעכבים חזקים של סמבליקס

מתן מושלב של סמבליקס עם מעכב חזק של CYP3A4 (כגון: קלייריטרומיצין, טלייטרומיצין, טרולאנדומיצין, איטרווקונזול, קטווקונזול, וריוקונזול, ריטונאבר, אינידנאבר, נלפינבר או סאקוונינאבר) מעלה את רמות אסימיניב בدم, דבר העולול להגבר את הסיכון לתופעות לוואי. במקרה של טיפול מושלב בסמבליקס 200 מ"ג פעמיים ביום יחד עם מעכב חזק של CYP3A4, תידרש למעקב קפדי על ידי הרופא לתופעות לוואי.

#### תמיישה לשתייה של איטראקונזול המכילה הידרוקסיפרופיל-β - ציקלודקסטרין

מתן מושלב של סמבליקס עם תמיישה לשתייה של איטראקונזול המכילה הידרוקסיפרופיל-β - ציקלודקסטרין מפחית את רמות אסימיניב בדם, מה שעלול להפחית את הייעילות של סמבליקס. הימנע משימוש מושלב של סמבליקס בכל המינונים המומלצים יחד עם תמיישה לשתייה של איטראקונזול המכילה הידרוקסיפרופיל-β - ציקלודקסטרין.

### **השפעת סמבליקס על תרופות אחרות**

#### CYP3A4 סובסטרטים מסוימים של סמבליקס

מתן מושלב של סמבליקס עם סובסטרטים של CYP3A4 (כגון: פנטניל, אלפנטניל, דיהידרארגוטמין או ארגוטמין) מעלה את הרמות בדם של סובסטרטים מסוימים של CYP3A4, מה שעלול להגבר את הסיכון לתופעות לוואי של סובסטרטים אלו.

במקרה של טיפול מושלב בסמבליקס במינון יומי של 80 מ"ג עם סובסטרטים מסוימים של CYP3A4, במקרים ששינויים מזעריים בריכוז עלולים להוביל לתופעות לוואי. הימנע משימוש מושלב של סמבליקס במינון יומי של 80 מ"ג פעמיים ביום עם סובסטרטים מסוימים של CYP3A4, במקרים בהם שינוי מזעריים בריכוז עלולים להוביל לתופעות לוואי רציניות.

הימנע משימוש מושלב של סמבליקס במינון 200 מ"ג פעמיים ביום עם סובסטרטים מסוימים של CYP3A4, במקרים בהם ניתן למינעה, הרופא ינחה אותה לשקל טיפול חלופי עם סובסטרט לא מסוג 9.

#### CYP2C9 סובסטרטים של סמבליקס

מתן מושלב של סמבליקס עם סובסטרטים של CYP2C9 (כגון: פנטואין או ורפארין) מעלה את הרמות בדם של סובסטרטים מסוימים של CYP2C9, מה שעלול להגבר את הסיכון לתופעות לוואי. הימנע מתפקיד מושלב של סמבליקס במינון יומי של 80 מ"ג עם סובסטרטים מסוימים של CYP2C9, במקרים שבהם שינוי מזעריים בריכוז עלולים להוביל לתופעות לוואי רציניות. אם לא ניתן להימנע מטיפול מושלב, הרופא ינחה אותה להוריד מינון של סובסטרטים של CYP2C9.

הימנע משימוש מושלב של סמבליקס במינון 200 מ"ג פעמיים ביום עם סובסטרטים רגיסרים של CYP2C9 וסובסטרטים מסוימים של CYP2C9, במקרים בהם שינוי מזעריים בריכוז עלולים להוביל לתופעות לוואי חמורות. אם טיפול מושלב לא ניתן למינעה, הרופא ינחה אותה לשקל טיפול חלופי עם סובסטרט לא מסוג 9.

#### P-gp סובסטרטים מסוימים של סמבליקס

מתן מושלב של סמבליקס עם סובסטרטים של P-gp (כגון דיגוקסין) מעלה את הרמות של הסובסטרטים של P-gp בדם, מה שעלול להגבר את הסיכון לתופעות לוואי של סובסטרטים אלו.

במקרה של טיפול מושלב עם סמבליקס במינון יומי של 80 מ"ג יחד עם סובסטרטים של P-gp, הרופא ידרש לנטר מקרים תופעות לוואי.

### **שימוש בתרופה ומזון**

יש ליטול סמבליקס ללא מזון. עליך להימנע מאכילה במשך לפחות שעתיים לפני ושעה אחת לאחר נטילת סמבליקס.

### **הירין, הנקה ופוריות**

#### הירין

עליך להודיע לרופא אם אתה בהירין או מתכונת להרות. סמבליקס יכול לפגוע בעובר.

- הרופא יבצע בדיקת הירין לפני תחילת הטיפול בסמבליקס.
- נשים המטוגנות להרות צריכות להשתמש באמצעות מניעה עילית במהלך הטיפול ובמשך שבוע אחד לאחר המנה האחרונה של סמבליקס. שוחח עם הרופא על אמצעי המנעה העשויים להתאים לך.
- אם נכנסת להריון או אם אתה חושבת שאתה חי皇上 בהריון במהלך הטיפול בסמבליקס, דוחח לרופא מייד.

## הנתקה

עליך לידע את הרופא אם את מניקה או מתכוננת להנתק. לא ידוע אם סמבליקס עוברת לחלב אם. אין להנתק במהלך הטיפול ובמשך שבוע אחד לאחר המנה האחורה של סמבליקס.

## פוריות

סמבליקס עלולה לגרום לביעות פוריות בנשים. הדבר עלול לגרום ביכולת להיכנס להריון. שוחחי עם הרופא אם הדבר מתריד אותו.

## נהיגה ושימוש במכונות

לאסימיניב אין כלל השפעה או השפעה זניחה על היכולת לנוהג ולהפעיל מכונות. אם אתה חווית חוויה סחרחות, עייפות או תופעות לוואי אחרות שועלות להשפעה על היכולת לנוהג בזיהירות או להשתמש במכונות לאחר קייחת התרפיה, עליך להמנע מעמילויות אלו עד אשר ההשפעה תעלם.

## מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרפיה

**סמבליקס מכילה לקטוז** אם נאמר לך על ידי הרופא שאתה סובלמאי סבירות לSOCIAL מוסמיים, עליך ליצור קשר עם הרופא לפני נטילת תרופה זו.

## סמבליקס מכילה נטרן

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נטרן (23 מ"ג) לטבלייה, כלומר היא למעשה נטרן.

## 3. כיצד השתמש בתרפיה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל בחולים עם לוקמיה מייאלאידית כרונית חיובית לכרכוזום פילדלפיה בשלב כרוני הוא:

80 מ"ג פעמיים ביום במשך 40 מ"ג פעמיים ביום במרוחקים של כ-12 שעות.

המינון המקובל בדרך כלל בחולים עם לוקמיה מייאלאידית כרונית חיובית לכרכוזום פילדלפיה בשלב כרוני עם המוטציה 3153T הוא:

200 מ"ג פעמיים ביום במרוחקים של כ-12 שעות.

יש ליטול סמבליקס ללא מזון. **עליך להימנע מאכילה** במשך לפחות שעתיים לפני ושעה אחת לאחר נטילת סמבליקס.

אין לשנות את המינון או לוח הזמן או להפסיק את נטילת סמבליקס, אלא אם הרופא מורה לך על כן.

הרופא עשוי לשנות את המינון או להפסיק את הטיפול באופן זמני או לצמצמות אם יהיה לך תופעות לוואי מסוימות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לבлевר טבליות סמבליקס בשלהמונות. אין לשבר, לכתוש או ללעוז טבליות סמבליקס.

## אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעלך מן התרפיה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי בבית החולים והבא את אריזת התרפיה איתך.

## אם שכחת ליטול את התרפיה

- אם אתה נוטל סמבליקס **פעם אחת ביום** והחמצת מנה ביום מ-12 שעות, יש לדלג על המנה שהחמצה וליטול את המנה הבאה במועד הרגיל.
- אם אתה נוטל סמבליקס **פעמיים ביום** והחמצת מנה ביום מ-6 שעות, יש לדלג על המנה שהחמצה וליטול את המנה הבאה במועד הרגיל.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שאתה נוטל תרפיה. הרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרפיה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסמבליקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימה של תופעות הלוואי.  
יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

##### סמבליקס עלולה לגרום לתופעות לוואי רציניות, לרבות:

- ספירותת דם נמוכות. סמבליקס עלולה לגרום לספירותת נמוכות של טסיות (טרומבוציטופניה), לספירותת נמוכות של תאי דם לבנים (נויטרופניה) ולספירותת נמוכות של תאי דם אדומים (אנמיה). הרופא יבצע בדיקות דם כדי לבדוק את ספירותת תאי הדם כל שבועיים במשך שלושה חודשים הראשונים, ולאחר מכן אחת לחודש או לפחות בחודש אחד במהלך הטיפול בסמבליקס. דוח לרופא מייד אם אתה סובל מדימום בלתי צפוי או מחברות (שטיי דם) הנוצרות בקלות, מבחין בדם בשתן או בצואה, סובל מחרום או מסימנים כלשהם של זיהום.
- בעיות לבלב. סמבליקס עלולה לגרום לעלייה בرمמות האנ贊ימים עמילאץ וליפאץ בדם, אשר עלולה להוות סימן לדלקת הלבלב. הרופא עשוי לבצע בדיקות דם אחת לחודש או לפחות בחודש אחד במהלך הטיפול בסמבליקס כדי לאבחן בעיות לבלב. דוח לרופא מייד אם אתה סובל מכאב או מאין-נוחות פתאומיים באזורי הקיבה, מבחילה או מהקאה.
- לחץ דם גבוה. הרופא עשוי לבדוק את לחץ הדם שלך ולטפל בלחץ דם גבוה במהלך הטיפול בסמבליקס לפחות בחודש אחד. דוח לרופא אם אתה מפתח לחץ דם מוגבר או תסמינים של לחץ דם גבוה, לרבות בלבול, כאבי ראש, סחרחות, כאב בחזה או קוצר נשימה.
- **תגובה אלרגית.** הפסיק את נטילת סמבליקס ופנה לעזרה רפואי מייד אם אתה מפתח סימנים או תסמינים כלשהם של תגובה אלרגית, לרבות:
  - קושי בנשימה או בבליעה
  - נפיחות של הפנים, השפתיים או הלשון
  - פריחה בעור או סומך בעור
  - תחושת סחרחות או עילפון
  - חום
  - קצב לב מהיר
- **בעיות לב וכלי דם (קרדיוסקளוריות).** סמבליקס עלולה לגרום לביעות לב וכלי דם, לרבות התקף לב, שבץ, קרייש דם או חסימת עורקים, אי ספיקת לב וקצב לב לא תקין, אשר יכולות להיות רציניות ועוללות לעיתים להוביל למוות. בעיות אלו בלב ובכלי דם יכולות להופיע אצל אנשים עם גורמי סיכון או בעלי היסטוריה של בעיות אלו, ואו אצל אנשים שטופלו בעבר בתרופות מעכבות טירוזין קינאז אחרות. הרופא עשוי לבצע מוקב לצורך אבחון בעיות לב וכלי דם ולטפל בכך לפחות בחודש במהלך הטיפול בסמבליקס. דוח לרופא או פנה לעזרה רפואי מייד אם אתה מפתח:
  - קוצר נשימה
  - כאב או לחץ בחזה
  - תחושה שהלב פועם בקצב מהיר מדי או שאתה מרגיש פעימות לב בלתי תקיןות
  - נפיחות בקרסולאים או בכפות הרגליים
  - סחרחות
  - עלייה במשקל
  - חוסר תחושה או חולשה מצד אחד של הגוף
  - ריאדה בריאות או איבוד ראייה
  - קושי בדברור
  - כאב בידים, ברגליים, בגב, בצוואר או בלסת
  - כאב ראש
  - כאב חמוץ באזורי הקיבה
- חום
- דיזום בדרכי השתן
- כאב ראש
- כאב בטן
- הקאה
- דיזום בריאות (דלקת ריאות)
- כאב בשירים, בעצמות או במפרקים
- דימום
- עצירות
- כאב בחזה, שיעול, שיהוקים, נשימה מואצת, הצלברות של נוזל בחלל בין הריאות לבין החזה, שבמידה וחרום יכול לגרום לחוסר נשימה (תפליט פלוראל')

## תופעות הלואין השכיחות ביותר של סמבליקס כוללות (מופיעות באחד או יותר מעשרה משתמשים):

- זיהומים באף, בגרון או בסינוסים (דרך הנשימה העליונה)
- כאב בשירים, בעצמות או במפרקים
- כאב ראש
- עייפות
- בחילה
- פריחה
- שלשול
- הקאה
- דימום
- כאב במפרקים (ארטראלגייה)
- נפיחות כללית (בצקת)
- גרד
- שיעול
- יתר לחץ דם
- כאב בטן

### המטղוגיה

- ירידה בספירות של טסיות, תאֵ דם לבנים ותאי דם אדומים

### ביבוכינה

- עליה ברמות של שומנים (טריגליצרידים, כולסטרול) בدم
- עליה ברמות של קרייטין קיאז בדם
- עליה ברמות של אנזימי כבד בדם
- עליה ברמות של אנזימי לבב (עמילאז וליפאז) בדם
- עליה ברמות של חומצה אורית בדם
- ירידה ברמות פוספטאט
- ירידה ברמות סיידן מתוקנות
- עליה ברמות של קרייטינין בדם
- עליה ברמות שלALK-LIN פוספטאז
- עליה ברמות של ביילירובין בדם
- עליה או ירידה ברמות אשלגן בדם

### **תופעות לוואי נוספות כוללות:**

- אי ספיקת לב
- חום
- זיהום בדרכי השתן
- זיהום בריאות (דלקת ריאות)
- עצירות
- קצב לב לא תקין, כולל שינויים בפעולות החשמלית של הלב ( הפרעת קצב (אריתמיה), כולל הארכת מקטע QT באק"ג)
- כאב בחזה, שיעול, שיוהוקים, נשימה מואצת, הצבירות נזול בחלל בין הריאות לבין החזה, שבמקרה שהוא חמורה יכולה לגרום לחוסר נשימה (תפליט פלאורילי)
- קוצר נשימה, נשימה מואצת
- סחרחות
- רמות גבוהות של שומנים/לפיידים (דיסלפידמיה)
- ירידה בתיאבן
- פריחה مجرדת (ארטיקרייה)
- זיהום של הריאות והסمفונות (דרך הנשימה התחתוניות)
- שפעת
- הרגשה של דפוקות לב מהירות וחזקota (פלפיטציות)
- טשטוש ראייה
- יובש בעין

- תחת-פעולות של בלוטת התריס עם עלייה אפשרית במשקל, אגירת נוזלים, עצירות, ריגשות לקור (היפותירואידיזם)
- חום מעל 38°C המקשר עם רמה נמוכה של תא דם לבנים (נויטרופניה פיברלית)
- דלקת לבלב (פנקראטיטיס)
- פגעה עצבית (נוירופתיה הקפית)

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחcia על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקורי לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה ל קישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. אורך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי התופה (*exp. date*) המופיע על גבי האריזה והמגשית.
- תאריך התופה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אין לאחסן מעל 25°C. יש לאחסן באירוע המקורית על מנת להגן מלחות.

## 6. מידע נוספת

### נוסך על המרכיב הפעיל בתרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose (E460i), hydroxypropylcellulose, low-substituted (E463),croscarmellose sodium (E468),polyvinyl alcohol (E1203),titanium dioxide (E171),magnesium stearate, talc (E553b), colloidal silicon dioxide, lecithin (E322), xanthan gum (E415),iron oxide red (E172)

טבליות מצופות 20 מ"ג מכילות בנוסך:

iron oxide yellow (E172)

טבליות מצופות 40 מ"ג מכילות בנוסך:

iron oxide black (E172)

ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האירועה:

**סמליקס 20 מ"ג:** טבליה מצופה, עגולה, ללא קו חציה, קמורה בשני צדיה עם קצוצות משופעים, עם קוטר של כ- 6.2 מ", בצלע צהוב בהיר. על כל טבליה מוטבע המספר "20" בצד אחד והלוגו של נוברטיס בצד השני.  
**סמליקס 40 מ"ג:** טבליה מצופה, עגולה, ללא קו חציה, קמורה בשני צדיה עם קצוצות משופעים, עם קוטר של כ- 8.2 מ", בצלע סגול ולבן. על כל טבליה מוטבע המספר "40" בצד אחד והלוגו של נוברטיס בצד השני.

כל אריזה מכילה 20 או 60 טבליות מצופות.

יתכן שלא כל גודל האריזות משוקם.

**בעל הרישום והיבואן וכותבתו:** נוברטיס ישראל בע"מ, ת"ד 7126, תל אביב.

נערכ ביוני 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות:**

**סמליקס 20 מ"ג:** 172-84-37483-99

**סמליקס 40 מ"ג:** 172-85-37484-99

לשם הפשתות ולהקלת הקיראה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.