

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986

يُسَوَّق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

هالوبير 0.5 ملغ أقراص

هالوبير 5 ملغ أقراص

هالوبير 10 ملغ أقراص

يحتوي كل قرص من هالوبير 0.5 على:

0.5 ملغ هالوبيريديول

يحتوي كل قرص من هالوبير 5 على:

5 ملغ هالوبيريديول

يحتوي كل قرص من هالوبير 10 على:

10 ملغ هالوبيريديول

للإطلاع على المواد غير الفعالة ومبيئات الأرقام في المستحضر - انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات

إضافية".
كنت تعاني من مرض عصبي ضمورى في الدماغ -

Progressive Supranuclear Palsy (PSP).

كنت تعاني من اضطراب قلبي يسمى "متلازمة QT الطويلة" أو من أي مشكلة أخرى في نظم القلب تظهر نتيجة شاذة في مخطط ECG (أي.كي. جي. - إلكترونكارديوجرام).

كنت تعاني من قصور القلب أو أصبت مؤخرا بنوبة قلبية.
كنت تعاني من مستوى منخفض للروتاسيوم في الدم لم يتم علاجه.
كنت تستعمل أحد الأدوية الواردة في قائمة الأدوية التي لا يجوز استخدامها سوياً مع هالوبير (انظر البند 2 "التفاعلات بين الأدوية").

لا يجوز استعمال الدواء إذا كان أحد الأمور المسجلة أعلاه ينطبق عليك، إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر طبيبك قبل استعمال الدواء.
العمر:

- علاج الفصام (نيزوفرينيا) واضطراب الفصام الوجداني.
- لعلاج الحاد للارتباك الحاد (الهذيان) بعد فشل العلاجات غير الدوائية.
- لعلاج أحداث الهوس المعتدلة إلى الخطيرة، المرتبطة بالاضطراب الثنائي القطب، عند عدم إمكان استعمال علاجات أخرى.
- علاج عدم الهدوء (الهياج) الحركي-النفسي الحاد المرتبط باضطراب ذهاني أو بأحداث هوس على خلفية الاضطراب الثنائي القطب.
- علاج العدوانية المتواصلة والأعراض الذهانية لدى المرضى المصابين بالخرف المعتدل إلى الخطير على خلفية اضطراب الثنائي القطب.
- والخرف الوعائي بعد فشل العلاجات غير الدوائية وعند وجود خطر للإضرار بالنفس أو للإضرار بالآخرين.
- لعلاج اضطرابات العزّة، بما في ذلك متلازمة توريت، لدى المرضى الذين لديهم إصابة بليغة بعد فشل العلاجات التربوية، النفسية والدوائية الأخرى.
- لعلاج الأرقاض الخفيف إلى المعتدل في مرض هانتينجتون، عندما تكون المستحضرات الطبية الأخرى غير فعالة أو لا يمكن تحملها.
- بالنسبة للأولاد المرضى:
- لعلاج الفصام لدى المراهقين من سن الـ 13 إلى الـ 17 عند فشل العلاجات الدوائية الأخرى أو عدم تحملها.
- لعلاج العدوانية الخطيرة المتواصلة لدى الأولاد والمراهقين من سن الـ 6 إلى الـ 17 المصابين بالتوحد أو باضطرابات تطورية موسعة، عند فشل العلاجات الدوائية الأخرى أو عدم تحملها.
- لعلاج اضطرابات العزّة، بما في ذلك متلازمة توريت، لدى الأولاد والمراهقين من سن الـ 10 إلى الـ 17 الذين لديهم إصابة بليغة بعد فشل العلاجات التربوية، النفسية والدوائية الأخرى.

- مشاكل في الكليتين، في الكبد أو في الغدة الدرقية (قرط الدرقية).
- مستوى مرتفع للهرمون يرولاكتين في الدم، أو سرطان قد ينجم عن مستويات مرتفعة ليرولاكتين (سرطان الثدي).
- سيرة مرضية من الخثرات الدموية أو سيرة مرضية عائلية من الخثرات الدموية.

اكتئاب أو الاضطراب الثنائي القطب وبدأت تشعر بالاكتئاب.

قد تحتاج إلى متابعة أكثر كثبًا وقد تكون هناك حاجة إلى تغيير الجرعة الدوائية التي تستعملها من هالوبير.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان أحد الأوضاع المفصلة أعلاه ينطبق عليك، فاستشر طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال هالوبير.

❗ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) لل مادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- كنت أقل إرباكًا للأشياء التي تحدث من حولك أو إذا أصبحت ردود فعلك بطيئة بشكل غير عادي.
- كنت تعاني من اليركيسون.
- لا يجوز استعمال هالوبير لدى الأولاد الذين سنهم دون الـ 6، وذلك لأنه لم تتم دراسة الدواء كما ينبغي في هذه الفئة العمرية.

❗ الحفوص والمتابعة

قد يحبك طبيبك إلى فحص مخطط كهربية القلب (أي.كي.جي) قبل العلاج بهالوبير أو خلاله، لفحص النشاط الكهربائي للقلب.

كذلك، قد يحبك طبيبك إلى فحص الدم لفحص مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم (أو إلكترونوليت آخر) في الدم قبل العلاج بهالوبير أو خلاله.

❗ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا دوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لا يجوز استعمال هالوبير إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية:

- مشاكل نظم القلب (مثل: أمبودارون، دوفيتيليد، ديزوبيراميد، لنتهدنة أو للمساهمة في علاج اضطرابات النوم (الأدوية المهدنة).
- دريندارون، إبيوتيليد، كينيدين، سوتالول).
- الاكتئاب (مثل: سيتالوبرام وإيسيتالوبرام).
- الذهان (مثل: فلوفينازين، ليفوميبرمازين، بيرفينازين، يميزويد، بروكلوربيرازين، برومازين، سترتيندول، ثيوريدازين، تريفلوبيرازين، تريفلوربيرازين وزيبراسيدون).
- التلوثات الجرثومية (مثل: أزيثروميسين، كلاريثروميسين، إيريثروميسين، ليفوفلوكساسين، موكسيفلوكساسين وتيليثروميسين).

الخطيرة عند استعمالك لهالوبير لأنك قد تحتاج إلى علاج طبي مستعجل (انظر "انتبه للأعراض الجانبية الخطيرة" في البند 4).

❗ الأشخاص المسنون والأشخاص المصابون بالخرف

تم التبليغ عن ارتفاع طفيف في حالات الموت والسكته الدماغية لدى الأشخاص المسنين المصابين بالخرف، الذين يستعملون الأدوية المضادة للذهان. تحدث مع طبيبك قبل أن تستعمل هالوبير إذا كنت مسنًا، خاصة إذا كنت تعاني من الخرف.

قد تزيد هذه الأدوية من خطر حدوث مشاكل في القلب ولذلك عليك استشارة الطبيب إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية ولا تستعمل هالوبير (انظر البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

قد يتطلب الأمر متابعة خاصة إذا كنت تستعمل الليثيوم وهالوبير بشكل متزامن.

هناك حاجة إلى مراقبة خاصة إذا كنت تستعمل الدواين معًا. يجب إبلاغ طبيبك فورًا والتوقف عن استعمال الدواين بشكل متزامن إذا كنت تعاني من:

- حمى غير مفسرة أو حرركات غير خاضعة للسيطرة.
- ارتباك، توهان، صداع، مشاكل في التوازن وإحساس بالميل إلى النوم.
- مشاكل في الكليتين، في الكبد أو في الغدة الدرقية (قرط الدرقية).
- مستوى مرتفع للهرمون يرولاكتين في الدم، أو سرطان قد ينجم عن سيرة مرضية من الخثرات الدموية أو سيرة مرضية عائلية من الخثرات الدموية.
- اليرازولام أو سوسبيرون (لعلاج القلق).
- دولوكسيتين، فلوكسيتين، فلو فوكسامين، نيفازودون، پاروكسيتين، سيرترالين، أو الاضطراب الثنائي القطب وبدأت تشعر بالاكتئاب.
- بروبريون (لعلاج الاكتئاب أو للمساهمة في الإقلاع عن التدخين).
- كاربامازيب، فينوباريتال أو فينيتوين (لعلاج الصرع).
- ريفاميسين (لعلاج التلوثات الجرثومية).
- إيتراكونازول، بوساكونازول أو فوريكونازول (لعلاج التلوثات الفطرية).
- أقراص كيتوكونازول (لعلاج متلازمة كوشينج).
- إيندينافير، فيتونافير أو ساكونافير (لعلاج فيروس العوز المناعي البشري، HIV).
- كلوربرومازين أو بروميثازين (لعلاج الغثيان والتقيؤات).
- فير إاميل (لعلاج قرط ضغط الدم أو مشاكل القلب).
- الكولريوم (أو إلكترونوليت آخر) في الدم قبل العلاج بهالوبير أو خلاله.

هذه جميعها علامات على وضع خطير.

قد تؤثر أدوية معينة على كيفية عمل هالوبير أو قد تزيد من خطر حدوث مشاكل في القلب.
بلغ الطبيب إذا كنت تستعمل:

- اليرازولام أو سوسبيرون (لعلاج القلق).
- دولوكسيتين، فلوكسيتين، فلو فوكسامين، نيفازودون، پاروكسيتين، سيرترالين، أو الاضطراب الثنائي القطب وبدأت تشعر بالاكتئاب.
- بروبريون (لعلاج الاكتئاب أو للمساهمة في الإقلاع عن التدخين).
- كاربامازيب، فينوباريتال أو فينيتوين (لعلاج الصرع).
- ريفاميسين (لعلاج التلوثات الجرثومية).
- إيتراكونازول، بوساكونازول أو فوريكونازول (لعلاج التلوثات الفطرية).
- أقراص كيتوكونازول (لعلاج متلازمة كوشينج).
- إيندينافير، فيتونافير أو ساكونافير (لعلاج فيروس العوز المناعي البشري، HIV).
- كلوربرومازين أو بروميثازين (لعلاج الغثيان والتقيؤات).
- فير إاميل (لعلاج قرط ضغط الدم أو مشاكل القلب).
- الكولريوم (أو إلكترونوليت آخر) في الدم قبل العلاج بهالوبير أو خلاله.

قد يؤثر هالوبير على القدرة على السياقة واستعمال الأدوات والماكنات.

الأعراض الجانبية، مثل الإحساس بالميل إلى النوم، قد تدخل باليقظة، خاصةً في بداية العلاج أو بعد إعطاء جرعة دوائية عالية. لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكنات دون استشارة طبيبك.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي أقراص هالوبير على اللاكتوز. إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، فاستشره قبل البدء باستعمال أقراص هالوبير.

❗ كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

سيخبرك الطبيب بكمية هالوبير التي ستستعملها وبمدة الاستعمال. كذلك، سيخبرك الطبيب عما إذا كنت ستستعمل هالوبير مرة واحدة في اليوم أو عدة مرات في اليوم. قد تمر فترة معينة من الزمن إلى أن تشعر بالتأثير الكامل للدواء. سيبدأ الطبيب عادةً بجرعة دوائية منخفضة وبعد ذلك سيلانم الجرعة الدوائية للجرعة المناسبة لك. من المهم جدًا أن تستعمل الكمية الصحيحة.

سنتكون جرعة هالوبير الدوائية التي سنعطى لك متعلقة:

- بالاضطراب الذي تتلقى هذا العلاج لأجله
- بمشاكل في الكليتين أو في الكبد، إن وُجدت لديك
- بأدوية إضافية تستعملها

استشر الطبيب قبل استعمال هالوبير إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية:

- مشاكل نظم القلب (مثل: أمبودارون، دوفيتيليد، ديزوبيراميد، لنتهدنة أو للمساهمة في علاج اضطرابات النوم (الأدوية المهدنة).
- عده مرات في اليوم. قد تمر فترة معينة من الزمن إلى أن تشعر بالتأثير الكامل للدواء. سيبدأ الطبيب عادةً بجرعة دوائية منخفضة وبعد ذلك سيلانم الجرعة الدوائية للجرعة المناسبة لك. من المهم جدًا أن تستعمل الكمية الصحيحة.
- سنتكون جرعة هالوبير الدوائية التي سنعطى لك متعلقة:
- بالاضطراب الذي تتلقى هذا العلاج لأجله
- بمشاكل في الكليتين أو في الكبد، إن وُجدت لديك
- بأدوية إضافية تستعملها

استشر الطبيب قبل استعمال هالوبير إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية:

- مشاكل في الكليتين أو في الكبد، إن وُجدت لديك
- بأدوية إضافية تستعملها
- سنتكون جرعتك الدوائية الابتدائية عادةً بين 0.5 ملغ إلى 10 ملغ كل يوم.
- قد يلزم طبيبك الجرعة الدوائية، من أجل فحص الجرعة الأنسب لك. يجب أن تعتمد الجرعة الدوائية القصوى للبالغين على الحالة الطبية التي تتلقى العلاج لأجلها، وهي تتفاوت بين 5 ملغ إلى 20 ملغ كل يوم.

❗ الأشخاص المسنون

سيبدأ الأشخاص المسنون العلاج بجرعة 0.5 ملغ كل يوم أو بنصف جرعة البالغين المنخفضة.

قد تزيد هذه الأدوية من خطر حدوث مشاكل في القلب ولذلك عليك استشارة الطبيب إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية ولا تستعمل هالوبير (انظر البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

❗ الحمل، الإرضاع والحساسية

الحمل – إذا كنت حاملاً، فتعتدين أنك حامل، أو تخططين للحمل، فتوجهي إلى الطبيب للاستشارة. قد يقدم لك طبيبك المشورة بعدم استعمال هالوبير خلال فترة الحمل.

قد يحدث ارتجاع، تصلب أو ضعف العضلات؛ ميل إلى النوم أو عدم الهدوء؛ صعوبات في التنفس أو صعوبة في الإطعام؛ لدى المواليد الذين استعملت أمهاتهم هالوبير خلال الثلث الأخير من الحمل.

الشيوع الدقيق لهذه المشاكل غير معلوم. إذا استعملت هالوبير خلال فترة

❗الأولاد والمراهقون في سن الـ 6-17

- سنتكون جرعتك الدوائية عادةً بين 0.5 ملغ إلى 3 ملغ كل يوم.
- قد يستعمل المراهقون حتى سن الـ 17، الذين يتلقون العلاج للفصام أو للمشاكل السلوكية، جرعة أعلى تصل إلى 5 ملغ كحد أقصى كل يوم.

ينبغي تناول الجرعة الموصى بها.

تستعمل – قد يزيد هالوبير من مستويات الهرمون يرولاكتين، الذي قد يؤثر على الخصوبة لدى الرجال والنساء. استشر الطبيب إذا كانت لديك أسئلة بالنسبة لهذا الأمر.

❗ السيادة واستعمال الماكنات

قد يؤثر هالوبير على القدرة على السياقة واستعمال الأدوات والماكنات.

الأعراض الجانبية، مثل الإحساس بالميل إلى النوم، قد تدخل باليقظة، خاصةً في بداية العلاج أو بعد إعطاء جرعة دوائية عالية. لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكنات دون استشارة طبيبك.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي أقراص هالوبير على اللاكتوز. إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، فاستشره قبل البدء باستعمال أقراص هالوبير.

❗ كيف تستعمل الدواء؟

إذا نسبت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاقيادي واستشر الطبيب. بعد ذلك، واصل تناول الدواء وفق إرشادات الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

❗ إذا توقفت عن تناول الدواء

إذا توقفت عن تناول الدواء يظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 100 مستعمل).

قد يسبب إيقاف العلاج بشكل فجائي أعراضًا مثل: الغثيان، التقيؤات والصعوبات في النوم.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توقفت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال هالوبير إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلقى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

بلغت الأعراض الجانبية الخطيرة أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:

- إحساس بعدم الهدوء.
- صعوبات في النوم.
- صداع.
- مشاكل في القلب:
- اضطراب في نظم القلب - هذا العرض يوقف العمل السليم للقلب وقد يؤدي إلى فقدان الوعي.
- نظم قلبي سريع بشكل شاذ.
- ذقات قلبية إضافية.
- متلازمة QT الطويلة.
- مشاكل القلب غير شائعة لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 100 مستعمل). حدثت حالات موت فجائي لدى متلقي العلاج الذين استعملوا هذا الدواء، لكن الشيوع الدقيق لهذه الحالات من الموت غير معلوم. كذلك، حدث توقف القلب الوقوف

(حالة يتوقف فيها القلب عن النبض) لدى الأشخاص الذين استعملوا أدوية مضادة للذهان.

مشكلة خطيرة تسمى "المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان" - بسبب هذا العرض الحمى المرتفعة، تصلب العضلات الخطير، الارتباك وفقدان الوعي. إنها نادرة لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من 1,000 مستعمل).

مشكلة في السيطرة على حرركات الجسم أو الأطراف (الاضطراب خارج الهرمي): مثل:

- حرركات الغم، اللسان، الفك وأحيانًا الأطراف (tardive dyskinesia).

إحساس بالتلملم أو صعوبة في الجلوس يسكون، تزايد حرركات الجسم. حرركات جسم بطيئة أو متضائلة، تشنجات أو حرركات تشنجية.

ارتجاج أو تصلب في العضلات، مشي مترنح.

عدم القدرة على التحرك.

انعدام تعبير الوجه السليم، تعبير وجهي يبدو أحيانًا كالقناع.

هذه الأعراض شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد تظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين 100 مستعملين). إذا عانيت من أحد هذه الأعراض، فقد تحتاج إلى علاج بدواء إضافي.

رد فعل تحسسي خطير قد يشمل:

انتفاخًا في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحلق.

صعوبة في البلع أو في التنفس.

طفحًا جلديًا مصحوبًا بالحكة (شرى).

رد الفعل التحسسي غير شائع لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد يظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 100 مستعمل).

خثرات دموية في الأوردة، عادة في الرجلين (الخثار الوريدي العميق أو DVT). تم التبليغ عن خثرات دموية لدى الأشخاص الذين يستعملون أدوية مضادة للذهان. تشمل علامات DVT في الرجل الانتفاخ، الألم

والاحمرار في الرجل، لكن الخثرة قد تتجرف إلى الرئتين، مسببة ألمًا في الصدر وصعوبات في التنفس. قد تكون الخثرات الدموية خطيرة جدًا، لذلك بلغ الطبيب بشكل فوري إذا لاحظت وجود إحدى هذه المشاكل.

بلغ الطبيب فورًا إذا لاحظت وجود أحد الأعراض الجانبية الخطيرة المنفصلة أعلاه.

أعراض جانبية إضافية

بلغ الطبيب إذا لاحظت أو شككت بوجود أحد الأعراض الجانبية الواردة أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:

- إحساس بعدم الهدوء.
- صعوبات في النوم.
- صداع.
- مشاكل في القلب:
- اضطراب في نظم القلب - هذا العرض يوقف العمل السليم للقلب وقد يؤدي إلى فقدان الوعي.
- نظم قلبي سريع بشكل شاذ.
- ذقات قلبية إضافية.
- متلازمة QT الطويلة.
- مشاكل القلب غير شائعة لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 100 مستعمل). حدثت حالات موت فجائي لدى متلقي العلاج الذين استعملوا هذا الدواء، لكن الشيوع الدقيق لهذه الحالات من الموت غير معلوم. كذلك، حدث توقف القلب الوقوف

- انتفاخ حول الحجره أو تشنج لحظي للأوتار الصوتية مما قد يسبب للشطر على كلا الجانبين.

تمت تعبئة الأقراص في شرائط ألومينيوم، 10 أقراص في الشريط في عبوة كرتونية تحتوي على 20، 30 أو 60 قرصًا (هالوبير 0.5) أو 20، 30، 60 أو 100 قرص (هالوبير 5، 10). قد لا تسوق جميع أحجام العبوات.

صاحب الامتياز/ المصنع وعنوانه: ك ص ط للصناعات الكيميائية م.رض.، هاكيسما 3، كرات ملاحى.

تم تحرير هذه النشرة في 06/2023 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

هالوبير 0.5: 1159325918، هالوبير 5، 10): قد لا تسوق جميع أحجام العبوات.

هالوبير 10: 1159225916

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

10-1 مستعملين من بين 1.000:

تأثيرات على خلايا الدم - عند منخفض لجميع خلايا الدم، بما في ذلك انخفاضات خطيرة في تعداد خلايا الدم البيضاء وعند منخفض للصفائح (وهي خلايا تساهم في تخثر الدم).

إحساس بالارتباك.

فقدان الرغبة الجنسية أو رغبة جنسية متدنية.

اضطراب في العضلات والمفاصل.

تشنجات في العضلات، حرركات تشنجية أو تقلصات غير خاضعة للسيطرة، بما في ذلك تشنج في الرقبة يسبب التقاف الرأس إلى جانب واحد.

مشاكل في المشى.

ضيق التنفس.

التهاب الكبد أو مشكلة في الكبد تسبب اصفرار الجلد أو العينين (يرقان).

تزايد في حساسية الجلد لضوء الشمس.

حكة.

قرط التعرق.

تغيرات في دورات الحيض (الدورات الشهرية)، مثل: غياب الدورات الشهرية أو دورات طويلة، غزيرة ومؤلمة.

إنتاج الحليب في الثديين بشكل غير متوقع.

بلغ الطبيب فورًا إذا لاحظت وجود أحد الأعراض الجانبية الخطيرة المنفصلة أعلاه.

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10.000:

إحساس بعدم الهدوء.

صعوبات في النوم.

صداع.

مشاكل في القلب:

اضطراب في نظم القلب - هذا العرض يوقف العمل السليم للقلب وقد يؤدي إلى فقدان الوعي.

نظم قلبي سريع بشكل شاذ.

ذقات قلبية إضافية.

متلازمة QT الطويلة.

مشاكل القلب غير شائعة لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 100 مستعمل). حدثت حالات موت فجائي لدى إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول). لكن الشيوع الدقيق لهذه الحالات من الموت غير معلوم. كذلك، حدث توقف القلب الوقوف

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10.000:

إحساس بعدم الهدوء.

صعوبات في النوم.

صداع.

مشاكل في القلب:

اضطراب في نظم القلب - هذا العرض يوقف العمل السليم للقلب وقد يؤدي إلى فقدان الوعي.

نظم قلبي سريع بشكل شاذ.

ذقات قلبية إضافية.

متلازمة QT الطويلة.

مشاكل القلب غير شائعة لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 100 مستعمل). حدثت حالات موت فجائي لدى إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول). لكن الشيوع الدقيق لهذه الحالات من الموت غير معلوم. كذلك، حدث توقف القلب الوقوف

أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها غير معروف –

رؤية، إحساس، سماع أو شُم أشياء غير موجودة (هلوسات).

اكتئاب.

توتر عضلي شاذ.

إحساس بالدوار، بما في ذلك عند الانتقال إلى وضعية الجلوس أو الوقوف

الوقوف