

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ז – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רטבמו 40 מ"ג

רטבמו 80 מ"ג

כמוסות

החומר הפעיל ורכיביו:

כל כמוסה של רטבמו 40 מ"ג מכילה 40 מ"ג סלפרקאטיניב (selpercatinib 40 mg) כל כמוסה של רטבמו 80 מ"ג מכילה 80 מ"ג סלפרקאטיניב (selpercatinib 80 mg)

חוּמָרִים בְּלִתְיַ פֻּעִילִים וְאֶלְרָגְנִים בְּתַכְשֵׁיר: ראה סעיף 6 "מִידָע נוֹסֶף".

קראו בעין את העلون עד סוףם לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך

שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווק.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

רטבמו משמשת לטיפול בסוגי סרטן מסוימים הנגרמים על ידי מופעים חריגים של גנים מסוג RET ומיעוטה:

- לטיפול במבוגרים שיש להם סרטן ריאות גורותי של תאים קטנים קטנים שהוא חיובי ל-RET.
- לטיפול במבוגרים ובילדים מגיל 12 ומעלה עם סרטן מדולרי של בלוטת התיריס (тирואיד) – MTC.
- לטיפול במבוגרים ובילדים מגיל 12 ומעלה עם סרטן בלוטת התיריס (тирואיד) מתקדם או גורתי המותוך על ידי מופע RET-medullary thyroid cancer (RET-fusion), שזקוקים לטיפול מערכתי והם עמידים לטיפול בידי רדיואקטיבי (אם יש צורך ביד רדיואקטיבי).

קבוצה רפואיית: חומרים אנטि-נאופלסטיים ואיומונומודולטים, חומרים אנטि-ניואופלסטיים, מעכבי חלבון קינאז.

2. לפניה השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיס (אלרגי) לסלפרקאטיניב או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6).

اذהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפניה ובמהלך הטיפול ברטבמו, ספר לרופא אם אתה:

- סובל מבעיות כבד
- סובל מבעיות בריאות או מבעיות נשימה, חוץ מאשר סרטן הריאות
- סובל מלחץ דם גבוה
- סובל מבעיות לב, כולל מצב הנקרא הארכת מקטע QT (QT prolongation)
- סובל מבעיות מדמיומיות
- מתכוון לעبور ניתוח. עליך להפסיק לקחת רטבמו לפחות 7 ימים לפני הניתוח. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"

ילדים ותתבגרים

התכשיר מיועד לבני 12 ומעלה.

לא ידוע האם רטבמו בטוחה ויעילה כאשר משמשת:

- בילדיים מתחת לגיל 12, עברור טיפול ב-TCM הדורש טיפול מערכתי, ובעבור טיפול בסרטן מתקדם של בלוטת התיריס הדורש טיפול מערכתי ושקיים טיפול ביד רדייאקטיבי שלא הועיל או שהפסיק לעבוד, או
- בילדיים בעבור טיפול בכל סוג הסרטן האחרים.

בדיקות ועקב

הרופא יבצע בדיקות על מנת לוודא כי רטבמו נכונה עבורה:

- הרופא יבצע בדיקות דם לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו על מנת לאבחן בעיות כבד.
- רטבמו עשוי להשפיע על לחץ הדם שלו. לחץ הדם שלך ימדד לפני ובמהלך הטיפול עם רטבמו.
- רטבמו עשוי להשפיע על קצב הלב שלך. הרופא יבצע בדיקות לפני ובמהלך הטיפול עם רטבמו כדי לבדוק את פעילות הלב שלך ואת רמות המלחמים בגוף (אלקטROLיטים) והורמוני-TSH בدمך.
- הרופא יבצע בדיקות דם על מנת לאבחן אצלך סימנים להתקrkות הגידול (TLS).
- הרופא יבצע בדיקות דם כדי לבדוק את תפקוד בלוטת התיריס שלך לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו.
- הרופא יבצע בדיקת הרינו לפני שתתחליל טיפול ברטבמו.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופהות

אם אתה לוקח או אם לך歟 לאחרונה תרופהות אחרות כולל תרופהות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. רטבמו עלולה להשפיע על הדריך בה תרופהות אחרות פועלות, ותרופהות אחרות עלולות להשפיע על פעילות רטבמו, והן עשויות להגביר את הסיכון לתופעות לוואי.

המשמעות בפרע מחרור (היפריקום - St. John's Wort), מעכבי משאבות פרוטונים (IZIPIIigan) דקסלנסופריזול, אסואומפריזול, לנסופריזול, אומפריזול, פנטופריזול סודיום ורבפריזול), חוסמי H₂ (כמו פמטידין, ניאצטידין וסימטידין) ונוגדי חומצה שמקילים אלומיניום, מגנזיום, סיידן, סימטיקון או תרופהות מנטרליות חמוץות במהלך הטיפול ברטבמו.

אם איןך יכול להפסיק לתקחת מעכבי משאבות פרוטונים, חוסמי H₂ או נוגדי חומצה, ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" למידע נוספת כיצד תוכל לתקחת רטבמו יחד עם תרופהות אלו. דע מהן התרופהות שאתה לוקח. שמור רשימה שלהן על מנת להראות לרופא ולרוקח כאשר אתה מקבל תרופה חדשה.

שימוש בתרופה ומדוזן

- רטבמו נלקחת דרך הפה, בדרך כלל פעמיים ביום בהפרש של 12 שעות, עם או ללא אוכל.
- אם אתה לוקח מעכבי משאבות פרוטונים (IZIPIIigan כמו דקסלנסופריזול, אסואומפריזול, לנסופריזול, אומפריזול, פנטופריזול סודיום ורבפריזול), קח רטבמו עם האוכל.

הרינו, הנקה ופוריות

הרינו פני אל הרופא אם אתה מתכוון להיכנס להרינו. רטבמו יכולה להזיק לעובר שלך. אין להרהור במהלך הטיפול ברטבמו.

אם אתה מסוגלת להרהור, הרופא יבצע בדיקת הרינו לפני שתתחליל טיפול ברטבמו. נשים שמסוגלות להרהור צריכות להשתמש באמצעי מניעה ייעיל במהלך הטיפול ועד למשך שבוע אחד לאחר המנה האחורה של רטבמו. התיעיצי עם הרופא מהו אמצעי מניעת הרינו שיכל להתאים לך.

פni אל הרופא מיד אם נכנסת להרינו או שאת חששבת שאת עלולה להיות בהרינו במהלך הטיפול ברטבמו. גברים שיש להם בניית זוג שמסוגלות להרהור צריכים להשתמש באמצעי מנעה ייעיל במהלך הטיפול ברטבמו ועד למשך שבוע אחד לאחר המנה האחורה של רטבמו.

הנקה

פni אל הרופא אם אתה מיניקה או מתכוון להניקה. לא ידוע האם רטבמו עברת בחלב האם. אל ת寧ק במהלך הטיפול ברטבמו ועד למשך שבוע אחד לאחר המנה האחורה.

פוריות

רטבמו עלולה להשפיע על הפוריות בנשים ובגברים, בצורה היכולת להשפיע על יכולת להביא ילדים. פנה אל הרופא אם נושא זה מדאיג אותך.

נהיגה ושימוש במכונות

עליך לנתקות משנה זהירות בעת נהיגה ושימוש במכונות מכיוון שאתה עלול לחוש עייפות או סחרחות בעת נטילת רטבמו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אם תסבול מתופעות לוואי, הרופא עשוי לשנות את המינון, או להפסיק באופן זמני או קבוע את הטיפול ברטבמו. אל תשנה את המינון ואל תפיסך לחתך רטבמו אלא אם כן הרופא אומר לך לעשות כן.

- רטבמו נלקחת דרך הפה, בדרך כלל פעמיים ביום כל 12 שעות.
- אתה יכול לחתך רטבמו עם או ללא אוכל.
- אם אתה לוקח מעכ卜 משאבות פרוטונים (API) כמו דקסלנסופריזול, אסומפריזול, לנסופריזול, אומפריזול, פנטופריזול סודיום ורבפזריזול, קח רטבמו עם האוכל.
- אם אתה לוקח נגד חומצה שמכיל אלומיניום, מגנזיום, סיידן, סימטייקון או תרופה מוגדרת חומציות, קח רטבמו שעתיים לפני או שעתיים אחריו שאთה לחתך את החומצה.
- אם אתה לוקח חוסם H₂ (כמו פמותידין, ניאטידין או יימטידין), קח רטבמו שעתיים לפני או 10 דקות לאחר שאתת לחתך את חוסם ה-H₂.
- אם אתה מקיא לאחר נטילת מנה של רטבמו, אל תיקח מנה נוספת. קח את המנה הבאה של רטבמו בזמן הרגיל.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לחתך את כמוסות רטבמו בשלמותן. אין לכתוש או ללעוס את הmmasות.

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטיעות בעל' לצד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה אליו.

אם שכחית ליטול את התרופה

אם שכחית ליטול תרופה זו בזמן המועד, אין ליטול את מנת הרטבמו שהוחמצה, אלא אם כן נותרו יותר מ-6 שעות עד למנת המתוכננת הבאה.

יש להתמיד לטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה **בכל פעם** שהנרגן נטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנרגן **זקוק להם**.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **היוועץ** ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברטבמו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מ אף אחת מהן.

רטבמו עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל:

• **בעיות כבד.** בעיות בכבד (עליה באנגיימי הכבד) הן תופעות שכיחות ברטבמו ולעתים הן עלולות להיות חמורות. הרופא יבצע בדיקות דם לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו על מנת לאבחן בעיות כבד. פנה אל הרופא מיד אם אתה סובל מאחד מהתסמינים הבאים במהלך הטיפול:

- הצהבה של העור או של החלק הלבן
- חוסר תיאבון
- בעיניים (צחבת)
- בחילות או הקאות
- כאב בחלק הימני העליון של הבطن
- שタン כהה (צבע תה)
- ישנוניות

- דימומיים או חבותות
- בעיות בריאות. רטבמו עלולה לגרום לדלקת ריאות חריפה או מסכנת חיים במהלך הטיפול, עלולה לגרום למות. פנה אל הרופא מיד אם אתה סובל מתסמים חדשים או מהחרפה של תסמים, כולל:
 - קוצר נשימה
 - שיעול
 - חום
- לחץ דם גבוה. לחץ דם גבוה הוא תופעה שכיחה של רטבמו ולעתים היא עלולה להיות חמורה. עליך לבדוק את לחץ הדם בקביעות במהלך הטיפול ברטבמו. אם אתה מפתח בעיות בלחץ הדם, הרופא עשוי לרשום לך תרופות לטיפול בלחץ דם. פנה אל הרופא אם אתה סובל מלחץ דם גבוה או אם יש לך תסמים של לחץ דם גבוה, הכללים:
 - בלבול
 - כאבי ראש
 - כאב בחזה
 - קוצר נשימה
- **שינויים בקצב הלב (הארכת QT).** רטבמו עשוי לעורך בדיקות לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו על מנת לבדוק את פעילות לבך, את הכמות של המלחים בגוף (אלקטROLיטים) ושל הורמון מגירה בלוטת התריס (thyroid-stimulating hormone, TSH). פנה אל הרופא מיד אם אתה סובל מחד מהתסמים הבאים:
 - סחרחות
 - שינוי בקצב הלב שלא פועם (פלפיטציות,
 - הלמות לב)
 - אובדן הכרה
 - התעלפות
- הפרעות דימום. רטבמו יכולה לגרום לדימומיים שעולים להיות חמורים ולהוביל למות. פנה אל הרופא אם יש לך סימנים לדימום במהלך הטיפול ברטבמו, כולל:
 - הקאה של דם או אם הקיא שלא נראה כמו פולי קפה
 - דימום מהאף שמתרכש לעיתים קרובות
 - נמנום או קושי להתעורר
 - בלבול
 - צואה אדומה או שחורה (נראית כמו זפת)
 - כאבי ראש
 - שיעול דמי או של קריש דם
 - שינויים בלבור
 - דימומיים או חבותות לא רגילים בעור
 - מחזור חדש עם דימום כבד מהרגיל
- תגובות אלרגיות. רטבמו יכולה לגרום לחום, פריחה, כאבי שרירים או מפרקים, בייחוד בחודש הראשון של הטיפול. פנה אל הרופא אם אתה סובל מחד מבין תסמים אלו.
- **תסמים של התפרקות הגידול (TLS, Tumor lysis syndrome).** TLS נגרם על ידי התפרקות מהירא של תא סרטן. TLS עלול לגרום לאיספיקת כליות, לצורך טיפולידיאליזה, ולקצב לב שאינו תקין. TLS יכול להוביל לאשפוז. הרופא יבצע בדיקות דם על מנת לאבחן אצלך TLS. עליך להשגיח שאינך מתיבש במהלך הטיפול ברטבמו. פנה אל הרופא או לעזרה רפואיים מיד כאשר אתה מפתח אחד מהתסמים הבאים במהלך הטיפול ברטבמו:
 - קוצר נשימה
 - התכווצות שרירים
 - פרוכוסים
 - בחילות
 - הקאות
 - חולשה
 - נפיחות
- **סיכון לביעות רפואיים.** פצעים עלולים שלא להתרפאות בפני או במהלך הטיפול ברטבמו. פנה אל הרופא אם אתה מתכוון לעזור ניתוח לפני או במהלך הטיפול ברטבמו.
 - עליך להפסיק לקחת רטבמו לפחות 7 ימים לפני ניתוח מתוכן.
 - הרופא יורה לך מתי תוכל לשוב ולקחת רטבמו לאחר הניתוח.

- רמות נמוכות של הורמון בלוטת התריס בدم (**hypothyroidism**). הרופא יערך בדיקות דם על מנת לבדוק את תפקוד בלוטת התריס שרך לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו. פנה אל הרופא מיד אם אתה מפתח סימנים או תסמים של רמות נמוכות של הורמוני בלוטת התריס, היכולים:

- עייפות שמהריפה או שאינה חולפת
- עצירות
- עליה במשקל
- הרגשת קור

תופעות לוואי נוספת

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להשפיע על יותר משתמש 1 מתוך 10) כוללות:

- נפיחות בזרועות, רגליים, ידים וכפות הרגליים
- כאבי בטן (בזקמת פריפריאלית)
- עצירות
- פריחה
- שלשול
- עייפות
- בחילה
- כאבי ראש
- יובש בפה
- לחץ דם גבוה

توزאות בדיקות המעבדה החומרות השכיחות ביותר עם רטבמו כוללות ירידת בספירת תא דם לבנים, ירידת ברמות הנתרן בדם וירידה ברמות הסידן בדם.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחזה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי התווית.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן מתחת ל-30°C.
- אין להשליך תרופות לביב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:
microcrystalline cellulose, colloidal silicon dioxide

המעטפת של כמות 40 מ"ג מכילה: .gelatin, titanium dioxide, ferric oxide
המעטפת של כמות 80 מ"ג מכילה: .gelatin, titanium dioxide, FD&C blue #1

הדי השחור מכיל:

shellac, alcohol (ethanol 96%), ferric oxide, purified water, propylene glycol, strong ammonia solution, isopropyl alcohol, butyl alcohol, potassium hydroxide.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

רטבמו 40 מ"ג הן כמוסות אפורות ואטומות, המודפסות עם הכתובת "Lilly" ו- "3977" ו- "40 mg" בדיו שחור.
רטבמו 80 מ"ג הן כמוסות כחולות ואטומות, המודפסות עם הכתובת "Lilly" ו- "2980" ו- "80 mg" בדיו שחור.

רטבמו 40 מ"ג מסופק בבקבוקים של 60 כמוסות.

רטבמו 80 מ"ג מסופק בבקבוקים של 60 או 120 כמוסות.

יתכן שלא כל גדיי האריוזות משווים.

שם בעל הרישום וכותבו: אליל ליל' ישראל בע"מ, רחוב השיזף 4, ת.ד. 4246, רעננה 4366411.

שם היצרן וכותבו: אליל ליל', אינדיאנפוליס, אינדיאנה, ארה"ב.

נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

רטבמו 40 מ"ג: 171-67-37212-99

רטבמו 80 מ"ג: 171-68-37213-99

לשם הפשתות ולהקלת הקיראה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.