

أكامولي

فتائل 150 ملغ



التركيب

تحتوي كل فتيلة على:

باراسيتامول 150 ملغ (Paracetamol 150 mg)

لائحة المواد غير الفعالة ومواد الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة يتعذر حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

عليك إستعمال المستحضر وفق التوجيهات في بند المقدار الدوائي من هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. يجب مراجعة الطبيب في حال استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم تزل خلال 5 أيام رغم إستعمال الدواء.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتشكين الآلام وخافض السخونة.

للإستعمال في فتحة الشرج (rectal).

المضاعفة العلاجية:

مسكن للألم وخافض للسخونة.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا:

وُجدت حساسية لـ باراسيتامول أو لكل واحد من مركبات الدواء الأخرى المفصلة في الفقرة 6.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- إذا تطورت في الماضي لدى الم تعالج/الطفل أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على باراسيتامول، فلا يجوز إعطائه المستحضرات التي تحتوي على باراسيتامول، كي لا تحدث ثانية أعراض جلدية خطيرة.
- يحتوي المستحضر على باراسيتامول الذي قد يسبب ضرراً في الكبد عندما:

يعطى بمقدار دوائي أعلى من الموصى به أو لفترة مطولة.

يتشرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج.

يتم تناول أدوية إضافية التي تؤثر على نشاط الكبد.

- لا يجوز إعطاء هذا الدواء في أوقات متقاربة بدون إستشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية لخفيف السخونة وتشكين الآلام أو أدوية الزكام بدون إستشارة طبيب أو صيدلي، وذلك لمنع حدوث فرط القدر الدوائي أو التسمم بالباراسيتامول.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية من "عائلة" أكامول أو مستحضرات إضافية التي تحتوي على باراسيتامول.
- يجب الإمتناع عن إستعمال مقدار دوائي عالي (وذلك ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.
- إذا كان الم تعالج مسبباً لأي طعام أو لاي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إعطاء الدواء.
- يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كان الم تعالج يعاني أو عانى في الماضي من:**
 - مرض كبد أو خلل في وظيفة الكبد
 - خلل في وظيفة الكلية
 - الإدمان على الكحول
 - يرقان
 - إذا كانت الم تعالجة حاملةً أو مرضعة

التفاعلات بين الأدوية
إذا كان الم تعالج يستعمل، أو إذا استعمل مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية وفيتامينات، احظر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كان الم تعالج يستعمل دواء من المجموعات التالية أو إذا أنهى الآن العلاج بدواء:

- أدوية مضادة لخثر الدم، مثل وارفارين.
- مستحضرات تنشط إنتاج إنزيمات في الكبد (على سبيل المثال: ريفاكميسين، باربيترات - دواء للتخدير).
- أدوية للصرع - فينتوتين، كاربامازيبين.
- مستحضرات مضادة للإلتهاب لاستيروكيندية.
- ميتوكوبوبراميد أو دومپيريدون (علاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل هضمية إضافية).
- كلورامفينيكول، فلووكوكاسيلين (مضاد حيوى).
- بروبينيسيد (علاج التقرس ويعطي أحياناً لرفع نسب البنسيلين في الدم).
- كوليستيرامين (انخفاض فائض شحوم الدم).

استعمال البال باراسيتامول وإستهلاك الكحول
لا يجوز إستهلاك الكحول أثناء العلاج بـ باراسيتامول بسبب زيادة الخلوة أحدوث ضرر للكبد.

الحمل والإرضاع
إذا كانت الم تعالجة حاملةً أو مرضعة يجب إستشارة الطبيب قبل بدء إستعمال هذا الدواء.

الاستعمال لدى الأطفال
على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كافة الأعراض الجانبية وكذلك عن كل دواء إضافي يعطي الطفل.

لا يجوز إعطاء الطفل الكحول أو الأدوية التي تحتوي على الكحول، أثناء العلاج بهذا الدواء.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.
يُحدد المقدار الدوائي بحسب وزن الطفل/الم تعالج، يجب إستشارة الطبيب/الصيدلي لتحديد المقدار الدوائي المناسب لوزن الطفل/
الم تعالج.

يتبغ ←

هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال وللرضع دون عمر السنين، من أجلهم يوصى بإستعمال مستحضرًا سائلًا.

المقدار الدوائي الإعتيادي في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

أطفال حتى عمر 3 سنوات: حسب تعليمات الطبيب.

أطفال بعمر 3-4 سنوات: فنتلة واحدة - 5-4 مرات في اليوم.

أطفال بعمر 4-6 سنوات: فنتلة - فنتيلتين - 5-4 مرات في اليوم.

يجب الإننتار 4 ساعات على الأقل قبل إعطاء مقدارًا دوائيًا إضافيًا.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم تزد خلال 5 أيام رغم إستعمال الدواء.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تلقى الطفل /المتعالج بالخطأ مقدارًا دوائيًا مضاعفًا، يجب إستشارة الطبيب فوراً أو التوجه إلى غرفة الطوارئ.

طريقة الإستعمال

ملاحظة: إذا كانت الفنتلة رخوة بحيث لا يمكن إدخالها، فيإمكان تبریدها بتخديقها في البراد لمدة 30 دقيقة تقريباً، أو بوضعها تحت تيار من الماء البارد قبل نزع الغلاف.

(1) **تعليمات الفتاح:** إفصل فنتلة واحدة عن شريط الفتائل، لنزع الغلاف البلاستيكى، يجب فصل السaran من الجانب المسطح للغلاف الذي يوجبك إلى النمودج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5 كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحالب رؤية الأطفال / أو الرضع وذلك لتقدير إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيّف بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على: Witepsol W-35, Witepsol E-76

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تحتوي كل علبة على لوحة بلاستيكية (بليست) معياً بداخلها 12 أو 18 فنتلة بلون أبيض - كريم.

إسم المنتج وصاحب الإمكانيات وعنوانه:

تيقع إسرائيل، م.ض، شارع دقورا هنثيفي 124، تل أبيب 6944020 تم إعداد هذه النشرة في أيار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 027.08.21691.00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

إذا استعمل المتعالج مقدارًا دوائيًا مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء معلم، لا تسبب التقيّف بدون تعليمات صريحة من الطبيب حتى و لو كنت تشعر بحاله جيدة، فإن العلاج الفوري هو ضروري، يسبب خطورة تطور ضرب خطير للقلب، الأعراض الجانبية يمكن أن تكون غثيان وقيء، إسهال، فقدان الشهية للطعام، آلام بطنية، إنفصال، تعرق زائد، ألم أو حساسية في أعلى البطن التي من الجائز أنها لا تتعكس شدة الضرب للقلب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أيأسة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فنتائل أكامولى قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعانى أي منها.

أعراض جانبية نادرة (تؤثر على حتى متعالج 1 من بين 1,000 متعالج):

أعراض جانبية خطيرة، يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب فوراً في الحالات التالية:

- إذا ظهرت ردود فعل تحسسية شديدة، مثل إنفصال الوجه، الشفتين، اللسان، الحنجرة وأل الأطراف والتي قد تسبب صعوبات في التنفس أو في البلع.
- إذا ظهرت مشكل جلدية، مثل طفح أو حكة.