

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד

לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה צורתה וחוזקה

Integrity Veterinary

אינטפריטי וטרינרי

פרמיקס לשימוש במזון לתרנגולי פטם.

2. הרכב:

חומר פעיל:

אבילמציין 100 גרם לכל ק"ג פרמיקס

Avilamycin -100 g per kg premix

רשימת החומרים הבלתי פעילים מפורטת בסעיף 13 "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה:

לטיפול ומניעה של נקרוטיק אנטריטיס (necrotic enteritis) בתרנגולי פטם עקב Clostridium perfringens. נוכחות המחלה בלהקה צריכה להיקבע לפני תחילת הטיפול המניעתית.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה

4. התוויות נגד:

רגישות יתר ל-Avilamycin או לאחד החומרים הבלתי פעילים המופיעים בסעיף 13. אין להשתמש במטילות ביצים למאכל אדם.

5. תופעות לוואי:

לא ידועות.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה:

תרנגולי פטם

7. מינון וצורת מתן:

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב 0.15 – 0.30 ק"ג של אינטפריטי וטרינרי ב-1000 ק"ג של תוסף מספוא, כך שריכוז אבילמציין יהיה 15-30ppm.

8. אופן השימוש:

חשוב: יש לערבב היטב בתוסף מספוא לתרנגולות לפני השימוש.

לפיזור מיטבי, מומלץ לערבב תחילה אינטפריטי וטרינרי עם כמות קטנה של תוסף מספוא (לפחות 10 ק"ג) לפני ייצור הכמות סופית של תוסף רפואי.

הוראות מתן: ריכוז אבילמיצין צריך להיות 15-30ppm, יש לתת כמקור מזון יחיד לתקופה של 21 ימים עוקבים בעת חשש לנקרוטיק אנטריטיס כפי שנקבע ע"י וטרינר.

אין להשתמש בתוספי מספוא המכילים חומרים ליצירת כופתיות (pellet binding agents) למעט אם החומר הוא Calcium lignosulfate.

9. זמן המתנה:

בשר ושיירים – 0 ימים

10. אזהרות

יש להשתמש בתכשיר בזהירות המתבקשת כדי לצמצם היווצרות תנגודת לתרופה ושמירה על יעילותה. הערה: יש לערוך, לאחר התייעצות עם הווטרינר, הערכה ותוכנית כוללנית לטיפול. זאת בהתחשב בהיסטוריה הבריאותית של הלהקה, ומידת הסיכון להיחשפותה ל- Necrotic enteritis.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

בעת הטיפול בתכשיר יש להימנע משאיפה, בליעה ומגע ישיר בעור ובעיניים. יש ללבוש בגדי מגן, כפפות בלתי חדירות, משקפי מגן ומסיכה תקנית להגנה מפני אבק. יש לרחוץ היטב בסבון ומים לאחר טיפול בתכשיר. במקרה של מגע החומר בעיניים, יש לשטוף מיד וביסודיות במים. אם הגירוי נמשך יש לפנות לקבלת טיפול רפואי.

11. הוראות אחסון:

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ- 25°C.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש:

כל שארית של תכשיר ווטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Isopar M (Mineral Oil)

Soybean Mill Run

בעל הרישום וכתובתו:

יורומר בע"מ, ת.ד. 1064, רמת השרון 47110.

שם היצרן וכתובתו:

TriRx Speke Limited, Fleming Road, Speke, Liverpool L24-9LN, United Kingdom

עלון זה נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות במרץ 2020

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 163 88 35209 00