

## עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ז-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

### **סמביליקס 20 מ"ג**

### **סמביליקס 40 מ"ג**

#### **טבליות מצופות**

#### **חומר פעיל**

**סמביליקס 20 מ"ג:** כל טבלייה מצופה מכילה אסימיניב הידרוクロיד, השווה בערכו לאסימיניב 20 מ"ג asciminib hydrochloride, equivalent to asciminib 20 mg

**סמביליקס 40 מ"ג:** כל טבלייה מצופה מכילה אסימיניב הידרוクロיד, השווה בערכו לאסימיניב 40 מ"ג asciminib hydrochloride, equivalent to asciminib 40 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר - ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספים". קרא עיין את **העלון עד סופו** בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

טיפול במוגדים עם:

- локמיה מייאלאידית כרונית חיבוטית לchromozom Philadelphia (Ph+ CML) בשלב כרוני (CP), לטיפול בעבר בשתי תרופות מסוג מעכבי טירוזין קינאז או יותר.
- локמיה מייאלאידית כרונית חיבוטית לchromozom Philadelphia (Ph+ CML) בשלב כרוני (CP) עם המוטציה T315I.

**קבוצה רפואיית:** תרופות אנטי-נאופלסטיות, מעכבות טירוזין קינאז.

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

##### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אסימיניב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).

##### **ażhorot miyadot ha-noguot le-shimush batrofah**

##### **לפני תחילת הטיפול בסמביליקס, ספר לרופא לגבי כל מצב רפואי שלך, כולל אם:**

- יש לך ספירת תא דם נמוכה (דיכוי מוח עצם)
- סבלת בעבר מדלקת לבלב (פנקראיטיטיס) או עלייה ברמות אנזימים בدم שנקרוים עAMILAZ וליפאץ
- יש לך לחץ דם גבוה (יתר לחץ דם)
- יש לך תגבות אלרגיות (רגישות יתר)
- סבלת בעבר מביעות לב או קרישי דם בעורקים ובוורידים (סוגים של כלי דם)
- את בהירון או מתכנתת להיכנס להירון
- את מניקה או מתכנתת להניקה

ראה פרק 4 "תופעות לוואי" ופרק 2 סעיף "הירון, הנקה ופוריות".

##### **ילדים ומתבגרים**

סמביליקס לא מיועד לשימוש ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18. לא קיים מידע בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זהילדים ומתבגרים.

**בדיקות ומעקב**  
במהלך הטיפול בסמבליקס תעבור בדיקות דם ובדיקות לחץ דם תקופתיות.

**אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות**  
אם אתה לוקח או אם לךחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.  
במיוחד אם אתה לוקח:

**השפעת תרופות אחרות על סמבליקס**  
CYP3A4

מתן מושלב של סמבליקס עם מעכbsp; CYP3A4 (כגון: קלריטרומיצין, טליטרומיצין, טרולאנדומיצין, איטרוקונזול, קטוקונזול, ווריקונזול, ריטונאביר, אינידנאביר, נלפיביר או סאקווניאביר) מעלה את רמות אסימיניבם בדם, דבר העולול להגבר את הסיכון לתופעות לוואי. במקרה של טיפול מושלב בסמבליקס 200 מ"ג פעמים ביום יחד עם מעכbsp; CYP3A4, תידרש לנקב קפדי על ידי הרופא לתופעות לוואי.

**תמייה לשתייה של איטראקונזול המכילה הידרוקסיפרופיל-β - ציקלודקسترין**

מתן מושלב של סמבליקס עם תמייה לשתייה של איטראקונזול המכילה הידרוקסיפרופיל-β - ציקלודקسترין מפחית את רמות אסימיניבם בדם, מה שעלול להפחית את הייעילות של סמבליקס. הימנע משימוש מושלב של סמבליקס בכל המינונים המומלצים יחד עם תמייה לשתייה של איטראקונזול המכילה הידרוקסיפרופיל-β - ציקלודקسترין.

**השפעת סמבליקס על תרופות אחרות**  
CYP3A4

מתן מושלב של סמבליקס עם סובסטרטים של CYP3A4 (כגון: פנטניל, אלפנטניל, דיהידרארגוטמין או ארגוטמין) מעלה את הרמותם בדם של סובסטרטים מסוימים של CYP3A4, מה שעלול להגבר את הסיכון לתופעות לוואי של סובסטרטים אלו. במקרה של טיפול מושלב בסמבליקס בזמןן יומי של 80 מ"ג עם סובסטרטים מסוימים של CYP3A4, במקרים שניינים מזעריים בריכוז עלולים להוביל לתופעות לוואי. הימנע משימוש מושלב של סמבליקס בזמןן 200 מ"ג פעמים ביום עם סובסטרטים מסוימים של CYP3A4, במקרים בהם שניינים מזעריים בריכוז עלולים להוביל לתופעות לוואי רציניות.

**סובסטרטים של CYP2C9**

מתן מושלב של סמבליקס עם סובסטרטים של CYP2C9 (כגון: פנטואין או אורפאрин) מעלה את הרמותם בדם של סובסטרטים מסוימים של CYP2C9, מה שעלול להגבר את הסיכון לתופעות לוואי. הימנע מתיפול מושלב של סמבליקס בזמןן יומי של 80 מ"ג עם סובסטרטים מסוימים של CYP2C9, במקרים שבהם שניינים מזעריים בריכוז עלולים להוביל לתופעות לוואי רציניות. אם לא ניתן להימנע מתיפול מושלב, הרופא ינחה אותה להוריד מינון של סובסטרטים של CYP2C9.

הימנע משימוש מושלב של סמבליקס בזמןן 200 מ"ג פעמים ביום עם סובסטרטים רגיסטים של CYP2C9 וסובסטרטים מסוימים של CYP2C9, במקרים בהם שניינים מזעריים בריכוז עלולים להוביל לתופעות לוואי חמורות. אם טיפול מושלב לא ניתן למניעה, הרופא ינחה אותה לשקלול טיפול חלופי עם סובסטרט לא מסוג CYP2C9.

**סובסטרטים מסוימים של kp-P**

מתן מושלב של סמבליקס עם סובסטרטים של kp-P (כגון דיגוקסין) מעלה את הרמותם של הסובסטרטים של kp-P בדם, מה שעלול להגבר את הסיכון לתופעות לוואי של סובסטרטים אלו. במקרה של טיפול מושלב עם סמבליקס בזמןן יומי של 80 מ"ג יחד עם סובסטרטים של kp-P, הרופא ידרש לנטר מקרוב תופעות לוואי.

**שימוש בתרפיה ומזון**  
יש ליטול סמבליקס ללא מזון. **עליך להימנע מאכילה** במשך לפחות שעתים לפני ושעה אחת לאחר נטילת סמבליקס.

**הירין, הנקה ופרויט**  
הירין

- עליך להודיע לרופא אם אתה בהירין או מתכונת להרות. סמבליקס יכול לפגוע בעובר.
- הרופא יבצע בדיקת הירין לפני תחילת הטיפול בסמבליקס.
- נשים המסוגלות להרות צרכות להשתמש באמצעות מנעה עילית במהלך הטיפול במשך שבוע אחד לאחר המנה האחרונה של סמבליקס. שוחח עם הרופא על אמצעי המונעה העשויים להתאים לך.
- אם נכנסת להריון או אם אתה חושבת שאתה עשוי להיות בהירין במהלך הטיפול בסמבליקס, דוחח לרופא מייד.

## הנתקה

עליך לידע את הרופא אם את מניקה או מתכונת להנתק. לא ידוע אם סמבליקס עוברת לחלב אם. אין להנתק במהלך הטיפול ובמשך שבוע אחד לאחר המנה האחורה של סמבליקס.

## פוריות

סמבליקס עלולה לגרום לביעות פוריות בנשים. הדבר עלול לגרום ביכולת להיכנס להריון. שוחחי עם הרופא אם הדבר מתריד אותו.

## נהיגה ושימוש במכונות

לאסימיניב אין כלל השפעה או השפעה זניחה על היכולת לנוהג ולהפעיל מכונות. אם אתה חווית חרדה, עייפות או תופעות לוואי אחרות הקשורות לשימוש על הפעיע על היכולת לנוהג בזיהירות או להשתמש במכונות לאחר קייחת התרפיה, עליך להמנע מעשיות אלו עד אשר ההשפעה תעלם.

## מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרפיה

**סמבליקס מכילה לקטוז** אם נאמר לך על ידי הרופא שאתה סובלמאיו סבירות לסתורים מסוימים, עליך ליצור קשר עם הרופא לפני נטילת תרופה זו.

## סמבליקס מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבלייה, כלומר היא למעשה נתרן.

## 3. כיצד השתמש בתרפיה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל בחולים עם לוקמיה מייאלאידית כרונית חיובית לכרכוזום פילדלפיה בשלב כרוני הוא:

80 מ"ג פעמיים ביום במשך 40 מ"ג פעמיים ביום במרוחקים של 12-12 שעות.

המינון המקובל בדרך כלל בחולים עם לוקמיה מייאלאידית כרונית חיובית לכרכוזום פילדלפיה בשלב כרוני עם המוטציה 3153T הוא:

200 מ"ג פעמיים ביום במרוחקים של 12-12 שעות.

יש ליטול סמבליקס ללא מזון. **עליך להימנע מאכילה** במשך לפחות שעתים לפני ושעה אחת לאחר נטילת סמבליקס.

אין לשנות את המינון או לוח הזמן או להפסיק את נטילת סמבליקס, אלא אם הרופא מורה לך על כן.

הרופא עשוי לשנות את המינון או להפסיק את הטיפול באופן זמני או לצמצמות אם יהיה לך תופעות לוואי מסוימות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לבлевר טבליות סמבליקס בשלהותן. אין לשבר, לכתוש או ללעוס טבליות סמבליקס.

## אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעלך מן התרפיה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי בבית החולים והבא את אריזת התרפיה איתך.

## אם שכחת ליטול את התרפיה

- אם אתה נטול סמבליקס **פעם אחת ביום** והחמצת מנה ביום נוסף מ-12 שעות, יש לדלג על המנה שהחמצה וליטול את המנה הבאה במועד הרגיל.
- אם אתה נטול סמבליקס **פעמיים ביום** והחמצת מנה ביום נוסף מ-6 שעות, יש לדלג על המנה שהחמצה וליטול את המנה הבאה במועד הרגיל.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שאתה נטול תרפיה. הרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרפיה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסמבליקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימה של תופעות הלוואי.  
יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

##### סמבליקס עלולה לגרום לתופעות לוואי רציניות, לרבות:

- **ספירותת דם נמוכות.** סמבליקס עלולה לגרום לספירותת נמוכות של טסיות (תרומבוציטופניה), לספירותת נמוכות של תאי דם לבנים (נויטרופניה) ולספירותת נמוכות של תאי דם אדומים (אנמיה). הרופא יבצע בדיקות דם כדי לבדוק את ספירותת תאי הדם כל שבועיים במשך שלושה חודשים הראשונים, ולאחר מכן אחת לחודש או לפחות בחודש אחד לאחר הטיפול בסמבליקס. דוח לרופא מייד אם אתה סובל מדימום בלתי צפוי או מחברות (שטיי דם) הנוצרות בקלות, מבחין בדם בשתן או בצואה, סובל מחרום או מסימנים כלשהם של זיהום.
- **בעיות לבלב.** סמבליקס עלולה לגרום לעלייה בرمמות האנ贊ימים עמילאז וליפאץ בדם, אשר עלולה להוות סימן לדלקת הלבלב. הרופא עשוי לבצע בדיקות דם אחת לחודש או לפחות בחודש אחד לאחר הטיפול בסמבליקס כדי לאבחן בעיות לבלב. דוח לרופא מייד אם אתה סובל מכאב או מאין-נוחות פתאומיים באזורי הקיבה, מבחילה או מהקאה.
- **לחץ דם גבוה.** הרופא עשוי לבדוק את לחץ הדם שלך ולטפל בלחץ דם גבוה במהלך הטיפול בסמבליקס לפחות בחודש אחד. דוח לרופא אם אתה מפתח לחץ דם מוגבר או תסמינים של לחץ דם גבוה, לרבות בלבול, כאבי ראש, סחרחות, כאב בחזה או קוצר נשימה.
- **תגובה אלרגית.** הפסיק את נטילת סמבליקס ופנה לעזרה רפואי מייד אם אתה מפתח סימנים או תסמינים כלשהם של תגובה אלרגית, לרבות:
  - קושי בנשימה או בבליעה
  - נפיחות של הפנים, השפתיים או הלשון
  - פריחה בעור או סומך בעור
  - תחושת סחרחות או עילפון
  - חום
  - קצב לב מהיר
- **בעיות לב וכלי דם (קרדיוסקளוריות).** סמבליקס עלולה לגרום לביעות לב וכלי דם, לרבות התקף לב, שבץ, קרייסי דם או חסימת עורקים, אי ספיקת לב וקצב לב לא תקין, אשר יכולות להיות רציניות ועוללות לעיתים להוביל למוות. בעיות אלו בלב ובכלי דם יכולות להופיע אצל אנשים עם גורמי סיכון או בעלי היסטוריה של בעיות אלו, ואו אצל אנשים שטופלו בעבר בתרופות מעכבות טירוזין קינאז אחרות. הרופא עשוי לבצע מוקב לצורך אבחון בעיות לב וכלי דם ולטפל בכך לפחות בחודש הטיפול בסמבליקס. דוח לרופא או פנה לעזרה רפואי מייד אם אתה מפתח:
  - קוצר נשימה
  - כאב או לחץ בחזה
  - תחושה שהלב פועם בקצב מהיר מדי או שאתה מרגיש פעימות לב בלתי תקיןות
  - נפיחות בקרסולאים או בכפות הרגליים
  - סחרחות
  - עלייה במשקל
  - חוסר תחושה או חולשה מצד אחד של הגוף
  - ריאדה בריאות או איבוד ראייה
  - קושי בדברור
  - כאב בידים, ברגליים, בגב, בצוואר או בלסת
  - כאב ראש
  - כאב חמוץ באזורי הקיבה
- **חום**
- **ziehom\_BDRCI השטן**
- **כאב ראש**
- **כאב בטן**
- **הקאה**
- **ziehom\_BRIOTIM (דלקת ריאות)**
- **כאב בשיררים, עצמות או במפרקים**
- **דימום**
- **עצמירות**
- **כאב בחזה, שיעול, שיהוקים, נשימה מואצת, הצלברות של נוזל בחלל בין הריאות לבין החזה, שבמידה וחוור יכול לגרום לחוסר נשימה (תפליט פלוראל')**

## תופעות הלואין השכיחות ביותר של סמליקס כוללות (מופיעות באחד או יותר מעשרה משתמשים):

- זיהומים באף, בגרון או בסינוסים (דרכי הנשימה העליונות)
- כאב בשירים, בעצמות או במפרקים
- כאב ראש
- עייפות
- בחילה
- פריחה
- שלשול
- הקאה
- דימום
- כאב במפרקים (ארטראלגייה)
- נפיחות כללית (בצקת)
- גרד
- שיעול
- יתר לחץ דם
- כאב בטן

## המטלוגיה

- ירידה בספירות של טסיות, תאֵ דם לבנים ותאי דם אדומים

## ביבוכינה

- עלייה ברמות של שומנים (טריגליצרידים, כולסטרול) בدم
- עלייה ברמות של קרייטין קיאז בדם
- עלייה ברמות של אנזימיCBD בדם
- עלייה ברמות של אנזימי לבלב (עמילאז וליפאז) בדם
- עלייה ברמות של חומצה אורית בדם
- ירידה ברמות פוספטאט
- ירידה ברמות סיידן מתוקנות
- עלייה ברמות של קרייטינין בדם
- עלייה ברמות של אלקלין פוספטאז
- עלייה ברמות של בילירוביון בדם
- עלייה או ירידה ברמות אשלגן בדם

## תופעות לוואי נוספת כוללות:

- אי ספיקת לב
- חום
- זיהום בדרכי השתן
- זיהום בריאות (דלקת ריאות)
- עצירות
- קצב לב לא תקין, כולל שינויים בפעולות החשמלית של הלב ( הפרעת קצב (אריתמיה), כולל הארכת מקטע QT באק"ג)
- כאב בחזה, שיעול, שיוהוקים, נשימה מוצצת, הצבירות נזול בחלל בין הריאות לבין החזה, שבמקרה שהוא יכול להגרום לחוסר נשימה (תפליט פלוראל)
- קוצר נשימה, נשימה מאומצת
- סחרחוורת
- רמות גבוהות של שומנים/לפיידים (דיסלפידמיה)
- ירידה בתיאבון
- פריחה מגדרת (אורטיקרייה)
- זיהום של הריאות והסمفונות (דרכי הנשימה התחתונות)
- שפעת
- הרגשה של דפוקות לב מהירות וחזקות (פלפיטציות)
- טשטוש ראייה
- יובש בעיני

תת-פעולות של בלוטת התריס עם עלייה אפשרית במשקל, אגירת נזלים, עצירות, רגישות לקור (היפו-טירואידיזם)

- חום מעל C=38 המזקשור עם רמה נמוכה של תאֵ דם לבנים (ניוטרופניה פיברילית)
- דלקת לבלב (פנקראטיטיס)
- פגיעה עצבית (נוירופתיה היקפית)
- ריגשות יתר

אם הופעה תופעת לווואי, אם אחת מתופעות הלווואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לווואי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוחות על תופעות לווואי למשרד הבריאות באמצעות לוחcia על הקישור "דיווח על תופעות לווואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לווואי, או על ידי כניסה ל קישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### **5. אורך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה והמגשית.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אין לאחסן מעל C=25. יש לאחסן בארים המקוריים על מנת להגן מלחות.

#### **6. מידע נוספת על המרכיב הפעיל בתרופה מכילה גם:**

##### **נוסך על המרכיב הפעיל בתרופה מכילה גם:**

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose (E460i), hydroxypropylcellulose, low-substituted (E463),croscarmellose sodium (E468),polyvinyl alcohol (E1203),titanium dioxide (E171),magnesium stearate, talc (E553b), colloidal silicon dioxide, lecithin (E322), xanthan gum (E415),iron oxide red (E172)

טבליות מצופות 20 מ"ג מכילות בנוסך:

iron oxide yellow (E172)

טבליות מצופות 40 מ"ג מכילות בנוסך:

iron oxide black (E172)

ראה פרק 2 סעיף " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

**סמליקס 20 מ"ג:** טבליה מצופה, עגולה, ללא קו חציה, קמורה בשני צידיה עם קצוצות משופעים, עם קוטר של כ- 6.2 מ", בצלע צהוב בהיר. על כל טבליה מוטבע המספר "20" בצד אחד והלוגו של נוברטיס בצד השני.  
**סמליקס 40 מ"ג:** טבליה מצופה, עגולה, ללא קו חציה, קמורה בשני צידיה עם קצוצות משופעים, עם קוטר של כ- 8.2 מ", בצלע סגול ולבן. על כל טבליה מוטבע המספר "40" בצד אחד והלוגו של נוברטיס בצד השני.

כל אריזה מכילה 20 או 60 טבליות מצופות.

ייתכן שלא כל גודלי האריזות משוקקים.

**בעל הרישום והיבואן וכותבתו:** נוברטיס ישראל בע"מ, ת"ד 7126, תל אביב.

נערכ באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

**סמליקס 20 מ"ג:** 172-84-37483-99

**סמליקס 40 מ"ג:** 172-85-37484-99

לשם הפשתות ולהקלת הקיראה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.