

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

كورسوفا

محلول للحقن 50 ميكروغرام / 1 مل

المادة الفعالة وتركيزها:

يحتوي كل 1 مل على 50 ميكروغرام ديفيليكيفالين.

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - قائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسة في المستحضر - انظر البند 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

كورسوفا مخصص لعلاج الحكة المتوسطة حتى الشديدة المرتبطة بمرض الكلى المزمن لدى المرضى البالغين الذين يخضعون للدialis.

الفصيلة العلاجية: كافة المنتجات العلاجية الأخرى

يحتوي كورسوفا على المادة الفعالة ديفيليكيفالين.

يعلم كورسوفا على أهداف في الجسم تسمى مستقبلات كاپا-أفيونات (kappa-opioid)، والتي تشارك في السيطرة على الشعور بالحكمة. من خلال تحفيز هذه المستقبلات على الخلايا العصبية والخلايا المناعية خارج الدماغ، يخفف كورسوفا من الشعور بالحكمة الناجم عن مرض الكلى المزمن.

المادة الفعالة، ديفيليكيفالين، لا يعبر الحاجز الدموي الدماغي (حاجز طبيعي بين الأوعية الدموية والدماغ)، مما يقلل من خطورة حدوث أعراض جانبية.

2. قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لـ ديفيليكيفالين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ كورسوفا، أخبر الطبيب أو الممرضة إذا:

- كان لديك ارتفاع في مستويات البوتاسيوم في الدم
- يوجد لديك أو وُجد لديك سابقاً ضعف في القلب أو اضطراب في نظم القلب
- كان لديك ضعف في أداء الحاجز الدموي الدماغي (مثل سرطان الدماغ أو الجهاز العصبي المركزي، أو مرض في الجهاز العصبي المركزي مثل التصلب المتعدد أو الخرف)، لأن هذا قد يزيد من خطورة حدوث أعراض جانبية

- كنت تبلغ من العمر 65 سنة وما فوق، لأنك احتمالية أكبر أن يسبب لك الدواء النعاس
 - إذا كنت تستعمل أدوية يمكن أن تزيد من خطورة حدوث نعاس أو دوار مثل:
 - أدوية تبطئ من نشاط الدماغ مثل تلك التي تساعد في اضطرابات النوم والقلق
 - الأدوية التي تعالج الحساسية، الرشح، الغثيان و/أو التقيؤات، التي تسمى مضادات الميستامين مع تأثير مخدر (مهدئ)
 - مسكنات الآلام القوية تسمى مسكنات الآلام الأفيونية
- أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أيّاً من الأدوية المذكورة أعلاه.

الأطفال والمرأهقون

لا يوصى باستعمال كورسوفا لدى الأطفال والمرأهقين الذين هم دون عمر 18 سنة.

لا توجد معلومات عن الاستعمال لدى الأطفال والمرأهقين الذين هم دون عمر 18 سنة.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، ربما تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بالدواء. لم يتم دراسة كورسوفا لدى النساء الحوامل. من غير المعروف ما إذا كان كورسوفا يمكن أن يلحق الضرر بالجنين. سيناقش طبيبك معك ما إذا كان يجب عليك استعمال كورسوفا أثناء الحمل.

من غير المعروف ما إذا كان كورسوفا يمكن أن ينتقل إلى حليب الأم. إذا كنت مرضعة، فسوف ينصحك طبيبك بالتوقف عن الإرضاع أو التوقف عن العلاج بكورسوفا، مع الأخذ في الاعتبار فوائد إرضاع الرضيع وإعطاء كورسوفا لك، الأم.

السيارة واستعمال الماكينات

قد يسبب كورسوفا دواراً ونعاساً اللذين يمكن أن يضعفوا قدرتك على رد الفعل. لا يجوز السيارة أو تشغيل الماكينات إذا انخفضت قدرتك على رد الفعل أو إذا كنت لا تعرف ما هو تأثير كورسوفا على قدرتك على رد الفعل.

معلومات مهمة عن بعض مرکبات الدواء

يحتوي الدواء على صوديوم بكمية أقل من 23 ملг لكل 1 ملл وبالتالي يعتبر خالياً من الصوديوم.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. سيحدد طبيبك المقدار الدوائي من كورسوفا المناسب لك بناءً على وزن جسمك. سيتم إعطاء الدواء كحقنة داخل الوريد من قبل طبيب أو ممرضة في نهاية علاج الديلزة من خلال الأنبيب الذي يوصلك بجهاز الديلزة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج

سيتم إعطاؤك كورسوفاً ثلاثة مرات في الأسبوع. يزداد هذا الرقم إلى أربع مرات أسبوعياً في حالة تلقى علاج بالديزلة أربع مرات أسبوعياً. لا يوصى بتلقي أكثر من أربعة مقادير دوائية من كورسوفاً في الأسبوع، حتى لو كان عدد علاجات الديزلة في الأسبوع أكثر من أربعة.

إذا لم يكتمل العلاج بالديزلة، سيقرر طبيبك ما إذا كان من الأفضل لك تلقي كورسوفاً بعد العلاج غير المكتمل أو الانتظار حتى العلاج التالي بالديزلة. إذا فاتك علاجاً بالديزلة، سيتم إعطاؤك المقدار الدوائي المعتمد من كورسوفاً في علاج الديزلة التالي.

من المتوقع أن تقل الحكة بعد 1-2 أسبوعاً من العلاج بـ كورسوفاً.

المرضى الذين لديهم انخفاض في وظيفة الكبد:

لا يتطلب الأمر ملائمة المقدار الدوائي للمتعالجين الذين لديهم انخفاض طفيف أو متوسط في وظيفة الكبد. كورسوفاً غير موصى به للمتعالجين الذين لديهم انخفاض شديد في وظيفة الكبد، حيث لم يتم فحص استعماله لدى هؤلاء المتعالجين.

إذا تناولت عن طريق الخطأ مقداراً دوائياً أكبر، وهذا الأمر يزيد من حدوث الأعراض الجانبية المذكورة في البند 4. يجب عليك التحدث مع طبيبك إذا كنت تعتقد أن هذا ينطبق عليك.

لا يجوز استعمال أدوية في العنة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول استعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال كورسوفاً قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية لدى المرضى الذين يتلقون هذا الدواء
أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-100 مستعملين من بين 100

▪ نعاس

▪ اضطراب حسي في الجلد مثل وخز، نحر، حرقة أو خدر، تدني الحس أو الحساسية

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 10-100 مستعملين من بين 1000

▪ دوار

▪ صداع

▪ تغيرات في الحالة النفسية (اليقظة وصفاء الذهن) بما في ذلك الارتباك

▪ غثيان، نقفيُّ

▪ إسهال

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تتعني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبیة

بإمكان التبلیغ عن اعراض جانبیة لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبیة عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبیة، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية الذي يظهر على ظهر علبة الكرتون أو الكيس بعد الكلمة EXP. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين في درجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية:

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Acetic acid (for pH adjustment), sodium acetate trihydrate (for pH adjustment), sodium chloride, water for injections

▪ كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

كورسوفا هو محلول شفاف عديم اللون بدون جزيئات (pH 4.5). يتم توفير الدواء ضمن قنينة زجاجية مع سدادة مطاطية، ختم الومبليوم وغطاء بلاستيكي أزرق.

- تحتوي العلبة على 3 أو 12 قنينة. من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلبة.
- صاحب الامتياز وعنوانه: كنكتسات م.ض، شارع هشارون 4، هود هشارون، إسرائيل.
- إسم المنتج وعنوانه:

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France
100–101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
France

- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

173-72-37475-99

تم إعداد هذه النشرة في تاريخ 08/2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.