

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يَسوقُ الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ترامادكس OD 100, 200, 300

أقراص بتحريز مُمتد

كل قرص بتحريز مُمتد يحتوي على: ترامادول هيدروكلوريد (Tramadol hydrochloride) 100, 200 أو 300 ملغ. على التوالي.

مواد غير فعالة ومُورجات في الدواء – أنظر بند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة باسما عن حياتي نهائيتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مُلخصة عن الدواء. إذا كنت لديك أسئلة إضافية، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء وصف للعلاج من آجلك. لا تعطه إلا لخبرين. فهو قد يسبب الضرر لهيكل حتى إذا بدك لك أو وضعهم الصحيح ممتائل.

قد تؤدي الأدوية من عائلة الأفيونات إلى الإدمان، خاصةً عند الاستعمال المتواصل، وفي ذات إمكانية لسوء استعمال جرعة مفردة. قد يظهر رد الفعل للجرعة المفردة كنتفص بطيء وقد يؤدي حتى إلى الوفاة.
تأكد من أنك تعرف اسم الدواء. الجرعة التي تتناولها وتيرة إعطاء الدواء، مدة العلاج، الأعراض الجانبية والاختلاطات (أخطارها) وكيفية استعماله. يمكن العثور على معلومات إضافية حول الخططر التعلق والإدمان عن طريق الرابط:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DoCLib/opioids_ar.pdf

تناول هذا الدواء مع مة فصلية بين دوزين بيتاند.
أدوية أخرى المشبهة ليجاز الأعصاب المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول قد يؤدي لشعور بالنعاس العميق، صعوبات تنفس (تثبيط الجهاز التنفسي)، غيبوبة والموت.

1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

لعلاج ألم متوسط حتى وخيم.
الفصلية العلاجية: مسكن للألام من الفصلية الأفيونية.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حاسنا (رَجِيحًا) للعادة الفعالة (ترامادول هيدروكلوريد)، أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر بند 6).
- إذا حل التسمم الحاد من الكحول، أدوية النوم، مسكنات الألم أو أدوية أخرى نفسائية التأثير (الأدوية التي تؤثر على المزاج والمشاعر).
- إذا كنت تتناول أو تناولت في الأسبوعين الأخيرين أدوية من فصيلة مُثبطات مونامين أو كسيداز MAOIS (تستعمل لمعالجة الاكتئاب).
- إذا كنت تعاني من مرض كبِد وخيم أو من مرض كلية وخيم.
- إذا كنت تعاني من صرع الذي لم يتم السيطرة عليه كما يجب عن طريق علاج. إذا كنت مرضعة، في حال حمل طويل الأمد (الظفر أيضًا بند "الحمل، الإرضاع والحصول")
- إذا كنت غير متأكد من المهم استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة مختلفة باستعمال الدواء

استشر الطبيب أو الصيدلي قبل العلاج بترامادكس OD.

آخر الطبيب إذا كنت تعاني من إدمان على دواء آخر، موجود بعلاج فُطام من دواء آخر أو أن لديك تعلق بدواء آخر. هذا الدواء قد يسبب تعلق نفسي أو جسدي

- بيورينوفين، ثيوفين، بينيتوزوسين (مسكنات الألم أخرى)
- كحول

لنتركسبون (تستعمل للعلاج وبالقطم من الكحول من المخدرات)

هذا الدواء قد يسبب اختلاجات بجرعات علاجية وعلى وجه الخصوص عندما يؤخذ بجرعات عالية وبالدمع مع أدوية أخرى التي تشمل:
• بيورينوبيون (تستعمل للمساعدة على إيقاظ الكتلخين).
• مفليكوبن (علاج للملاريا).

الاحتظار للأعراض الجانبية يرتفع أذا:

- إذا كنت تتناول أدوية التي قد تؤدي إلى تشنجات (توتبات اختلاجات)، مثل مضادات اكتئاب أو مضادات ذهان معينة. اختطار لوية قد يورف إذا كنت تتناول ترامادول OD.
• بتلوازي، أي سيقول لك الطبيب إذا كان ترامادكس OD ملانك.
• كنت تتناول استنشاق اكتئاب معينة. قد يتفاعل ترامادكس OD مع هذه الأدوية وقد تعاني من متلازمة السيروتونين (انظر بند 4 "الأعراض الجانبية").

هذا الدواء قد يتفاعل أيضًا مع الأدوية التالية:

- أدوية تشبه المورفين مثل: أدوية للسعال أو زكام.
- على سبيل المثال ميتانول.
- مسكنات الألم الأخرى.
- وقافرين (تتبع الأدم).
- واردينيز بيتاند وأدوية أخرى لعلاج القلق
- أدوية معينة لعلاج فرط ضغط الدم.
- مضادات الهيستامين (لعلاج حساسية الجلد التي تسبب النعاس).
- ثاليدوميد (علاج سرطان وحالات جلد معينة).
- بروتريوت (أدوية النوم).
- أدوية مضادة للذهان، فينوفازينات، بيوتروفونو (علاج مرض نفسي) واكلوفن (مخري عضلات)

استعمال الدواء والطعم

يمكن تناول الدواء دون علاقة بالوجبات.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول
استهلاك الكحول غير موصى به أثناء العلاج.

الحمل، الإرضاع والحصولية

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حامل أو إذا كان ذلك ضروري تمامًا. إذا كنت حامل أو مرضعة، فتأكدين بأنه قد تكونين حامل أو تخططين للدخول في الحمل. استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.
ترامادول يُفرز لحليب الأم، وبالتالي، لا يجوز تناول ترامادكس OD أكثر من مرة واحدة خلال الإرضاع. أو بدلًا من ذلك، إذا كنت تتناولين ترامادكس OD أكثر من مرة واحدة، عليك تجنب التعرض للإرضاع.
استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء كان.

السليقة والأدوية الألات

ترامادكس OD قد يسبب النعاس. لا يجوز السليقة أو القيام بفعاليات التي تازم اليقظة (على سبيل المثال استعمال أدوات عمل أو آلات)، حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك. لا يجوز تناولتول مع الكحول أو أدوية التي تسبب النعاس.
الدواء قد يؤثر على فرتك على السليقة بما أنه قد يسبب النعاس أو الدور.
استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متقنة أنه من الأمان بالنسبة لك السليقة أثناء تناول هذا الدواء. بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب التراجة أو من ألعاب على مقربة من الشارع وما شابه.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليغوم سويديوم (23 ملغ) في القرص، ولذلك يعتبر "خاليا من السويديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائما استعمال الدواء وفقًا لتعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص طريقة العلاج بالدواء.
ستتم ملائمة الجرعة لمدة 4 أيام ولحاصلتيك الشخصية للألم. كقاعدة، يجب أخذ الجرعة الأكثر انخفاضًا المسكنة للألام.
الجرعة وطريقة العلاج يُحدَدان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الاعتيادية عادةً هي:

البالغون والراهقون من جيل 14 وما فوق:

الجرعة الابتدائية هي 100 ملغ، مرة في اليوم. بعد ذلك الاستمرار بجرعة من

200 ملغ، مرة في اليوم. إذا كان تسكين الألم لا يكفي، الجرعة القصوى هي 300 أو 400 ملغ مرة في اليوم.
متعلجون مسنون (حتى جيل 75) - لا توجد حاجة لملائمة الجرعة.
متعلجون مسنون (فوق جيل 75) - لدى متعلجون مسنون (فوق جيل 75) قد يتم إعطاء إفراز ترامادول من الجسم. إذا كان هذا صحيح بالنسبة لك، قد يوصي الطبيب بإطالة الفترات بين الجرعات.
مرضى كبِد أو كلية ويخ (**فصير**) **المرضى الكلى** وفي حالات من قصور وظيف للكبِد أو الكلى، لا يجوز أخذ ترامادكس OD. إذا كان القصور الكلياني يكسب حتى متوسط قدر في المرضى (يشكل أساسيًا إذا كان التأثير على كل الجسم).

الفترات بين الجرعات.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول:

يجب بلع القرص بكامله مع كأس ماء، من المغضل في السماء. يمكن أخذ ترامادكس OD مع مشروب أو طعام.
لا يجوز شطُر، مضغ، سحق أو إذابة القرص لأنها بتحريز مُمتد. يجب تناول الأقراص مرة كل 24 ساعة.

لا يجوز تناول الدواء لمدة أكثر من المطلوب. إذا كنت بحاجة لأن تكون مُعالج لفترة طويلة، فيصحف الطبيب بفترات زمن ثابتة وضرورة (مع استراحت في العلاج، وفقًا للحاجة) هل تستطيع الاستمرار بتناول الدواء وبني جرد. إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء أقوى من المطلوب أو أضعف من المطلوب، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

لا يجوز تناول الدواء لمدة أكثر من المطلوب. إذا كنت بحاجة لأن تكون مُعالج لفترة طويلة، فيصحف الطبيب بفترات زمن ثابتة وضرورة (مع استراحت في العلاج، وفقًا للحاجة) هل تستطيع الاستمرار بتناول الدواء وبني جرد. إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء أقوى من المطلوب أو أضعف من المطلوب، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

لا يجوز تناول الدواء لمدة أكثر من المطلوب. إذا كنت بحاجة لأن تكون مُعالج لفترة طويلة، فيصحف الطبيب بفترات زمن ثابتة وضرورة (مع استراحت في العلاج، وفقًا للحاجة) هل تستطيع الاستمرار بتناول الدواء وبني جرد. إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء أقوى من المطلوب أو أضعف من المطلوب، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

إذا أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة

تبيح في الجهاز الهضمي (شعور بضغط في المعدة وغزات) مشاكل في القلب والأوعية الدموية (ارتفاع في نظم القلب، ضغط دم منخفض، عند الانتقال لوضعية الوقوف، شعور غير جيد مصحوب بهبوطضغط الدم).

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة لتعويض عن الجرعة النسيبة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المتداومة على العلاج كما أوصى من قبل الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن أخذ الدواء بشكل مفاجئ دون أن يكون الطبيب قد أمرك بذلك. إذا كنت تريد التوقف عن استعمال الدواء، استشر الطبيب بدايةً. خاصةً إذا استعملت لفترة طويلة. سيتمكك طبيبك الاستشارة كيف ومتى يجب التوقف. قد يكون هذا عن طريق خضيب الجرعة بالتدريج للتقليل من إمكانية تطوير أعراض جانبية (أعراض فطام).

في أحيان نادرة، عندما يتوقف جزء من المتعلجين عن أخذ ترامادكس OD، بعد استعمال طويل الأمد، فإنهم يعانون من أعراض فطام. قد يعانون من أعراض التالية: عدم هدوء، قلق، عصبية أو رجفة. فرط الحركة وصعوبة في الخلود إلى النوم. هذه الأعراض تختفي عادةً خلال عدة أيام. آخر الطبيب عند ظهور هذه الأعراض.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة الوافية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

إذا كنت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كلل أي دواء، قد يسبب استعمال ترامادكس OD أعراض جانبية لدى جزء من المتستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.
الأدوية قد تسبب ردود فعل تحسسية، لكن ردود فعل تحسسية وخيمة هي نادرة جدًا.

توجه إلى الطبيب فورًا عند ظهور مفاجئ لصفير بالتففس، صعوبات تنفس، اختلال الجنون، الوجة أو الشفتين، طفح أو حكة (يشكل أساسيًا إذا كان التأثير على كل الجسم).

أعراض جانبية وخيمة

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فورًا إلى الطبيب عند ظهور:

• تشنجات (توتبات اختلاجات)

• صعوبات تنفس

• طفح أو قاتل أو أرجح أيًا كان

أعراض جانبية إضافية

• تشنجات (توتبات اختلاجات)

• صعوبات تنفس

• طفح أو قاتل أو أرجح أيًا كان

أعراض جانبية إضافية

• تشنجات (توتبات اختلاجات)

• صعوبات تنفس

• طفح أو قاتل أو أرجح أيًا كان

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 10-11 مستخدمين من بين 100):

• إمساك، جفاف في الفم، تغير

• تعرق

• ألم رأس، نعاس

• تعب

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

• تبيح في الجهاز الهضمي (شعور بضغط في المعدة وغزات)

• مشاكل في القلب والأوعية الدموية (ارتفاع في نظم القلب، ضغط دم منخفض، عند الانتقال لوضعية الوقوف، شعور غير جيد مصحوب بهبوطضغط الدم).

• تفاعلات في الجلد (حكة، طفح، شرى)

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):

• مضغف عضلات

• تغيرات في الشهية

• نظم قلب أو تنفس بطيئين

• ضبابية في الرؤية (انقباض الحفقات (انقبض الحفقات)

• صعوبات في التبول

• تغيرات في المزاج (مثل شعور غير طبيعي بالفرح).
تغيرات في الفعالية (تغير في الإفضاء في العفالية)
وتغيرات بالتفكير
• هوسمة (مشاهدة أو سماع أشياء)، ارتباك، اضطراب نوم، قلق، كوابيس، تفكير مرتبك وانخفاض في الوعي (خزيان)

• تفاعلات أخرى

• تورور

• تعلق بالدواء (إدمان أو تعلق بهذا الدواء)
قد تحدث بالرغم من ذلك، الدواء لشخص ل كلا الجنسين.

البند 3 "إذا توقفت عن تناول الدواء ("

• نوبات صرع

• ارتفاع في إنزيمات كبِد في عند فردي من الحالات

أعراض جانبية شيوعها غير معروف (أعراض التي لم يتم تحديد شيوعها بعد):

• مستوى منخفض أكثر منابغين من السكر في الدم

• متلازمة السيروتونين، التي قد تظهر كتغيرات في الحالة النفسية

5. كيف تخزن الدواء؟

تعبأ عن التسليم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيد عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسلب أطفال دون تعليمات صريحة من الطبيب.
لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ انتهاء الصلاحية) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يبرع إلى اليوم الأخير من الشهر.
شروط التخزين: خزن بدرجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. لا يجوز التخلف من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو الفليات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعقد استعمالها. هذه الخطوات شامها في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Polyvinyل acetate, xanthan gum, hydroxypropyl distarch phosphate (E1442) (Contramid®), povidone, hydrogenated vegetable oil, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, sodium laurilsulfate.

كيف يبدو الدواء وما يحتوي العبوة:

قرص مستدير، بلون أبيض-كريم.

أحجام عبوة مضادق عليها: 2, 5, 10, 20, 30, 150 قرص.

قد لا تكون جميع أحجام العبوة متوفرة.

المنتج وعنوانه: دكسل مرض، شارع دكسل 1، أور عكيفا 3060000، إسرائيل.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومية في الضفة:

ترامادكس OD 100: 139-25-31581

ترامادكس OD 200: 139-26-31581

ترامادكس OD 300: 139-27-31582

تم التفتيح في شباط 2022 حسب تعليمات وزارة الصحة

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر.

بالرغم من ذلك، الدواء لشخص ل كلا الجنسين.

صاحب التسجيل:

دكسل فارما تكنولو جيا م.ض,

شارع دكسل 1، أور عكيفا 3060000، إسرائيل