

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب، فقط

جيوبتريف 20 ملغ**جيوبتريف 30 ملغ****جيوبتريف 40 ملغ****جيوبتريف 50 ملغ****أفراد مغلفة**

كل قرص مغلف جيوبتريف 20 ملغ يحتوي على 20 ملغ أفاتينيب (ك ديملات) (Afatinib (as dimaleate)).

كل قرص مغلف جيوبتريف 30 ملغ يحتوي على 30 ملغ أفاتينيب (ك ديملات) (Afatinib (as dimaleate)).

كل قرص مغلف جيوبتريف 40 ملغ يحتوي على 40 ملغ أفاتينيب (ك ديملات) (Afatinib (as dimaleate)).

كل قرص مغلف جيوبتريف 50 ملغ يحتوي على 50 ملغ أفاتينيب (ك ديملات) (Afatinib (as dimaleate)).

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر – انظر البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء"، الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها، وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. هذا الدواء **وُصف لك**. لا تعطه لآخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

يُستخدم الدواء كعلاج وحيد (معالجة أحادية الدواء) لعلاج:

- مرضى بالغين الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، التي تتميز بطفرة الجين في مستقبل عامل نمو البشرة (Epidermal Growth Factor Receptor) EGFR، والذين مرضهم موجود في مرحلة متقدمة موضعية أو نقيليّة، والذين لم تتم معالجتهم بعد بمعوقات تيروزين كيناز للمستقبل EGFR.
- مرضى بالغين الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا حرشفية، والذين مرضهم موجود في مرحلة متقدمة موضعية أو نقيليّة، والذي تطور خلال أو بعد علاج كيماوي.

المجموعة العلاجية: مضاد للأورام، معوقات تيروزين كيناز.

2. قبل البدء باستعمال الدواء**يُمنع استعمال الدواء إذا:**

- كنت حساساً لل المادة الفعالة أفاتينيب، أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 في النشرة).
- كنت حاملاً أو مرضعة.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:**قبل العلاج بـ جيوبتريف، أخير الطبيب إذا:**

- كان وزن جسمك أقل من 50 كغم، أو إذا كنت امرأة، أو إذا كنت تعاني مشاكل كلوية. إذا كان واحد من هذه المعايير ينطبق عليك، من الممكن أن تُضطر إلى الخضوع لمراقبة حثيثة أكثر من قبل الطبيب المعالج. وفي هذه الحالات، من الممكن أن تكون الأعراض الجانبية أكثر حدة.
- كان لديك تاريخ مرضي من التهاب الرئة (مرض رئوي خلالي).
- كنت تعاني مشاكل في الكبد. من الممكن أن يوجهك الطبيب لإجراء فحوصات للكبد. لا يُنصح بهذا العلاج الدوائي إذا كان لديك مرضًا كبيداً خطيراً.
- كنت تستعمل عدسات لاصقة وأو إذا كان لديك تاريخ مرضي من مشاكل العينين، مثل الحفاف الحاد في العينين، التهاب القسم الخارجي من العين (القرنية) أو نقرّحات في العين تشمل القسم الخارجي من العين.
- كان لديك تاريخ مرضي من مشاكل القلب. من المحتمل أن تحتاج إلى الخضوع لمراقبة حثيثة أكثر من قبل الطبيب المعالج.

خلال العلاج بالدواء، يجب التوجه إلى الطبيب، فوراً:

- إذا تطور إسهال. مهم جداً معالجة الإسهال عند ظهوره لأول مرة.
- إذا تطور طفح في الجلد. العلاج المبكر عند ظهور الطفح مهم.
- إذا تطور أو تفاقم، فجأة، ضيق تنفس، الذي من الممكن أن يكون مصحوباً بارتفاع في درجة الحرارة أو بسعال. من المحتمل أن تكون هذه أعراض التهاب الرئة اسمه "المرض الرئوي الخلالي" والذي قد يكون خطراً على الحياة.

Giotrif	Proposed Patient Information
Film coated tablets 20mg, 30mg, 40mg, 50mg	December 2019

- إذا كنت تعاني من ألم شديد في المعدة أو في الأمعاء، المصحوب بحمى، قشعريرة، غثيان، تقيؤات أو تصلب بطني أو انتفاخ، قد تكون هذه أعراض تمزق في جدار المعدة أو الأمعاء (نثبت في جهاز الهضم). كذلك، يجب إخبار الطبيب إذا عانيت في المرضى من تقرحات في جهاز الهضم أو من مرض رتجي (diverticular disease) أو إذا كنت تتناول أدوية مضادة للالتهاب (التي تستعمل للتخفيف من الألم أو الانتفاخ) أو ستيرويدات (الالتهابات وأنواع الحساسية). هذه الأدوية قد تزيد من الخطورة لذلك.
- إذا تطور أو تفاقم حمرار أو ألم في العين، إذا كانت العين تتسع أكثر، عدم وضوح الرؤية وأو حساسية للضوء. من المحتمل أن تحتاج لعلاج طارئ.

أنظر الأعراض الجانبية المحتملة في البند 4 - "أعراض جانبية".

الأطفال والمرأهقون

لم يتم فحص چيوتريف على متعالجين دون سن 18 عاماً. يمنع إعطاء هذا الدواء للأطفال وللمرأهقون دون سن 18 عاماً. غير موصى بهذا الدواء لمرضى بمرض كبد أو كلوي خطير.

- إذا كنت تتناول أو تناولت، مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
- تناول الأدوية التالية قبل چيوتريف من الممكن أن تزيد من مستويات الدواء چيوتريف في دمك، لذا قد تتفاقم الأعراض الجانبية لـ چيوتريف. لذا يجب تناول هذه الأدوية بعيداً – قدر الإمكان – من موعد تناول چيوتريف. أي يُفضل أن يكون هناك فارق زمني من 6 ساعات (إذا كان الدواء الإضافي يؤخذ مرتين في اليوم) أو 12 ساعة (إذا كان الدواء الإضافي يؤخذ مرتين في اليوم) عن موعد تناول چيوتريف:
 - ريتونافير، كتونوزول (إلا إذا كان في الشامبيو)، إيتوكونوزول، إريثروميسين، نفينافير، سكونافير – لمعالجة العدوى المختلفة.
 - فيرياميل، كوبيندين، أميدرون، إيمودرون – لمعالجة مشاكل القلب.
 - سيكلوسپورین A، تكروليموس – توثر هذه الأدوية في جهاز المناعة لديك.

تناول الأدوية التالية من الممكن أن يقلل من فعالية چيوتريف:

- كاربامازيبين، فنتوتين، فنوباربิตال – لمعالجة الصرع.
 - خلاصة العزن – بنتة سانت جون (هيبريكوم پروفورنوم St. John's Wort) – دواء نباتي لمعالجة الاكتئاب.
 - ريفامپيسين – مضاد حيوي لمعالجة النزل.
- إسأل الطبيب المعالج إذا لم تكن متاكداً من موعد تناول هذه الأدوية.

چيوتريف من الممكن أن يزيد من كمية الأدوية الأخرى في دمك. من الممكن أن تكون هذه الأدوية، ولكن ليس فقط:

- سولفاسلين – لمعالجة الالتهاب أو العدوى.
- روزوقداستاتين – لخفض مستوى الكوليسترول.

يجب إعلام الطبيب إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية مع چيوتريف.

الحمل، الإرضاع والخصوصية

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، ظننت أنك حملت أو تخططين لحمل، يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بهذا الدواء. امتنعي عن الحمل خلال العلاج بـ چيوتريف. إذا كانت هناك إمكانية لأن تحمل، استعمل وسائل منع حمل آمنة أثناء العلاج، وشهر – على الأقل – بعد تناول الجرعة الأخيرة من چيوتريف؛ لأن هناك خطراً لإلحاق الضرر بالجنين.

يجب أن تعلمي الطبيب، فوراً، إذا حملت خلال العلاج. سينجز الطبيب إما مواصلة العلاج أو إيقافه.

إذا كنت تنوين أن تحمل في بعد تناول الجرعة الأخيرة من الدواء فاستشيري الطبيب؛ لأنه من المحتمل لا يكون الدواء قد أفرز من جسمك بشكل تام.

يُمنع الإرضاع خلال العلاج؛ لأنه لا يمكن نفي خطر إلحاق الضرر بطفلك.

السيادة واستعمال الماكينات

إذا تعرّضت لأعراض سبب العلاج التي توثر على نظرك (مثل تبيّغ بالعين، جفاف العينين، سيلان الدمع، الحساسية للضوء) أو على قدرتك على الترکيز وردّ الفعل، يُفضل ألا تسوق أو أن تشغل ماكينات، إلى أن تزول هذه الأعراض (أنظر البند 4 - "الأعراض الجانبية").

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء
يحتوي الدواء على سكر اسمه لاكتوز. إذا كنت حساساً لسكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب، دائمًا. يجب عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحدّهما طبيبك، فقط. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة استعمال الدواء

- من المهم تناول القرص على معدة فارغة.
- يجب تناول القرص قبل الوجبة بساعة، على الأقل أو إذا كنت قد أكلت، يجب الانتظار 3 ساعات على الأقل، قبل تناول القرص.
- يجب تناول قرص واحد مرتة في اليوم. يجب الحرص على تناول الدواء في ساعة ثابتة كل يوم، فهكذا من الأسهل تذكر تناول هذا الدواء.
- يُمنع كسر، مضغ، أو سحق القرص.

- يجب بلع القرص كاملاً مع كأس ماء.

قرص چيوريف مُعد للبلع. إذا كنت تستصعب بلع القرص كاملاً، ممكن إذابته بكأس مع ماء. تمنع إذابة القرص بسائل آخر غير الماء. قم باللقاء القرص الكامل في كأس مع ماء من دون كسره أو سحقه، قم بالخلط من مرة إلى أخرى، وليس أكثر من 15 دقيقة، إلى أن ينفك القرص لأجزاء صغيرة. اشرب القرص فوراً. وبعد ذلك، قم بملء الكأس بالماء مرة أخرى، واترك، لتتأكد من أنه قد تم تناول الدواء كله. إذا لم تكن قادرًا على البلع ولديك أنواع تغذية، من المحتمل أن يوصيك الطبيب بتناول الدواء عن طريق الأنوب.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى يجب عليك، فوراً، الاتصال بالطبيب. من المحتمل أن تعاني المزيد من الأعراض الجانبية، وسيقرر الطبيب وقف العلاج ويسوّضي بعلاج داعم.
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فنوجة، فوراً، إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء مكع.

إذا نسيت تناول الدواء،

- إذا كان موعد تناول الجرعة التالية بعد أكثر من 8 ساعات، تناول الجرعة في اللحظة التي تذكرت فيها.
 - إذا كان موعد تناول الجرعة التالية خلال أقل من 8 ساعات، تجاوز الجرعة المناسبة وتناول الجرعة التالية في وقتها المحدد. يجب الاستمرار في تناول الأقراص كالعادة.
- يُمنع تناول جر عين معاً للتعويض عن جرعة مناسبة.

إذا توقفت عن تناول الدواء،

يُمنع التوقف عن استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب. من المهم الاستمرار بتناول الدواء حسب توصية الطبيب. إذا لم تأخذ الدواء حسب تعليمات الطبيب، فقد يتضخم السرطان لديك مرة أخرى.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسلمة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال چيوريف أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتصد عن قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

يجب التوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية الخطيرة التالية. في حالات معينة من المحتمل أن يُضرر الطبيب إلى أن يفلل لك جرعة چيوريف، أن يوقف العلاج لفترة، أو أن يوقفه نهائيًا:

- الإسهال (شائع جداً)، ممكن أن يظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين (10)

الإسهال الذي يستمر أكثر من يومين أو إسهال أسوأ من ذلك بكثير من الممكن أن يؤدي إلى فقدان السوائل (شائع)، إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم (شائع)، وإلى تراجع عمل الكليتين (شائع). الإسهال قابل للعلاج. فور ظهور العلامات الأولى يجب تناول الكثير من السوائل. يجب التوجّه، فوراً، إلى الطبيب، والحصول على علاج مناسب مضاد للإسهال، في أسرع وقت ممكن. يجب أن يكون في حزتك دواء لمعالجة الإسهال قبل بدء العلاج بچيوريف.

- الطفح الجلدي (شائع جداً)، ممكن أن يظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين (10)

من المهم معالجة الطفح مبكراً الذي ظهر. يجب تبليغ الطبيب إذا ظهر طفح. إذا لم تكن معالجة الطفح مجده وتفاقمت حالة الطفح (مثلًا إذا تفاقر الجلد أو ظهرت بثور)، يجب أن تستشير الطبيب فوراً، لأنّه من المحتمل أن يقرر الطبيب وقف العلاج بچيوريف. من الممكن أن يظهر الطفح أو أن يتفاقم في المناطق المكشوفة للشمس. يوصى بأن تحمي نفسك من الشمس بوساطة كريم حماية وملابس مناسبة.

- التهاب الرئة (غير شائع، ممكن أن يظهر لدى حتى مستخدم واحد من بين (100)

يُسمى مرض الرئة الخلالي. يجب تبليغ الطبيب فور التطور أو التفاقم المفاجئ لضيق التنفس، الذي من الممكن أن يكون مصحوباً بارتفاع درجة الحرارة أو السعال.

- تهيج أو التهاب في العينين

تهيج أو التهاب في العينين (التهاب الملتحمة شائع والتهاب القرنية غير شائع). يجب تبليغ الطبيب إذا تطورت أو تفاقمت، فجأة، أعراض العين؛ مثل الألم، عينان حمراوتان أو جاقنان.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً (ممكن أن تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين 10):

- قرح وتهابات في الفم
- التهاب في الأطراف
- تراجع الشهية
- النزيف من الأنف
- غثيان
- نقيبات
- جفاف وحكة في الجلد

أعراض جانبية شائعة (ممكن أن تظهر لدى 10 – 100 مستخدمين من بين 100):

- آلم، احمرار، انتفاخ أو تفترس الجلد في الكفين والساقيين

Giotrif	Proposed Patient Information
Film coated tablets 20mg, 30mg, 40mg, 50mg	December 2019

- ارتفاع في مستويات إنزيمات الكبد في فحوصات الدم
- التهاب المثانة المصحوب بالحرقة أثناء التبول، وال الحاجة المتواترة والطارئة للتبول
- شعور غير اعتيادي في المذاق
- آلام البطن، مشاكل الهضم، الحرقة
- التهاب الشفرين
- انخفاض الوزن
- الرشح
- انقباضات العضلات
- الحرارة
- مشاكل في الأظافر

أعراض جانبية غير شائعة (ممكن أن تظهر لدى 1 – 10 مستخدمين من بين 1,000):

- التهاب في البنكرياس
- ظهور تمزق في المعدة أو في الأمعاء (تنقب جهاز الهضم)

أعراض جانبية نادرة (ممكن أن تظهر لدى مستخدم واحد من بين 1,000):

- حالة خطيرة من بثور في الجلد أو تفشر الجلد (ممكن أن يرمز إلى متلازمة ستيفنز - جونسون وتفشر الأنسجة المتموّلة البشروية التسمّي toxic epidermal necrolysis).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترنت للتبلغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

تحتّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي و المجال روبي الأولاد وأو الأطفال، وهذا تجنب التسمّم. لا تسبّب التفّقّف بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على علبة الكرتون وعلبة شريط (بليستر) الدواء. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسّب إلى اليوم الأخير في الشهير ذاته.
شروط التخزين
يجب الخزن في درجة حرارة الغرفة (أقل من 25°C)، وفي العلبة الأصلية لحفظ من الرطوبة والضوء.
بعد فتح غلاف الشريط (بليستر) لأول مرة يجب استعمال الأقراص بعلبة الشريط خلال 14 يوم.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضًا:

Lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, silica colloidal anhydrous, crospovidone, magnesium stearate, hypromellose 2910, macrogol 400, titanium dioxide, talc, polysorbate 80.

مادة إضافية الموجودة في چيوتريف 30 ملغ، چيوتريف 40 ملغ وچيوتريف 50 ملغ:
Indigo carmine aluminium lake.

كلّ قرص من چيوتريف 20 ملغ يحتوي نحو 124 ملغ لاكتوز.
كلّ قرص من چيوتريف 30 ملغ يحتوي نحو 186 ملغ لاكتوز.
كلّ قرص من چيوتريف 40 ملغ يحتوي نحو 248 ملغ لاكتوز.
كلّ قرص من چيوتريف 50 ملغ يحتوي نحو 310 ملغ لاكتوز.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العلبة:

- أقراص چيوتريف 20 ملغ: أقراص مغلفة، مستدير، محدبة من جانبها، بلون أبيض حتى ضارب إلى الأصفر، مختومة على أحد جانبيها بـ "T20"، وعلى جانبها الآخر بعلامة شركة بورنجر إنجلهالم.
- أقراص چيوتريف 30 ملغ: أقراص مغلفة، مستدير، محدبة من جانبها، بلون أزرق داكن، مختومة على أحد جانبيها بـ "T30"، وعلى جانبها الآخر بعلامة شركة بورنجر إنجلهالم.
- أقراص چيوتريف 40 ملغ: أقراص مغلفة، مستدير، محدبة من جانبها، بلون أزرق فاتح، مختومة على أحد جانبيها بـ "T40"، وعلى جانبها الآخر بعلامة شركة بورنجر إنجلهالم.

Giotrif	Proposed Patient Information
Film coated tablets 20mg, 30mg, 40mg, 50mg	December 2019

- أقراص چيورتيف 50 ملغ: أقراص مغلفة، ببضاوية الشكل، محببة من جانبيها، بلون أزرق داكن، مختومة على أحد جانبيها بـ "T50"، وعلى جانبيها الآخر بعلامة شركة بورنچير إنجلهaim.
- 7 أقراص في كل بليستر، ممزودة مع ممتص رطوبة داخل رزمة الومنيوم. يُمنع بلع ممتص الرطوبة.
- المجموع 7 ، 14 ، أو 28 قرصاً في علبة الكرتون.
- قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

المنتج: بورنچير إنجلهaim فارما، إنجلهaim إم راين، ألمانيا

صاحب التسجيل والمستورد: بورنچير إنجلهaim إسرائيل.م.ض.، مدينات هيبوديم 89، ص.ب. 4124، هرتسليا بيتواخ 4676672

تم فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ كانون الأول 2016، وتم تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة في تاريخ كانون الأول 2019.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

چيورتيف أقراص مغلفة 20 ملغ	151-47-33984
چيورتيف أقراص مغلفة 30 ملغ	151-48-33986
چيورتيف أقراص مغلفة 40 ملغ	151-49-33987
چيورتيف أقراص مغلفة 50 ملغ	151-50-33988

لتيسير قراءة هذه النشرة وتسييلها ورد النص بصيغة المذكر، ومع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.