

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירים) התשמ"א - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

כלוראפרפ עם גוון

הרכב:

חומרים פעילים

כלורהקסידין גליקונאט 20 מ"ג/מ"ל ואיזופロפיל אלכוהול 0.70 מ"ל/מ"ל.

Chlorhexidine gluconate 20 mg/ml and isopropyl alcohol 0.70 ml/ml.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר זה על פי ההוראות בסעיף המינון בעalon זה. היועץ ברוקח אם הנר זקוק למידע נוסף.
עליך לפנות לרופא במידה ותשמעני המחלת מחמירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

התכשיר הרפואי מיועד לשימוש עבור חיטוי העור לפני פרוצדורות רפואיות חודרניות.
קבוצה רפואיית: כלורהקסידין, שילובים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לכלורהקסידין גליקונאט או לכל אחד מהמרכיבים הננספים של כלוראפרפ עם גוון.
במיוחד אם יש לך היסטוריה של תגובות אלרגיות הקשורות לכלורהקסידין (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
כלוראפרפ עם גוון הוא לשימוש חיצוני בלבד.

אין להשתמש בכלוראפרפ עם גוון:

- ליד העיניים או ריריות עדינות (מברננות מוקזחות), היוות זהה עלול לגרום לגירוי.
אם הוא נכנס לעין או לריריות העדינות במעבר הגוף, יש לשטוף במהירות עם הרבה מים.
- על פצעים פתוחים בעור.
- על החלק באוזן הנמצא בתוך הגוף (האוזן התיכונה).
- במגע ישיר עם רקמה עצבית (לדוגמה רקמת מוח או רקמת חוט שדרה).

כלוראפרפ עם גוון עלול במקרים נדירים לגרום לתגובות אלרגיות חמורות, המובילות לנפילה בלחץ הדם ואף לאייפוד ההכרה. תסמים מוקדמים לתגובה אלרגית חמורה עשויים להיות פריחה עורית או אסתמה. אם אתה מבחן בתסמים אלו, הפסיק להשתמש בכלוראפרפ עם גוון ונפנה לרופא שלא בהקדם האפשרי (ראה תחת סעיף 4: "תופעות לוואי").

יש למרוח כלוראפרפ עם גוון על העור בעדינות בלבד. כאשר התמיסה נמרהת באופן נמרץ מדי על עור שבירי מאד או עור רגish, או לאחר שימוש חזוז; פריחה, דלקת, גרד, יובש /או עור קשקיי וכאוב עלולים להופיע.
עם הסימן הראשון לאחת מהתגובהות האלו, יש להפסיק את המריחה של כלוראפרפ עם גוון.

יש להימנע מ מגע ממושך עם העור.

חומרים ספוגים, כמו כיסויים או חלוקים יש להסיר לפני השימוש. אין לתת לתמיisa להצבר.

התמיisa דליה. אין להשתמש במקורות הצתה עד שהעור יבש לחלוטין.

ילדים

יש להשתמש בצהירות ביילודים, במיוחד בפגים. כלוראפרפ עם גוון עשוי לגרום לכויות כימיות בעור.

איןטראקטזיות/תגובה בין תרופה וכלוראפרפ עם גוון:

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר לרופא או לרוקח.

ספר לרופא או לאחות אם קיבלת לאחרונה חיסון או זריקת תבחן עור (תבחן מטלית המשמש לאבחן אלרגיות [patch test].)

הרין, הנקה ופוריות

אין מחקרים של כלוראפרפ עם גוון בנשים הרות או מניקות.

הרין לא צפויות השפעות במהלך הרין היה והחסיפה הסיסטמית לכלורהקסידין גלווננט היא זניחה. ניתן להשתמש בכלוראפרפ עם גוון במהלך הרין.

הנקה לא צפויות השפעות על היילוד/תינוק היה והחסיפה הסיסטמית של האישה המnika לכלורהקסידין גלווננט היא זניחה.

ניתן להשתמש בכלוראפרפ עם גוון בזמן הנקה.

פוריות ההשפעות של כלורהקסידין גלווננט על פוריות האדם לא נחקרו.

נהיגה ושימוש במכונות
ל-ChloroPrep עם גוון אין השפעה או השפעה זניחה על היכולת לנוהג ולהשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
חומר צבע צהוב סנסט (E110) עשוי לגרום לתגובות אלרגיות.

3. כיצד להשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח לגבי המינון ואופן הטיפול בתכשיר.

התמיisa האנטי-ספטית בתוך מערכת כלוראפרפ עם גוון נשמרת בתוך האפליקטור הפלסטי. הרופא שלך או האחות יבחרו את גודל האפליקטור בהתאם על אזור הפרוץורה והשיטה שיש לכסות. הרופא שלך או האחות שלך ישפשו את הסpong בעדינות על גבי העור שלך לכיסוי שטח העור שיש להכין. כתולות בפרוץורה הרפואית שלך, יתכן שימוש ביוטר אפליקטור אחד.
כלוראפרפ עם גוון הוא לשימוש על העור בלבד ובכל אפליקטור משתמש רק פעם אחת.

אם יש לך שאלות נוספות לגבי השימוש בתכשיר זה, שאל את הרופא שלך או האחות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין ליטול תרופות בחושרי בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפים אם הנר זיכון להם.

אם יש לך שאלות נוספת כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה זו, היועץ ברופא או באחות שלך או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בכלוראפרפ עם גוון עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחד מהן.

אם אתה חוות אחת מהתגובהות הבאות, הפסיק להשתמש בכלוראפרפ עם גוון ופנה לעזרה רפואי מידית: התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או האגרון; פריחה עורית אדומה מגדרת; צפוזים או קשיי נשימה;

הרגשת עליפון וochrohorat; טעם מתכתי מזרק בפה; התמוטטות. יתכן שאתה חווית תגובה אלרגית. אם אתה מפתח פריחה או שעורך הופך מגרד, כאב, אדום, שלפוחית, יש או מודלק באזור בו השתמש בתכשיר שתיפת של העור, הפסיק להשתמש בכלוראפרפם עם גוון ושותח עם הרופא שלך או הרוקח.

תופעות לוויי נדירות מאוד - תופעות שמאפיינן בפחות משתמש אחד מתוך 10,000:
תגובהות עוריות של אלרגיה או גירוי למרכיבים בכלוראפרפ עם גוון (קלורהקסידין גליקונאט, איזופרופיל אלכוהול והצבע הצעוב סנסט (E110)) דוחו.

תופעות לוואי בשכיחות לא ידועה (שכיחותן טרם נקבעה):
גירוי בעיניהם, כאב, ראייה לקויה, כוויות כימיות, פגיעה בעיניים, כוויות בעור בילודים/תינוקות.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעлон זה, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוחות לוזאי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוזאי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המופיע להידוח על תופעות לוזאי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. כיצד לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים
או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת.
אל תגרום להתקאה ללא חוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתפקיד אחריך תאריך התפוגה (exp.) המופיע על גבי התווית או הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחזרו של אותו חודש.

תרופה זו אינה דורשת תנאי אחסון מיוחדים כלשהם. מומלץ לאחסן בטמפרטורת החדר. יש לאחסן באזינה המקורית; האפליקטור סטרילי אלא אם הסוגר שבור.

מנע חשיפה של המצלם ותכלתו להבאות פתוחות במהלך השימוש. האחסון והפינוי.

אין להשליך תרופות לביב או לאשפָה הביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות שאינן משתמש בהן עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נזוף

גוסף על החומרים הפעילים, התרפופה מכילה גם:

Purified water, Sunset Yellow (E110).

כיצד נראה הת蘗פה ותוכן הארץ:

האפליקטורים של 3 מ"ל ושל 10.5 מ"ל מורכבים מספג' קצף עגול, ללא לטקס, המחבר לגליל פלסטי אשר נושא אמפולת זכוכית המכילה את התמיסה האנטיספטית.

האפליקטור של 26 מ"ל מורכב מספג קצף מרובע, ללא לטקס, המחבר לגליל פלסטי אשר נשא שתי אמפולות זכוכית המכילות את התמיסה האנטיספטית.

האפקטורים הסטריליים ארוזים כל אחד בנפרד בעטיפה שקופה.

גודל אריזה:

3 מ"ל: אפליקטור 1 או 25 אפליקטורים
10.5 מ"ל: אפליקטור 1 או 25 אפליקטורים

26 מ"ל: אפליקטור 1
יתכן ולא כל גDALי האזינה משוקקים.

בעל הרישום וכתובתו:
בקטון דיקינסון (BD) ישראל בע"מ, רחוב הרדוֹף הנחלים 2, קיסריה, ישראל

היצן וכתובתו:

CareFusion 213 LLC. 1550 Northwestern Drive – El Paso, Texas 79912 – USA
קארפיזון 213 LLC 1550 נורת'ווסטרן דרייב - אל פאסו, טקסס 79912 – ארה"ב

אישור במרץ 2023

**מספר רישום התרכופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
כלוראפרפ עם גוון: 172-48-36417-00**

לשם הפשטות ולהקלת הקရיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרכופה מיועדת לבני שני המינים.

המידע הבא מיועד לאנשי צוות רפואי בלבד:

הנחיות לשימוש באפליקטורים של כלוראפרפ עם גוון:

- לשימוש על העור. לשימוש חיצוני בלבד.
- הוציא את האפליקטור מהעתיפה ואחוז בו כשהסתפג פונה מטה.
- לחץ על האפליקטור **פעם אחת בלבד**:
 - בתכשיר בנפח 26 מ"ל; לחץ את המנווף על הידית
 - בתכשירים אחרים; לחץ את הכנפיים
- אין לחזור ולמעור או לפטוף את הכנפיים שוב ושוב בניסיון להאיץ את הרויה של הספגוג.
- לחץ בעדינות את הספגוג כנגד עור המטופל על מנת למרוח את התמיישה האנטיספטית. כאשר ניתן לראות את התמיישה על העור, השתמש בתנודות עדינות הלאך ושוב להכנות האзор במשך 30 דקות.
- האפליקטור של התכשיר בנפח 26 מ"ל כולל שני מקלוני מטושים. נקה את כל הטבור בעזרת המטושים המצויפים בעת הצורך (הרטב את המטושים על ידי לחיצתם כנגד ספגוג האפליקטור הספגוג בתמיישה).
- אפשר לאзор המרוח להתיבש לחלוtin באוויר.
ניתן להשאר כלוראפרפ עם גוון על העור לאחר הפרוצדורה.

אזוריםCisco מקסימליים:

3 מ"ל:	ס"מ 15 ס"מ x 15 ס"מ
10.5 מ"ל:	ס"מ 25 ס"מ x 30 ס"מ
26 מ"ל:	ס"מ 50 ס"מ x 50 ס"מ

אמצעי זהירות לשימוש:

- הנה לכלוראפרפ עם גוון להתיבש לחלוtin לפני התחלת פרוצדורה רפואית כלשהי. אל תבצע פרוצדורות של צריבה באמצעות דרום חשמל (electrocautery) עד אשר העור יבש לחלוtin. אל תשתמש בכמויות מופרזות ואל תאפשר לתמיישה להציג בכפל עור או מתחת למטופל או לטפטף על סדיןאים או חומראים אחרים בmagic ישר עם המטופל.

- השתמש בהירות בילדיים, במיוחד אלו אשר נולדו לפני שבוע 32 של ההריון ובמהלך השבועיים הראשונים לחייהם. קלוראפרפ עם גoon עלול לגרום לכוכיות כימיות בעור.
- אל תשמש ליד העיניים או קרומיים ריריים, היות זה יכול לגרום לגירוי, גירוי בעיניים, כאב, ראייה לקויה, כוכיות כימיות ופגיעה בעיניים. אם התמייסה.cn נכנסת לעין או לקרומיים ריריים, יש לשטוף אותה במהירות עם הרבה מים.
- אל תשמש על פצעים פתוחים בעור, על עור שבור או פגוע.
- אסור שכלהרפרפ עם גoon יבוא במגע עם רקמות עצביות או האוזן התיכונה.
- כלורהקסידין אינו מתאים עם סבון וחומרים אণוניים אחרים.
- אלכוהול לא צריך לבוא במגע עם חיסונים ותבחנים עוריים (patch tests) מסויימים. אם יש ספק, הייעוץ בספרות של יצרך החיסון.
- אל תמרח את התמייסה באופן נמרץ מדי על עור שבר מאוד או עור רגish. לאחר שימוש חוזר עשויה להופיע תגובה עורית מקומית, כולל: אריתמה או דלקת, גרד, עור יבש ו/או קששי וכאב מקומי באזור המריחה. הפסק את המריחה של קלוראפרפ עם גoon עם הסימן הראשון של תגובה עורית מקומית.
- אל תשמש במטופלים אם ידועה רגשות יתר לתמייסת קלוראפרפ עם גoon או לכל אחד ממרכיביה, במיוחד עם היסטוריה של תגובות אלרגיות אפשריות הקשורות לכלהרפהקסידין. תכשירים המכילים כלורהקסידין הם גורמים ידועים לתגובות אנafilקטיות במהלך הדרמה. אם מתגלים תס敏ים של תגובה אנafilקטית במהלך הדרמה (כגון נפילה חרדה בלחץ הדם, סרףדת, אנטיאדרמה), יש לשקול תגובה אלרגית לכלהרפהקסידין.
- יש לנוקוט באמצעות זהירות מיוחדות על מנת למנוע חשיפה של מטופלים לכל תכשיר אחר המכיל כלורהקסידין במהלך הטיפול.

אמצעי זהירות מיוחדים לפינוי

התמייסה היא דלקת. אל תשמש בזמן עישון או ליד להבה פתוחה או מקורות חום חזקים. מנע חשיפה של המכל ותוכלו להבה פתוחה במהלך השימוש, האחסון והפינוי. לאחר השימוש, השלים את האפליקטור לפי הנוהלים לאשפזה רפואי.

אני פנה לעלון לרופא (Summary of Product Characteristics) של קלוראפרפ עם גoon מידע מפורט נספ.