

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקנירים) התשמ"ז-1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ברוטיזולאם טבע 0.25 מ"ג
טבליות

הרכב:

כל טבלייה מכילה:
ברוטיזולאם 0.25 מ"ג
(Brotizolam 0.25 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול בעבר אל תעביר אותה לאחרים בשום מקרה. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

הקדמה

תרופה זו שייכת לקבוצת הבנזודיאזפינים, שלא תכונות מייחודות המחייבות זהירות רבה בשימוש בה.

יש חשיבות רבה בancock רפואי צמוד עם נטילת התרופה זו. כאשר אתה נוטל התרופה זו הקפד לפנות לרופא לאחר-שבועיים, כיוון שהטיפול נדרש לתקופות זמן קצרות בלבד.
שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לך להשפעת התרופה הפחתה. שימוש ממושך עלול לגרום לתופעה קשה של תלות, אשר תנסה על החוליה להפסיק ליטול את התרופה וכן יש להפסיק בהדרגה את נטילת התרופה, על פי הוראות הרופא.
הפסקת טיפול בלתי מבוקרת עלולה להיות מלאה בתופעות גמילה כגון: מתח, עצבנות, הבלבול, רעד, נדוזי שינה, כאבי בטן, הקאות, בחילות, זיעה, עויתות, התכווצויות וכאבי שרירים.
לעתים, שימוש ממושך בתרופה זו עלול לגרום לשינויים בדפוסי התנהגות ומחשבות טורדיות.
במיוחד אצל קשישים: מומלץ להשמר בעת ההליכה כיוון שהתרופה פוגמת בערות ועתים בהתאם לתנאים הגוף ועל כן יש חשש למעידות או נפילות.

נטילת התרופה זו עם תרופות ממשפחת האופיאידים, תרופות אחרות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית (כולל סמים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחשות ישנות עמוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימתה), תרדמת ומוות.

1. למה מיועדת התרופה?

لتreatment בעיות שינה.

קבוצה Terapeutic

שייך לקבוצת הבנזודיאזפינים.
התרופה אינה מטפלת בגין הפרעות השינה

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל, לבנזודיאזפינים אחרים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל הৎכשיר (לרשימה המרכיבים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6).
- את בהירון או מניקה.
- אתה סובל מאי ספייה נשימתית חמורה, מתסמנות דום נשימה בשינה (sleep apnea), Mai ספיקת כבד חמורה, ממיאסטניה גרביס שהיא מחלת המתבטאת בחולשת שרירים.
- אתה סובל או סבלת בעבר מחלות בתרופות, סמים לא חוקיים או אלכוהול.
- אתה סובל מהרעלת אלכוהול, כדורי שינה, משככי כאבים אופיאידים או תרופות פסיציאטריות (כגון תרופות אנטיפסיכוטיות, נגד דיכאון, ליתום).
- אין להשתמש בתרופה ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

ازהרות מיוחדת הנוגעת לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בברוטיזולאם טבע ספר לרופא אם :

- אתה משתמש או השתמש לרעה בעבר באלכוהול, סמים לא חוקיים ותרופות.
- אתה כבר מטופל בברוטיזולאם טبع
- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת הנשימה, הכבד. במקרים כאלה יתכן והרופא ימליץ על מינון מופחת.
- אתה סובל או סבלת בעבר מדיכאון או מחשבות אובדןיות.
- אתה רגש לזמן כלשהו או לתרופה כלשהי

ازהרות נוספת

- שימוש ממושך עלול לגרום לתלות פיסית ופסיכולוגית! הסיכון לתלות בתרופה עולה עם העליה במינון וממשך הטיפול. אך הרופא ינחה אותך להשתמש בתרופה לתקופה קצרה ככל האפשר ואך עשו לקיים פגישות מעקב תקופתיות. ניתן לזרות תלות פסיכולוגית כאשר אתה מגיע במצב שאתה לא רוצה להפסיק את השימוש בתרופה. במידה וקייםת תלות פיסית בתרופה, הפסקה פתאומית תלווה בתסמיני גמילה (ראה סעיף 3 - "אם אתה מספיק את נטילת התרופה") בנסף, הסיכון לפתח תלות גבוהה יותר במטופלים המשמשים או השתמשו לרעה בעבר בתרופות או אלכוהול (ראה סעיף 3 - "אם אתה מספיק את נטילת התרופה")
- אתה עלול לחוות שכחה במהלך הטיפול בתרופה. התופעה בדרך כלל מתרחשת כמה שעות לאחר נטילת התרופה. אנא פנה לרופא אם אתה חוות תופעה זו.
- אם אתה סובל מפסיכזה (מחלה פסיכיאטרית חמורה המשפיעה על ההתנהגות והשליטה עצמית), ברוטיזולאם טبع אינה מתאימה לך.
- אם אתה סובל מדיכאון חמוץ או חרדה עם אירועי דיכאון חמור, טיפול בברוטיזולאם טبع עלול להגדיל את הסיכון לפתח מחשבות על פגיעה עצמית או מחשבות אובדןיות. יש להיוועץ ברופא לפני הטיפול בתרופה. הרופא יבצע מעקב צמוד במהלך הטיפול בברוטיזולאם טبع. בכל פעם שמחשבות אלו עלות, פנה מיד לרופא או לבית החולים.
- אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא.
- נטילה יומיומית במשך מספר שבועות עלולה לגרום לירידה בעילול התכשיר.
- לברוטיזולאם טبع השפעה מרפה שרירים, אשר עלולה להגדיל את הסיכון לנפילות. יש להשתמש בזיהורות בקשישים.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופות

אם אתה לוקח, או אם لكחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במידות ייש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח את התרופות הבאות (יש לציין כי הראשה שלhalten מצינית את החומרים הפעילים בתרופות. אם אין בטוח האם אתה משתמש באחת מהתרופות הללו אנא התנייע עם הרופא או הרוקח):

- תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, תרופות נוגדות דיכאון או חרדה, תרופות אנטיפסיכטיביות, תרופות לטיפול באפילפסיה, אנט-היסטמינים מסוימים, חומר הרדמה משככי כאבים נורקוטיים) – שימוש בתרופות אלו במהלך הטיפול בברוטיזולאם טبع עלול לגרום לדיכוי מוגבר של מערכת העצבים המרכזית.
- אופיאידים (משככי כאבים חזקים, תחלפי סם ותרופות מסוימות לשיעול) – שימוש בו בזמןן עם ברוטיזולאם טبع מעלה את הסיכון לישנוניות, קשיי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ואף מוות. לכן יש לשקל מתן אופיאידים עם ברוטיזולאם טبع רק כאשר אין אפשרות טיפול אחרות. אם הרופא מנהה אותך לקחת בברוטיזולאם טبع עם אופיאידים, הוא עשוי להגביל את המינון ומשך הטיפול. ספר לרופא אם אתה נוטל תרופות המכילות אופיאידים והיצמד להמלצות הרופא. אם אתה מבחן באחד מן התסמים, פנה מיד לרופא.
- משככי כאבים חזקים מקבוצת האופיאידים. שימוש בו בזמןן עם ברוטיזולאם טبع עלול להגבר את תחושת האופוריה ולהאייך תלוות.
- תרופות להרפיה שרירים – בשילוב עם ברוטיזולאם טبع תיתכן עליה בהשפעה המרפה שרירים תרופות לטיפול בסוכרת ולחץ דם גבוה, תרופות לטיפול בעבויות לב (כגון דיאגוסטן), הורמוניים – יש להיזהר בשימוש בתרופות אלה בשילוב עם ברוטיזולאם טبع משום שתיתכן השפעה הדדיות.
- התרופות הבאות עלולות לגרום לעלייה בהשפעת ברוטיזולאם טبع: תרופות נגד פטריות מקבוצת האזולים (כגון איטרקונאזול, קווטקונאזול), אנטיביוטיקה מקבוצת המקרולידים (כגון קלריטרומיצין), אրיתромיצין, מעכבי פרוטאז (כגון אינדיאנביר, נלפיניר, ריטונאביר), סימטידין, אסטמיוזיל, מדכאי מערכת החיסון (כגון ציקלוספורין, סירולימוס, טקרולימוס), חוסמי תעולות סייד', תרופות נגד מלריה כגון מפלוקוין והלפונטرين, מיזוזיאם, פ'יזוז, סילדנafil, תרופות להורדת כולסטרול מקבוצת הסטטינים (כגון אטוריובסטטין, לובוסטטין, סימבוסטטין), סטרואידים (כגון אנתניל אסטרדיול), טומוקסיפן, טרפנדין).

- התורפות הבאות עלולות לגרום לירידה בהשפעת ברוטיזולאם טבע: קרבמזהין, אפאבירנה, St. John's Wort (היפריקום), ניראפיין, פנובריביטאל, פנטואין, פרימידון, ריפאבטין, ריפאמפיצין.

שימוש בתרופה ומדוזן

- יש ליטול את התרופה על קיבת ריקה.
- אין לשות מיץ אשכולות בעת הטיפול.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשותות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה. שימוש באלכוהול בעת הטיפול בברוטיזולאם טבע עלול לגרום בין השאר לדכיה/טשטוש, ישוניות ופגיעה ברכיש.

הירין הנקה ופוריות

אל תשתמשי בתרופה כאשר הירין או מניקה. תינוקות הנולדים לאמונות שנתיו בבחודאייפנים במשך תקופה ממושכת במהלך ההריון עלולים לפתח תלות פיסית. ילדים אלה הראו תסמיini גמילה בתקופה שלאחר הלידה. כמו כן, במקרים רבים בשלב הירין מתקדמים ובஸמך לילדיה יתכן דיכוי נשימתי בילדים. קיים סיכון נמוך לפגיעה בהתפתחות העובר בשימוש בבחודאייפנים בשלב הירין מוקדמים. אם את בהריון, מתכנתת הירין, או חושדת שאת בהריון, יש לפנות לרופא. אין מודיע קליני על השפעות התרופה על הפוריות.

שימוש בילדים וمتבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים (לא נחקרו עילויות ובטיוחות בקבוצת אוכלוסייה זו).

שימוש בקשישים, חולים תשושים, חולים עם בעיות בתפקוד הכלבי או חולים עם אי ספיקת נשימתי

קובוצה זו עלולה להיות רגישה יותר להשפעות התרופה וכן יש להשתמש בזיהירות ובמיןון מופחת. בין השפעות התרופה, במיוחד בקשישים, נכללת עלייה בסיכון לנפילות כתוצאה מהרפיה שרירים (ראה "הקדמה").

נהיגה ושימוש במכוונות

תרופה זו עלולה להשפיע על התగותתיות, גם בשימוש בהתאם להוראת הרופא, ובכך לפגוע ביכולת נהוג ולהפעיל מכונות. השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות, ביכולת הרכיב ותפקוד השירים (במיוחד כאשר משך השינה אינם מספיק או בשילוב עם תרופות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית או בשילוב עם אלטוהול). במידה אתה חש בתופעות כגון אלה שפורטו, אין נהוג או להפעיל מכונות. בכל מקרה יש לנתקות זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המכ"ב ערנות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
ברוטיזולאם טבע מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך סבירותם מסוימים, שוחח עם הרופא שלך לפני נטילת התרופה.
תרופה זו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד השתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח. המיןן ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המיןן המקובל בדרך כלל הוא:
חצי טבליה עד טבליה אחת (לפי החלטת הרופא), לפני השינה.

אין לעבור בשום אופן על המנה המומלצת

אין מידע בנוגע לכטישה או לעיסה של הטבליות. יש לבלווע את התרופה עם מים.
ניתן להחזות את הטבלייה על פי קוו החזיה המסומן.
התכשיר אינם מיועד למtanת תה-לשוני.

יש להקפיד על שינה של לפחות 7 שעות לאחר נטילת התרופה, על מנת שהתקוד לאחר היקיצה יהיה תקין (ראה גם סעיף "נהיגה ושימוש במכוונות").

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר: אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד לצד מנת התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

תסמנין מינון יתר עשויים לכלול נמנום, בלבול, עייפות. במקרים חמורים עלולים להופיע ליקויים בקואורדינציה, ירידה במתוח שריריים, תחת לחץ דם, דיכי נשימתי, קומה (נדיר) ומומות (נדיר מאוד).

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצר יש ליטול את המנה הבאה כרגע; אין צורך "לפצות" על מנת שנשכח ובסום אופן אין ליטול שתי מנות בלבד. אם נטלה בטיעות מנה כפולה, יש לפנות לרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה: גם אם חל שיפור במצבך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה בהתאם לתואמת ללא התייעצות עם הרופא. הוראה זו חשובה במיוחד לטרופה כמו ברוטיזולאם טבע (ראה "הקדמה").

- לעתים לאחר הפסקת התרופה עלולה להיגרם בהתחלה חזרה או החמרה של בעיות השינה וכן במקרים נדירים חוסר מנוחה, שינויים במצב הרוח, חרדה ומתח. הסיכון לכך גבוה יותר בהפסקת טיפול רפואית מוגנת או בהורדת מינון לתואמת.
- כמו כן יתכנו תופעות גמilia לאחר הפסקה לתואמת של התרופה (במיוחד אם התפתחה תלות בתרופה) כגון: כאבי ראש, כאבי שרירים, חרדה קייזונית, מתח, בעיות שינה, חוסר מנוחה, בלבול, עצבנות. במקרים חמורים ניתן תפיסת מציאות מוטעית, שינויים באישיות, חוסר תחושה ועקצוץ בידים וברגליים, רגשות יתר לאור, רعش ומגען הדיזיות, התקפים אפילפטיים. תופעות אלה עלולות לקרות גם מספר ימים לאחר הפסקת התרופה. אנא הייעץ ברופא אם אתה חווית תופעות הגמilia הללו.
- לפיכך, הרופא יוריד בהדרגה את מינון התרופה בסיום הטיפול. הירידה בהדרגה תותאם למטופל באופן אישי משומש שהוא תלויה במספר גורמים (למשל משך הטיפול והמנה היומית). אנא הייעץ ברופא כיצד להוריד את המינון.
- אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתהzekok להם.
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעץ ברופא או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בברוטיזולאם טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. בהופיע תופעות לוואי או אם תופעות הלואוי אינן חולפות או שהן מתרידות או שהן חמימות, יש להתייעץ עם הרופא. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם מופיעות תופעות הלואוי הבאות:

תגובהות פרדוקסליות כגון: חוסר מנוחה, אי שקט, עצבנות, צעם, תופונות, הגברת נדודי השינה, סיטופים, היזיות, פסיכוזות, שינויים בדפוסי ההתנהגות הכלולים התנהגות בלתי הולמת, בלבול ותזוזיות (דילריאום) (תופעות לוואי לא שכיחות) בתגובהות אלה עלולות להתרחש במהלך הטיפול בברוטיזולאם ובמיוחד בקשישים.

تופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות (מופייעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):
כאב ראש, תחושת סחרור, הפרעות במערכת העיכול

תופעות לוואי שאין שכיחות (מופייעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000):
סיטופים, דיכאון, שינויים במצב הרוח, חרדה, תלות בתרופה, הפרעות הראשונות, שינויים התנהגותיים, אי שקט, שינויים בחשך המני, סחרחות, סדציה (טשטוש, עייפות), חוסר קואורדינציה וליקוי בתיאום תנועות הגוף, (אטקסיה), הפרעות זיכרון, שיטין (דמנציה), ליקויים מנთאליים ופסיכו-מורטוריים, הפרעות בראייה (כגון ראייה כפולה), הפרעות בכבד (כולל צבתות ושינויים בערכיהם בבדיקות לכפודי כבד), יובש בפה, תגובהות עוריות, חולשת שריריים, תופעות גמilia וחזרה או החמרה של בעיות השינה לאחר הפסקת התרופה, נמנום (במשך היום), עצבנות, עלייה בסיכון לתאונות ונפילות.

תופעות לוואי נדירות (מופייעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000):
בלבול, חוסר מנוחה, ירידה בערונות ובדירות

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלואוי חמימה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

- **תופעות הלואוי הבאות עלולות להופיע, במיוחד בשלב התreatment, קרות רגשית, ירידה בערונות ובדירות, בלבול, עייפות, סחרחות, כאב ראש, חולשת שריריים, חוסר קואורדינציה וליקוי בתיאום תנועות הגוף (אטקסיה), הפרעות בראייה (כגון ראייה כפולה), הפרעות בכבד (כולל צבתות ושינויים בערכיהם בבדיקות לכפודי כבד), יובש בפה, תגובהות עוריות, חולשת שריריים, תופעות גמilia וחזרה או החמרה של בעיות השינה לאחר הפסקת התרופה, נמנום (במשך היום), עצבנות, עלייה בסיכון לתאונות ונפילות.**

- בשל ההשפעה המרפה שריר, נדרש זהירות, במיוחד בקשישים (סיכון לנפילה).
- דווחו מקרים בהם נעשה שימוש לרעה בBenchmark איזופינים.
- תסמיינית גמilia במהלך הטיפול עלולה להתפתח תולות פיזית ופסיכולוגית. הפסקה פתואמית של הטיפול עלולה לגרום לתסמינים מסוימים (ראה "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה" בסעיף 3).
- יתכן ודיכאון שקדם לטיפול בברוטיזולאם טبع יתגלה במהלך הטיפול

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי"عقب טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקורי לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנع הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התגובה (exp. Date) המופיע על גבי הארזה.
 - תאריך התגובה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
 - **אחסן במקום יבש מתחת ל- 25 °C.**

6. מידע נוסף

נוסח על החומר הפעיל התרופה מכילה גם :

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, sodium starch glycolate, povidone, magnesium stearate.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארזה:

טבלייה עגולה בצבע לבן - שמנת, בצד אחד של הטבלייה קיימן קו חיציה.
הארזה מכילה 10 או 20 טבליות. יתכן ולא כל גודל האריזות משוקקים בפועל.

שם היצרן ובטל הרישום וכ כתובתו:

טבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020 .

עלון זה נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 119.95.30040

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.