



יולי 2023

**רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה  
חברת טבע מודיעה על העדכוניים הבאים בעלון לצרcn של התכשיר:**

## **ברוטיזולאם טبع ® 0.25 mg 0.25 מ"ג**

**Each Tablet Contains: Brotizolam 0.25 mg**

### **עדכוניים בעלון לצרcn**

#### **התוויה כפִי שאושרה בתעודה הרישום:**

For the treatment of insomnia.

**ברצוננו להודיע שבעלן לצרcn עודכן, בפירוט שלහן כוללים העדכוניים העיקריים בלבד (תוספות משמעויות מסומנות באדום והסרות בקו חוצה):**

#### **הקדמה**

ש להיזהר ולהשען בעת קומה מהמטטה

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

אי לשימוש בתרופה אם:

[...]

אתה סובל או סבלת בעבר מחלות בתראות, סמים לא חוקיים או אלכוהול

[...]

#### **ازהרות מיוחדות**

לפני הטיפול בברוטיזולאם טبع ספר לרופא אם :

- אתה משתמש או השתמש לרעה בעבר באלכוהול, סמים לא חוקיים ותרופות.
- אתה כבר מטופל בברוטיזולאם טبع

#### **ازהרות נוספת**

שימוש ממושך עלול לגרום לתלות פיסית ופסיכולוגית! הסיכון לתלות בתרופה עולה עם העליה במינון ומשך הטיפול. **לכן** הרופא ינחה אותך להשתמש בתרופה לתקופה קצרה ככל האפשר ואף עשוי לקיים פגישות מעקב תקופתיות. [...]

אתה עלול לחוות שכחה במהלך הטיפול בתרופה. התגובה בדרך כלל מתרכשת כמה שעות לאחר נטילת

התרופה. אני פנה לרופא אם אתה חוות תופעה זו.

אם אתה סובל מפסיכוזה (מחלה פסיכיאטרית חמורה המשפיעה על ההתנהגות והשליטה עצמית), ברוטיזולאם טبع אינה מתאימה לך.

אם אתה סובל מדיכאון חמור או חרדה עם אירועי דיكان חמור, טיפול בברוטיזולאם טبع עלול להגדיל את הסיכון לפתח מחשבות על פגיעה עצמית או מחשבות אובדיניות. יש להיזהר ברופא לפני הטיפול בתרופה. הרופא יבצע מעקב צמוד במהלך הטיפול בברוטיזולאם טبع. בכל פעם שמחשבות אלו עלות, פנה מיד לרופא או לבית החולים.

#### אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת, כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במילויים אם אתה לוקח:

- תרופה המשפיעת על מערכת העצבים המרכזית [...] שימוש בתרופות אלו במהלך הטיפול ברוטיזולאמ טבע עלול לגרום לדיכי מוגבר של מערכת העצבים המרכזית.
- אופיאידים (משככי כאבים חזקים, תחלפי סם ותרופות מסוימות לשיעור)- שימוש בו זמן עם ברוטיזולאמ טבע מעלה את הסיכון לשנןיות, קשי נשימה (דיכי נשימתי), תרדמת ואירועים. לכן יש לשקל מתן אופיאידים עם ברוטיזולאמ טבע רק כאשר אין אפשרות טיפול אחרת. אם הרופא מנסה לחקח ברוטיזולאמ טבע עם אופיאידים, הוא עשוי להגביל את המינון ומשך הטיפול. ספר לרופא אם אתה נוטל תרופה המכילה אופיאידים והצמד להמלצות הרופא. אם אתה מבחין באחד מן התסמים, פנה מיד לרופא.
- משככי כאבים חזקים מקבוצת האופיאידים- שימוש בו זמן עם ברוטיזולאמ טבע עלול להגביר את תחושת האופוריה ולהיאץ תלות.
- תרופה להרפיה שרירים- בשילוב עם ברוטיזולאמ טבע תיכון עלייה בהשפעה המרפא שרירים תרופות לטיפול בסוכרת ולחץ דם גבוה, תרופות לטיפול בעビות לב (כגון דיגוקסין), הורמוניים - יש להיזהר בשימוש בתרופה אלה בשילוב עם ברוטיזולאמ טבע משום שתיכון השפעה הדדי.
- התרופות הבאות עלולות לגרום לעלייה בהשפעת ברוטיזולאמ טבע: [...] אסתמייזול [...]

#### הירין הנקה ופוריות

אל תשתמשי בתרופה אשר הינך בהירין או מניקה. תינוקות הנולדים לאמותה שנטלו בנזוד איזפינים במשך תקופה ממושכת במהלך ההריון עלולים לפתח תלות פיסית. ילדים אלה הראו תסמי נAMILה בתגובהם של אחר הלידה. כמו כן, במינונים גבוהים בשלב הירין מתקדים ובסمرة לידה יתכן דיכי נשימתי בילדים. קיים סיכוי נמוך לפגיעה בהתפתחות העובר בשימוש בנזוד איזפינים בשלב הירין מוקדמים. אם את **בhirion**, מתכנתת הירין, או חוזדת שאת בהירין, יש לפנות לרופא.

**נהיגה ושימוש במכונות**  
תרופה זו עלולה להשפיע על התగבויות, גם בשימוש בהתאם להוראת הרופא, ובכך **לפגוע ביכולת נהוג ולהפעיל מכונות**. השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערונות, ביכולת הרכיזו ותפקוד השדרירים (במיוחד כאשר מושך מושך במבנה אינו מספיק או בשילוב עם תרופה **המשפעת על המדכאות** את מערכת העצבים המרכזית או בשילוב עם אלכוהול). [...]

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

- [...]  
אם אתה מפסיק את **נטילת** התרופה: גם אם חל שיפור במצבך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה בצורה פתאומית ללא התייעצות עם הרופא. הוראה זו חשובה במיוחד לתרופה כמו ברוטיזולאמ טבע (ראה "הקדמה").
- [...]
  - כמו כן יתכונו תופעות גmilah לאחר הפסקה פתאומית של התרופה [...] **אנא הייעץ** לרופא אם אתה חוות את תופעות הגmilah הללו.

לפיכך, הרופא ייריד בהדרגה את מינון התרופה בסיום הטיפול. הירידה בהדרגה תואמת למטופל באופן אישי משום שהיא תלויה במספר גורמים (למשל מושך הטיפול והמנה היומיות). אנא הייעץ לרופא כיצד להוריד את המינון.

#### 4. תופעות לוואי

יש לפנות מיד לרופא בהופיע תופעות הלואו**י** הראות: תגובהות פרדוקסאליות כגון: חוסר מנוחה, אי שקט, עצבנות, זעם, תתקפנות, הגברת נזודי השינה, סיוטים, היזות, פסיכוזות, שינויים בדףויו ההתנהגות הכללים התנהגות בלתי הולמת, הבלבול ותvizיות (דילירום) (תופעות לוואי לא שכיחות). תגובהות אלה עלולות להתרכש במהלך הטיפול בנזוד איזפינים **ובמיוחד בקשישים**.

אם הופעה תופעות לוואי, אם אחת מתופעות הלואו**י** חמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

- **תופעות הלואו**י** הראות עלולות להופיע, במיוחד בתחילת הטיפול:** נמנום ביום שלמחרת, קחות רגשית, ירידת בערונות ובדרכות, הבלבול, עייפות, סחרורת, כאב ראש, חולשת שדרירים, חוסר קואורדינציה וליקוי בתיאום תנועות הגוף (אטקסיה), הפרעות בראיה (ראיה כפולה). תסמיים אלו בדרך כלל פוחטים במהלך הטיפול.



- בשל ההשפעה המרפה שריר, נדרשת זהירות, במיוחד במקרים סיכון לנפילה)  
דוחו מקרים בהם **נעשה שימוש לרעה** בbenzodiazepines.  
תסמיini גמילה במוליך הטיפול עלולה להתרפתח לתלות פיזית ופסיכולוגית. הפסקה פתאומית של הטיפול עלולה  
לגרום לתסמינים מסויימים (ראה "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה" בסעיף 3)  
**יתכן ודיכאון שקדם לטיפול בברוטיזולאם טבע יתגלה במהלך הטיפול**
- - 
  - 
  -

**העלון לצורך נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות**  
**. ניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת טבע.**